

# CHAPITRE 16

## FONCTIONS VECTORIELLES

### DÉFINITION 16.1 :

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  et  $t_0 \in I$ , si la fonction  $h \in \mathbb{R} \mapsto \frac{f(t_0 + h) - f(t_0)}{h}$  admet une limite en 0, on dit que  $f$  est dérivable en  $t_0$ . Alors, on note  $f'(t_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(t_0 + h) - f(t_0)}{h} \in \mathbb{R}^n$  le vecteur dérivé de  $f$  en  $t_0$ .

REMARQUE 16.1 :  $f$  est dérivable en  $t_0$  si et seulement si  $f$  admet un  $DL_1(t_0)$ , c'est-à-dire si et seulement s'il existe un vecteur  $v \in \mathbb{R}^n$  tel que  $f(t_0 + h) = f(t_0) + hv + o(h)$  ; dans ce cas on a  $f'(t_0) = v$ .

### PROPOSITION 16.1 :

Soit  $t_0 \in I$ ,  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $\mathbb{R}^n$ ,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  une fonction et  $f_1, \dots, f_n$  les fonctions de  $I$  dans  $\mathbb{R}$  telles que  $\forall t \in I$ ,  $f(t) = \sum_{k=1}^n f_k(t)e_k$ . Alors  $f$  est dérivable en  $t_0$  si et seulement si  $f_1, \dots, f_n$  sont dérivables en  $t_0$ . Dans ce cas, on a  $f'(t_0) = \sum_{k=1}^n f'_k(t_0)e_k$ .

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  et  $t_0 \in I$ , si  $f$  est dérivable en  $t_0$  alors  $f$  est continue en  $t_0$ .

REMARQUE 16.2 :

- Une fonction vectorielle  $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  est dérivable en un point  $t_0$  si et seulement si toutes les fonctions coordonnées le sont (et ceci dans n'importe quelle base).
  - Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{C}$  et  $t_0 \in I$ , alors  $f$  est dérivable en  $t_0$  si et seulement si  $Re(f)$  et  $Im(f)$  le sont.
- Dans ce cas,  $f'(t_0) = Re(f)'(t_0) + i Im(f)'(t_0)$ . De plus  $\bar{f}$  est dérivable en  $t_0$  et  $(\bar{f})'(t_0) = \overline{f'(t_0)}$ .

### DÉFINITION 16.2 :

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ .

- On dit que  $f$  est dérivable sur  $I$  si  $f$  est dérivable en tout point  $t_0$  de  $I$ .

Dans ce cas, on note  $f' : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  la fonction dérivée de  $f$  qui à  $t_0 \in I$  associe  $f'(t_0)$ .

- On dit que  $f$  est de classe  $C^1$  sur  $I$  si  $f$  est dérivable sur  $I$  et si  $f'$  est continue sur  $I$ .

On note  $C^1(I, \mathbb{R}^n)$  l'ensemble des fonctions de classe  $C^1$  sur  $I$  et à valeurs dans  $\mathbb{R}^n$ .

### PROPOSITION 16.2 :

$C^1(I, \mathbb{R}^n)$  est un sous-espace de  $\mathcal{F}(I, \mathbb{R}^n)$  et :  $\forall (f, g) \in C^1(I, \mathbb{R}^n)^2$ ,  $\forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2$ ,  $(\alpha f + \beta g)' = \alpha f' + \beta g'$ .

### PROPOSITION 16.3 :

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ ,  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $\mathbb{R}^n$  et  $f_1, \dots, f_n$  les fonctions coordonnées de  $f$  dans  $\mathcal{B}$  :  $f = \sum_{k=1}^n f_k e_k$ . Alors  $f \in C^1(I, \mathbb{R}^n) \iff (f_1, \dots, f_n) \in C^1(I, \mathbb{R})^n$ . Dans ce cas,  $f' = \sum_{k=1}^n f'_k e_k$ .

En particulier :  $f \in C^1(I, \mathbb{C}) \iff (Re(f), Im(f)) \in C^1(I, \mathbb{R})^2$ .

Dans ce cas  $f' = Re(f)' + i Im(f)'$  et, de plus,  $\bar{f} \in C^1(I, \mathbb{C})$  et  $(\bar{f})' = \overline{f'}$ .

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  et  $L \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^p)$ . Si  $f \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$  alors  $L \circ f \in C^1(I, \mathbb{R}^p)$  et  $(L \circ f)' = L \circ f'$ .

**PROPOSITION 16.4 :**

Soit  $f \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$ ,  $g \in C^1(I, \mathbb{R}^m)$  et  $B : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$  bilinéaire, alors la fonction  $B(f, g) : I \rightarrow \mathbb{R}^p$  définie par  $B(f, g)(t) = B(f(t), g(t))$  est de classe  $C^1$  sur  $I$  et  $B(f, g)' = B(f', g) + B(f, g')$ .

Soit  $(m, n, p) \in (\mathbb{N}^*)^3$  et, pour tout  $k \in \llbracket 1; p \rrbracket$ , des  $f_k : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  de classe  $C^1$  sur un intervalle  $I$ . Si  $M : (\mathbb{R}^n)^p \rightarrow \mathbb{R}^m$  est multilinéaire, alors  $g : I \rightarrow \mathbb{R}^m$  définie par  $g(t) = M(f_1(t), \dots, f_p(t))$  est  $C^1$  et  $\forall t \in I, g'(t) = M(f'_1(t), f_2(t), \dots, f_p(t)) + M(f_1(t), f'_2(t), f_3(t), \dots, f_p(t)) + \dots + M(f_1(t), \dots, f_{p-1}(t), f'_p(t))$ .

**PROPOSITION 16.5 :**

Pour le produit scalaire, la norme euclidienne canonique dans  $\mathbb{R}^n$  et le déterminant :

(i) Si  $(f, g) \in C^1(I, \mathbb{R}^n)^2$  alors  $(f|g) \in C^1(I, \mathbb{R})$  et  $(f|g)' = (f'|g) + (f|g')$ .

(ii) Si  $f \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$  est telle que  $\forall t \in I, f(t) \neq 0$  alors  $\|f\| \in C^1(I, \mathbb{R})$  et  $\|f\|' = \frac{(f|f')}{\|f\|}$ .

Soit  $M : I \mapsto \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  de classe  $C^1$  avec  $M(t) = (C_j(t))_{1 \leq j \leq p}$  ( $C_j$  est la fonction de  $t$  qui renvoie la  $j$ -ième colonne de la matrice  $M(t)$ ). Alors  $\det(M) : I \rightarrow \mathbb{K}$  est  $C^1$  et, sur  $I$ , on a la relation

(iii)  $(\det(M))' = \sum_{j=1}^p \det(C_1(t), \dots, C_{j-1}(t), C'_j(t), C_{j+1}(t), \dots, C_p(t))$ .

**PROPOSITION 16.6 :**

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  de classe  $C^1$  et  $\varphi : J \rightarrow I$  de classe  $C^1$ .

Alors  $f \circ \varphi$  est de classe  $C^1$  et on a :  $\forall u \in J, (f \circ \varphi)'(u) = \varphi'(u)f'(\varphi(u))$ .

**DÉFINITION 16.3 :**

Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$ , on note  $f^{(0)} = f$  et pour  $p \in \mathbb{N}$  et si  $f^{(p)}$  est dérivable sur  $I$ , la fonction  $f^{(p+1)} = (f^{(p)})'$  : cette fonction  $f^{(p)}$  est alors la dérivée  $p$ -ième de  $f$  sur  $I$ .

Pour  $p \in \mathbb{N}^*$ , on dit que  $f$  est de classe  $C^p$  sur  $I$  si  $f'$  est de classe  $C^{p-1}$  sur  $I$ .

On note  $C^p(I, \mathbb{R}^n)$  l'ensemble des fonctions de classe  $C^p$  sur  $I$  et à valeurs dans  $\mathbb{R}^n$ .

On dit que  $f$  est de classe  $C^\infty$  sur  $I$  si  $f$  est de classe  $C^p$  sur  $I$  pour tout entier  $p \in \mathbb{N}$ .

On note  $C^\infty(I, \mathbb{R}^n) = \bigcap_{p \in \mathbb{N}} C^p(I, \mathbb{R}^n)$  l'ensemble des fonctions de classe  $C^\infty$  sur  $I$  et à valeurs dans  $\mathbb{R}^n$ .

REMARQUE 16.3 : •  $f$  de classe  $C^2$  si  $f'$  existe et est de classe  $C^1$  donc si  $f''$  existe et est continue.

• Par récurrence, pour  $p \in \mathbb{N}^*$  :  $(f \text{ de classe } C^p \text{ sur } I) \iff (f^{(p)} \text{ existe et est continue sur } I)$ .

**PROPOSITION 16.7 :**

Pour tout  $p \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ ,  $C^p(I, \mathbb{R}^n)$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{F}(I, \mathbb{R}^n)$  et :

$$\forall (f, g) \in C^p(I, \mathbb{R}^n)^2, \forall (\alpha, \beta) \in \mathbb{R}^2, (\alpha f + \beta g)^{(p)} = \alpha f^{(p)} + \beta g^{(p)}.$$

Soit  $p \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ ,  $\lambda : I \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^p$  sur  $I$  et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  de classe  $C^p$ .

Alors  $\lambda f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  est de classe  $C^p$  et si  $p \in \mathbb{N}$  :  $(\lambda f)^{(p)} = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} \lambda^{(k)} f^{(p-k)}$  (formule de LEIBNIZ).

Soit  $p \in \mathbb{N} \cup \{\infty\}$ ,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}^n$  de classe  $C^p$ ,  $\varphi : J \rightarrow I$  de classe  $C^p$ . Alors  $f \circ \varphi$  est de classe  $C^p$ .