

# TD 24 : CALCUL DIFFÉRENTIEL

PSI 1 2025-2026

mercredi 25 mars 2026

Géométrie :

- 24.1** Déterminer les plans tangents à  $S : z^3 = xy$  contenant la droite  $D : x - 2 = y - 3(z + 1) = 0$ .
- 24.2** Déterminer les plans tangents à  $S : x^2 + y^2 + 2z^2 = 1$  qui sont orthogonaux à  $D : x = \frac{y}{3} = -\frac{z}{2}$ .
- 24.3** *TPE PSI 2015* Déterminer les plans tangents à  $S : z^2 = xy$  et contenant la droite  $D : x = y = z$ .

Calcul différentiel :

- 24.4** *Centrale PSI 2013* Soit les deux parties  $D_1 = \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}$  et  $D_2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^*$  de  $\mathbb{R}^2$  et l'application  $\varphi : D_2 \rightarrow D_1$  définie par  $\forall (u, v) \in D_2, \varphi(u, v) = (x, y) = \left( \frac{u^2 + v^2}{2}, \frac{u}{v} \right)$ .
- a. Montrer que  $\varphi$  est de classe  $C^1$  et bijective.
- b. Résoudre dans  $D_1$  l'équation (E) :  $2xy \frac{\partial f}{\partial x} + (1 + y^2) \frac{\partial f}{\partial y} = 2xf$  en posant  $x = \frac{u^2 + v^2}{2}$  et  $y = \frac{u}{v}$ .
- 24.5** *Petites Mines PSI 2015* Patxi Teillagorry Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  de classe  $C^1$ . On définit  $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  par  $g(x, x) = f(x)$  et  $g(x, y) = \frac{1}{y - x} \int_x^y f(t) dt$  si  $x \neq y$ . On pose  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x \neq y\}$ .
- a. Exemple, prendre  $f(x) = x^2$ . Montrer que  $g$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^2$ .
- b. Montrer que  $g$  est de classe  $C^1$  sur  $D$  et calculer  $\frac{\partial g}{\partial x}$  et  $\frac{\partial g}{\partial y}$ .
- c. Soit  $a \in \mathbb{R}$ , montrer que  $g$  admet une dérivée partielle en  $(a, a)$  selon  $x$  et selon  $y$ . Les calculer.
- d. Montrer que  $g$  est de classe  $C^1$  sur  $\mathbb{R}^2$ .
- 24.6** *Mines PSI 2016* Sylvain Bielle I (note 8) On note  $U = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ . Soit  $p \in \mathbb{R}$  et  $g \in C^2(U, \mathbb{R})$ . Trouver  $f \in C^2(\mathbb{R}_+^*, \mathbb{R})$  telles que  $\forall (x, y) \in U, g(x, y) = f(x^2 + y^2)$  si  $\forall (x, y) \in U, \frac{\partial^2 g}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2}(x, y) = (x^2 + y^2)^p$ .
- 24.7** *ENS Cachan PSI 2017* Thomas Laborde (note 5,5)
- Soit  $u \in C^1(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$  telle que  $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} \frac{|u(x)|}{\|x\|} = +\infty$ . On pose  $B_r = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| < r\}$  pour  $r > 0$ .
- a. Cas  $n = 1$  :  $\nabla u$  est-il surjectif ?
- Pour la suite, on prend  $n = 2$  et on suppose que  $\nabla u$  n'est pas surjectif.
- b. Montrer qu'il existe  $v \in \mathbb{R}^2$  tel que la fonction  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x) = u(x) - (x|v)$  soit de classe  $C^1$ , que  $\nabla f$  ne s'annule pas, et que  $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} \frac{|f(x)|}{\|x\|} = +\infty$ .
- c. Soit  $r > 0$  et  $(a, b) \in (\mathbb{R}^2 \setminus B_r)^2$ , montrer qu'il existe  $\gamma : [0; 1] \rightarrow (\mathbb{R}^2 \setminus B_r)$  telle que  $\gamma(0) = a, \gamma(1) = b$ . En déduire que  $f(\mathbb{R}^2 \setminus B_r)$  est un intervalle. Conclure.
- 24.8** *Centrale Maths1 PSI 2019* Victor Margueritte (note 14) Dans  $\mathbb{R}^2$ , soit  $D$  le disque fermé de centre  $O$  et de rayon 1 (disque fermé unité). On définit  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  par  $f(x, y) = -(x^2 + y^2)^2 + \frac{3}{2}(x^2 + y^2) + 1$ .
- a. Calculer le gradient de  $F : D \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $F(x, y, z) = f(x, y) - z$ .
- b. Soit  $S = \{(x, y, z) \in D \times \mathbb{R} \mid z = f(x, y)\}$  la surface représentative de  $f$ . Déterminer les points  $(x, y) \in D$  où le plan tangent à  $S$  en  $(x, y, z)$  est normal au vecteur  $\vec{v} = (0, 1, -1)$ .
- c. Soit  $\gamma : t \mapsto (t, t)$  et  $g = f \circ \gamma$ . Donner l'ensemble de définition de  $g$ , calculer  $g'$  par la règle de la chaîne. En déduire les extrema de la fonction  $g$  sur son ensemble de définition.

**24.9** CCP PSI 2019 Perrine Hoffmann et Quentin Vacher I (notes 10,13 et 15,39) Soit  $f : (x, y) \mapsto x^3y^2(1-x-y)$ .

- Trouver les points critiques de  $f$ .
- Étudier les extrema locaux de  $f$ . Admet-elle des extrema absolus ?

**24.10** ENS Cachan PSI 2022 Olivier Baesen et Thibault Le Gal et Antoine Prévost (note 13 et 10 et 10)

Soit  $n \in \mathbb{N}^*$  et  $A \in GL_n(\mathbb{R}) \cap S_n(\mathbb{R})$  et  $\Phi : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow S_n(\mathbb{R})$  définie par  $\Phi(M) = M^TAM$ .

- Montrer que  $\Phi$ , vue comme une application de  $\mathbb{R}^{n^2}$  dans  $\mathbb{R}^{\frac{n(n+1)}{2}}$ , est de classe  $C^1$ .
- Rappeler la définition de la différentielle.
- Soit  $H \in M_n(\mathbb{R})$ , on note  $d_{I_n}\Phi$  la différentielle de  $\Phi$  en  $I_n$ .
  - Montrer que  $\Phi(I_n + H) - \Phi(I_n) = H^T A + AH + H^T AH$ .
  - En déduire que  $d_{I_n}\Phi(H) = H^T A + AH$ .
  - Déterminer le noyau et l'image de  $d_{I_n}\Phi$ .
- Montrer que  $F = \{M \in M_n(\mathbb{R}) \mid AM \in S_n(\mathbb{R})\}$  et  $\text{Ker}(d_{I_n}\Phi)$  sont supplémentaires.
- Montrer qu'il existe un ouvert  $U$  contenant  $I_n$  tel que  $U \subset GL_n(\mathbb{R})$ .

**24.11** Mines PSI 2022 Jimmy Guertin I (note 12) Pour tout entier  $n \in \mathbb{N}$ , on pose  $I_n = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t^2} dt$ .

On définit la fonction  $F : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  par  $F(x, y) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} (t-x)^2(t-y)^2 e^{-t^2} dt$ .

- Montrer l'existence de  $I_n$  pour tout  $n \in \mathbb{N}$ . Trouver une relation entre  $I_{n+2}$  et  $I_n$  pour  $n \in \mathbb{N}$ .
- Pour  $p \in \mathbb{N}$ , calculer  $I_{2p+1}$  et  $I_{2p}$  en admettant que  $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$ .
- Calculer  $F(x, y)$ . Montrer que  $F$  est de classe  $C^\infty$  sur  $\mathbb{R}^2$ .
- Déterminer les points critiques de  $F$ , puis ses éventuels extrema.

**24.12** Centrale Maths1 PSI 2024 Edward Bauduin Soit  $f : (\mathbb{R}_+^*)^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x, y) = xy + \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$ .

- Donner l'équation du plan tangent à  $S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2 \text{ et } z = f(x, y)\}$  en  $(a, b, c) \in S$ .
- Montrer que  $f$  admet un minimum local en un unique point  $(x_0, y_0) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$  à déterminer.
- Montrer que  $K = \{(x, y) \in (\mathbb{R}_+^*)^2 \mid xy \leq 3 \text{ et } x \geq \frac{1}{3} \text{ et } y \geq \frac{1}{3}\}$  est un fermé borné de  $(\mathbb{R}_+^*)^2$ .
- En déduire que  $f$  admet en  $(x_0, y_0)$  un minimum absolu.

**24.13** Centrale Maths1 PSI 2024 Amjad Belmiloud

Soit les ensembles  $\mathcal{E} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + 2y^2 = 8\}$  et  $\Delta = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + 2y^2 \leq 8\}$ . Soit les fonctions  $\Phi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$  et  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définies par  $\Phi(t) = (2\sqrt{2}\cos(t), 2\sin(t))$  et  $f(x, y) = \sqrt{1+x^2+y^2} + x^2$ .

- Montrer que  $\Phi$  réalise une bijection de classe  $C^1$  de  $[0; 2\pi[$  dans  $\mathcal{E}$ .
- Montrer que  $f$  admet un minimum et un maximum sur  $\Delta$ .
- Déterminer  $\text{Min}_\Delta(f)$ . Montrer que le maximum de  $f$  sur  $\Delta$  est atteint sur  $\mathcal{E}$  et calculer  $\text{Max}_\Delta(f)$ .

**24.14** Centrale Maths1 PSI 2024 Lou Goiffon et Tom Sanchez

Soit  $H = [-1; 1] \times [0; 1]$ ,  $O = ]-1; 1[ \times ]0; 1[$  et  $f : H \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(x, y) = \sqrt{y - yx^2}(x - xy)$ .

- Montrer que  $f$  admet un minimum et un maximum sur  $H$ .
- Trouver les extrema locaux de  $f$  sur  $O$ . Calculer la valeur du maximum global de  $f$  sur  $H$ .

**24.15** E3A PSI 2015 et Centrale Maths1 PSI 2024 Florie Montpezat et Martin Mayot

Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $f(0, 0) = 1$  et  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$ ,  $f(x, y) = (x^2 + y^2)^x$ .

- Étudier les variations de la fonction  $x \mapsto x^x$  sur  $\mathbb{R}_+^*$ . Montrer que  $f$  est continue sur  $\mathbb{R}^2$ .
- Trouver les points critiques de  $f$ . Déterminer les extrema de  $f$  sur  $\mathbb{R}^2$ .

**24.16** Mines PSI 2024 Martin Mayot II (note 5) Soit  $n \geq 2$  et  $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$   $C^1$  sur  $\mathbb{R}^n$  avec  $\lim_{\|x\| \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{\|x\|} = +\infty$ .

- Montrer que  $f$  admet un minimum global sur  $\mathbb{R}^n$ .
- Montrer que l'application  $x \mapsto \nabla f(x)$  est surjective.