

Nom : .....

Prénom : .....

## Logique, raisonnement et Ensembles

Question de cours : Montrer que  $\sqrt{2}$  est irrationnel. La démonstration du lemme nécessaire à la démonstration pourra être admis ou démontré. Ce choix est laissé à l'appréciation du candidat.

**Exercice 1 :** Soit  $a \in \mathbb{R}$ . Montrer que  $\forall \varepsilon > 0, |a| \leq \varepsilon \implies a = 0$ .

**Exercice 2 :** Soit  $f \in \mathcal{F}(E, E)$ .

Montrer que  $f \circ f = Id_E \iff (f \text{ est bijective et } f^{-1} = f)$ .

**Exercice 3 :** Montrer  $\forall x \geq 0, \forall n \in \mathbb{N}, (1+x)^n \geq 1+nx$ .

Nom : .....

Prénom : .....

## Logique, raisonnement et Ensembles

Question de cours :

1. Donner une propriété concernant  $f^{-1}(A \cup B)$  et la démontrer.
2. Donner une propriété concernant  $f(A \cap B)$  et la démontrer.

**Exercice 1 :** Exprimer les propriétés suivantes à l'aide de quantificateurs ( $f$  étant une fonction réelle) :

1. Tout réel  $a$  (au moins) deux antécédents par  $f$ .
2. La fonction  $f$  ne prend jamais deux fois la même valeur.

**Exercice 2 :**

1. Sur quels intervalles les plus grands possible, la fonction  $f : x \mapsto \sqrt{x^2 + x + 1}$  est-elle injective ?
2. Déterminer  $f(] - 2, 4])$ .

**Exercice 3 :** Soit  $s_0 = 0$  et  $\forall n \geq 1, s_{n+1} = s_n + 3n(n + 1)$ .

Montrer que  $(s_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est un multiple de 6.

Nom : .....

Prénom : .....

## Logique, raisonnement et Ensembles

Question de cours : Montrer qu'il n'existe pas d'entier naturel supérieur à tous les autres.

**Exercice 1 :** Soit  $f : \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{R}$  une fonction. Nier les assertions suivantes :

1.  $\forall M > 0, \exists A > 0, \forall x \geq A, f(x) > M.$
2.  $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x, y) \in \mathbb{I}^2, |x - y| \leq \eta \Rightarrow |f(x) - f(y)| \leq \varepsilon.$

**Exercice 2 :** Soient  $f : E \mapsto F$  une application,  $A \subset E$  et  $B \subset F$ .

Montrer que  $f(A \cap f^{-1}(B)) = f(A) \cap B.$

**Exercice 3 :** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sqrt{1 + x^2}.$

Pour tout entier  $n \geq 1$ , on note  $f^{(n)} = f \circ f \circ f \dots \circ f$  (composée successive de  $n$  fonctions  $f$ ).

Donner l'expression de  $f^{(2)}$  et  $f^{(3)}$ . Conjecturer une expression de  $f^{(n)}$ . et prouver cette conjecture.

Nom : .....

Prénom : .....

## Logique, raisonnement et Ensembles

Question de cours : Montrer que  $\forall f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \exists!(g, h) \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), g$  paire,  $h$  impaire, tel que  $f = g + h$ .

**Exercice 1 :** Soit  $a$  et  $b$  deux réels. Montrer que si  $a + b$  est irrationnel, alors  $a$  ou  $b$  sont irrationnels.

La réciproque est-elle vraie ?

**Exercice 2 :** On ne cherchera pas ici à savoir si  $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$  est rationnel ou pas. Calculer  $(\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}}$ .

En déduire qu'il existe deux irrationnels  $a$  et  $b$  tels que  $a^b$  soit rationnel.

**Exercice 3 :** Étudier l'injectivité et la surjectivité de  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ .

$$(x, y) \mapsto (2x - y, x + 2y)$$

Nom : .....

Prénom : .....

## Logique, raisonnement et Ensembles

Question de cours : Soit  $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{1}{x}$ . On pose  $E = \{y \in \mathbb{R} / \exists x \in \mathbb{R}^* / f(x) = y\}$ . Montrer que  $E = \mathbb{R}^*$ .

**Exercice 1 :** Parmi les propositions suivantes, déterminer lesquelles sont vraies et lesquelles sont fausses. On essaiera de justifier les affirmations vraies, et de donner des contre-exemples aux affirmations fausses :

1.  $\forall x \in \mathbb{R}, x^2 \geq x$
2.  $\forall x > 0, \exists y > 0, y < x$
3.  $\forall n \in \mathbb{N}, \exists p \in \mathbb{N}, p = 2n$

**Exercice 2 :** Soit  $f \in \mathcal{F}(E, E)$  telle que  $f \circ f = f$ .

Montrer que si  $f$  est injective ou surjective, alors  $f = Id_E$ .

**Exercice 3 :** Montrer  $\forall n \geq 4, 2^n \leq n!$ .

Nom : .....

Prénom : .....

Logique, raisonnement et Ensembles

Question de cours :

1. Donner une propriété concernant  $f(A \cup B)$  et la démontrer.
2. Donner une propriété concernant  $f^{-1}(A \cap B)$  et la démontrer.

**Exercice 1 :** Soit  $a$  et  $b$  deux réels. Montrer que si  $a + b$  est irrationnel, alors  $a$  ou  $b$  sont irrationnels.

La réciproque est-elle vraie ?

**Exercice 2 :**

1. Soit  $N_n = 0,19971997 \dots 1997$  ( $n$  fois). Mettre  $N_n$  sous la forme  $\frac{p}{q}$  avec  $p, q \in \mathbb{N}_{n_0}^*$ .
2. Soit  $M = 0,199719971997 \dots$ . Donner le rationnel dont l'écriture décimale est  $M$ .
3. Même question avec :

$$P = 0,11111 \dots + 0,22222 \dots + 0,33333 \dots + 0,44444 \dots + 0,55555 \dots + 0,66666 \dots \\ + 0,77777 \dots + 0,88888 \dots + 0,99999 \dots$$

**Exercice 3 :** On considère une suite  $(u_n)$  de réels vérifiant :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{u_n + u_{n+2}}{2}.$$

On pose  $r = u_1 - u_0$ . Montrer que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $u_n = u_0 + nr$ .

Nom : .....

Prénom : .....

## Logique, raisonnement et Ensembles

Question de cours : Montrer que tout entier  $n \geq 2$  admet un diviseur premier.**Exercice 1 :** Déterminer toutes les applications  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  telles que

$$\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x)f(y) = f(xy) + x + y.$$

**Exercice 2 :** Démontrer les implications suivantes, où  $f$  et  $g$  désignent deux fonctions :

1. Si  $g \circ f$  est surjective alors  $g$  est surjective.
2. La composée de deux fonctions surjectives est surjective.

**Exercice 3 :** Démontrer que pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$\frac{1}{1 \times 2} + \frac{1}{2 \times 3} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}.$$

Nom : .....

Prénom : .....

## Logique, raisonnement et Ensembles

Question de cours : Montrer que  $\forall f \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), \exists!(g, h) \in \mathcal{F}(\mathbb{R}, \mathbb{R}), g$  paire,  $h$  impaire, tel que  $f = g + h$ .

**Exercice 1 :** Soit  $f : E \mapsto F$ . Que dire de  $f$  quand elle satisfait les affirmations suivantes ?

1.  $\forall y \in F, \forall x \in E, f(x) = y,$

2.  $\forall y \in F, \exists x \in E, f(x) = y,$

3.  $\exists y \in F, \forall x \in E, f(x) = y,$

4.  $\exists y \in F, \exists x \in E, f(x) = y.$

**Exercice 2 :** Soit  $E$  un ensemble et soient  $A, B$  deux parties de  $E$ . On définit la différence symétrique de  $A$  et  $B$  par :

$$A \Delta B = (A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)$$

où  $\bar{A}$  désigne le complémentaire de  $A$  dans  $E$ . Démontrer que  $A \Delta B = B$  si et seulement si  $A = \emptyset$ .

**Exercice 3 :** Étudier l'injectivité et la surjectivité de  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ .

$$(x, y) \mapsto (x - 3y, -2x + 6y)$$