

Fonctions de la variable réelle - DÉRIVABILITÉ

Cours de PTSI

Lycée Jules Garnier

Chapitre 17



- ➊ Dérivabilité
- ➋ Fonctions dérivables
- ➌ Théorème des accroissements finis
- ➍ Applications
- ➎ Fonctions à valeurs complexes





ans ce chapitre, nous complétons nos outils permettant une étude efficace des fonctions. L' est bien entendu la **dérivation**, que nous abordons ici d'un point de vue essentiellement pratique : comme inscrit dans le programme de PTSI, l'objectif est de savoir dériver et étudier de façon efficace des fonctions explicites.



ien de très nouveaux donc, si ce n'est un peu plus de maturité en analyse réelle et la section des théorèmes classiques qui va s'enrichir d'un théorème capital : **le théorème des accroissements finis** ^[1].

Fondamental notamment pour l'étude des suites récurrentes que nous aborderons au prochain chapitre.

[1]. Après le « TVI » voici le « TAF ».



Dans tout ce chapitre, I représentera, sauf mentions autres, un intervalle non trivial de $\mathbb{R}$ *i.e.* non vide et non réduit à un singleton ou une réunion d'intervalles tous non triviaux : Un intervalle ou une réunion d'intervalles d'intérieurs non vides.



I. Dérivabilité

1 Dérivabilité

- Taux d'accroissement et nombre dérivé
- Dérivées à droite et à gauche
- Dérivabilité et approximation affine

2 Fonctions dérivables

3 Théorème des accroissements finis

4 Applications

5 Fonctions à valeurs complexes



I. Dérivabilité

1. Taux d'accroissement et nombre dérivé

Définition I (Nombre dérivé, fonction dérivée, tangente) :

Soient I un intervalle ou une réunion d'intervalles de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in I$.

- On dit que f est dérivable en a si le taux d'accroissement de f en a

$\tau_{a,f}(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite finie quand $x \rightarrow a$, $x \neq a$.

Dans ce cas, on appelle cette limite le nombre dérivé de f en a , noté $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$



I. Dérivabilité

1. Taux d'accroissement et nombre dérivé

Définition I (Nombre dérivé, fonction dérivée, tangente) :

Soient I un intervalle ou une réunion d'intervalles de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $a \in I$.

- On dit que f est dérivable en a si le taux d'accroissement de f en a

$$\tau_{a,f}(x) = \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{ admet une limite finie quand } x \rightarrow a, x \neq a.$$

Dans ce cas, on appelle cette limite le nombre dérivé de f en a , noté $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{\substack{h \rightarrow 0 \\ h \neq 0}} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

- On dit que f est dérivable sur I si f est dérivable en tout $a \in I$ au sens précédent.



I. Dérivabilité

1. Taux d'accroissement et nombre dérivé

Définition 1 (Nombre dérivé, fonction dérivée, tangente) :

Soient I un intervalle ou une réunion d'intervalles de $\mathbb{R}$, $f : I \mapsto \mathbb{R}$ une fonction et $a \in I$.

On appelle alors **fonction dérivée** de f sur I , que l'on note f' (ou $\frac{df}{dx}$), la fonction qui à tout x de I associe le nombre dérivé de f en x :

$$\begin{aligned} f' : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f'(x). \end{aligned}$$



I. Dérivabilité

1. Taux d'accroissement et nombre dérivé

Définition 1 (Nombre dérivé, fonction dérivée, tangente) :

Soient I un intervalle ou une réunion d'intervalles de $\mathbb{R}$, $f : I \mapsto \mathbb{R}$ une fonction et $a \in I$.

On appelle alors **fonction dérivée** de f sur I , que l'on note f' (ou $\frac{df}{dx}$), la fonction qui à tout x de I associe le nombre dérivé de f en x :

$$\begin{aligned} f' : I &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto f'(x). \end{aligned}$$

- On note $\mathcal{D}^1(I, \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions dérivables sur I et à valeurs dans $\mathbb{R}$.



I. Dérivabilité

1. Taux d'accroissement et nombre dérivé


Interprétation graphique :

Soit $A(a; f(a))$ un point de la courbe représentative, donnons nous un autre point $M(x; f(x))$ avec $x \in \mathcal{D}_f$, un point variable « pas trop éloigné » de A.

On considère alors les droites (AM), sécantes en A et M à $\mathcal{C}_f$.

Le taux d'accroissement $\tau_{a,f}(x)$ désigne le coefficient directeur de la corde (AM).

$$\tau_{a,f} = \frac{f(x) - f(a)}{x - a}.$$



I. Dérivabilité

1. Taux d'accroissement et nombre dérivé

Remarques :

- Dire que f est dérivable en a revient à dire que la fonction

$$\begin{aligned}\tau_{a,f}: \quad \mathbb{I} \setminus \{a\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}\end{aligned}$$

admet un prolongement par continuité en a .



I. Dérivabilité

1. Taux d'accroissement et nombre dérivé

Remarques :

- Dire que f est dérivable en a revient à dire que la fonction

$$\begin{aligned}\tau_{a,f}: \quad \mathbb{I} \setminus \{a\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}\end{aligned}$$

admet un prolongement par continuité en a .

- La dérivation est une notion :



I. Dérivabilité

1. Taux d'accroissement et nombre dérivé

Remarques :

- Dire que f est dérivable en a revient à dire que la fonction

$$\begin{aligned}\tau_{a,f}: \quad \mathbb{I} \setminus \{a\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}\end{aligned}$$

admet un prolongement par continuité en a .

- La dérivation est une notion :
 - locale et non ponctuelle : la fonction f doit être définie dans un voisinage de a et pas seulement en a .



I. Dérivabilité

1. Taux d'accroissement et nombre dérivé

Remarques :

- Dire que f est dérivable en a revient à dire que la fonction

$$\begin{aligned}\tau_{a,f}: I \setminus \{a\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}\end{aligned}$$

admet un prolongement par continuité en a .

- La dérivation est une notion :
 - locale et non ponctuelle : la fonction f doit être définie dans un voisinage de a et pas seulement en a .
 - locale et non globale : elle ne dépend que de la restriction de f à un voisinage de a quel qu'il soit et non de sa description globale.



I. Dérivabilité

1. Taux d'accroissement et nombre dérivé

Remarques :

- Dire que f est dérivable en a revient à dire que la fonction

$$\begin{aligned}\tau_{a,f} : \quad \mathbb{I} \setminus \{a\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}\end{aligned}$$

admet un prolongement par continuité en a .

- La dérivation est une notion :
 - locale et non ponctuelle : la fonction f doit être définie dans un voisinage de a et pas seulement en a .
 - locale et non globale : elle ne dépend que de la restriction de f à un voisinage de a quel qu'il soit et non de sa description globale.
- Par définition, le nombre dérivé en a , s'il existe, est donc le coefficient directeur de la tangente à la courbe en au point d'abscisse a .



I. Dérivabilité

1. Taux d'accroissement et nombre dérivé

Remarques :

- Dire que f est dérivable en a revient à dire que la fonction

$$\begin{aligned}\tau_{a,f}: \mathbb{I} \setminus \{a\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}\end{aligned}$$

admet un prolongement par continuité en a .

- La dérivation est une notion :
 - locale et non ponctuelle : la fonction f doit être définie dans un voisinage de a et pas seulement en a .
 - locale et non globale : elle ne dépend que de la restriction de f à un voisinage de a quel qu'il soit et non de sa description globale.
- Par définition, le nombre dérivé en a , s'il existe, est donc le coefficient directeur de la tangente à la courbe en au point d'abscisse a .
 - Si f est dérivable en a , la tangente à $\mathcal{C}_f$ en a est alors définie comme la droite d'équation

$$(T_a): y = f'(a)(x - a) + f(a).$$



I. Dérivabilité

1. Taux d'accroissement et nombre dérivé

Remarques :

- Dire que f est dérivable en a revient à dire que la fonction

$$\begin{aligned}\tau_{a,f} : \mathbb{I} \setminus \{a\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}\end{aligned}$$

admet un prolongement par continuité en a .

- La dérivation est une notion :

- locale et non ponctuelle : la fonction f doit être définie dans un voisinage de a et pas seulement en a .
- locale et non globale : elle ne dépend que de la restriction de f à un voisinage de a quel qu'il soit et non de sa description globale.

- Par définition, le nombre dérivé en a , s'il existe, est donc le coefficient directeur de la tangente à la courbe en au point d'abscisse a .

- Si f est dérivable en a , la tangente à $\mathcal{C}_f$ en a est alors définie comme la droite d'équation

$$(T_a) : y = f'(a)(x - a) + f(a).$$

- Si $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \pm\infty$ alors la (demi-)tangente à $\mathcal{C}_f$ en a est la droite d'équation $x = a$.



I. Dérivabilité

1. Taux d'accroissement et nombre dérivé

Exercice 1 (Dérivée usuelle) :

Retrouver les fonctions dérivées des fonctions usuelles suivantes et préciser leur domaine de dérivabilité :

❶ $x \mapsto x^n, n \in \mathbb{Z}.$

❷ $x \mapsto \sin(x).$



I. Dérivabilité

1. Taux d'accroissement et nombre dérivé

Exemples I :

- La fonction $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$, dérivable sur $]-\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$ de nombre dérivé respectivement égal à -1 et 1 en tout point de ces intervalles.

$$\text{Or, } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1 \neq 1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x| - |0|}{x - 0}.$$

Donc $x \mapsto |x|$ n'est pas dérivable en 0 .



I. Dérivabilité

1. Taux d'accroissement et nombre dérivé

Exemples I :

- La fonction $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$, dérivable sur $]-\infty; 0[$ et $]0; +\infty[$ de nombre dérivé respectivement égal à -1 et 1 en tout point de ces intervalles.

$$\text{Or, } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1 \neq 1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x| - |0|}{x - 0}.$$

Donc $x \mapsto |x|$ n'est pas dérivable en 0 .

- La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est continue sur $\mathbb{R}_+$.

De plus, $\forall a, x \in \mathbb{R}_+$ et $a \neq x$, on a :

$$\tau_{a, \sqrt{\cdot}}(x) = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{a}}{x - a} = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{a}} \xrightarrow{x \rightarrow a} \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{a}} & \text{si } a \neq 0 \\ +\infty & \text{si } a = 0. \end{cases}$$

La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est donc dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

*D'une manière générale, ce sera le cas pour toutes les réciproques de fonctions dont la dérivée s'annule en ce point (cf. **théorème (6)**).*



I. Dérivabilité

1. Taux d'accroissement et nombre dérivé




Figure 1 – Les fonctions valeur absolue $x \mapsto |x|$ et racine carrée $x \mapsto \sqrt{x}$ ne sont pas dérivables en 0.



I. Dérivabilité

1. Taux d'accroissement et nombre dérivé

Théorème I :

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

Si f est dérivable sur I , alors f est continue sur I .



I. Dérivabilité

1. Taux d'accroissement et nombre dérivé

Théorème I :

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

Si f est dérivable sur I , alors f est continue sur I .

Par la contraposée, une fonction non continue au voisinage d'un point ne peut y être dérivable.



I. Dérivabilité

1. Taux d'accroissement et nombre dérivé

Théorème I :

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

Si f est dérivable sur I , alors f est continue sur I .

Par la contraposée, une fonction non continue au voisinage d'un point ne peut y être dérivable.

ATTENTION

La réciproque de ce théorème est fausse. Pour s'en rendre compte, on peut s'appuyer sur les représentations graphiques de la valeur absolue, de la racine carrée ou, globalement, de celle de la figure (2) .



I. Dérivabilité

1. Taux d'accroissement et nombre dérivé

Ce théorème explique simplement que la notion de dérivabilité est plus forte que celle de continuité comme l'était déjà la notion de continuité par rapport à celle de définition. On pourra donc trouver des fonctions continues sans qu'elles soient dérivable mais pas l'inverse.

D'une manière générale, reprenez que :

- la représentation graphique d'une fonction continue est en un seul morceau.



I. Dérivabilité

1. Taux d'accroissement et nombre dérivé

Ce théorème explique simplement que la notion de dérivabilité est plus forte que celle de continuité comme l'était déjà la notion de continuité par rapport à celle de définition. On pourra donc trouver des fonctions continues sans qu'elles soient dérivable mais pas l'inverse.

D'une manière générale, retenir que :

- la représentation graphique d'une fonction continue est en un seul morceau.
- la représentation graphique d'une fonction dérivable admet une tangente en chacun de ses points (cf. **proposition (3)**).



I. Dérivabilité

2. Dérivées à droite et à gauche

De même que pour les limites ou la continuité, on définit les deux dérivées directionnelles à gauche et à droite :

Définition 2 (Dérivabilité à gauche/à droite en un point) :

Soient $f : I \mapsto \mathbb{R}$ une fonction et $a \in I$.

Dérivabilité à gauche : On dit que f est **dérivable à gauche** en a si $f|_{I \cap]-\infty; a]}$ est dérivable en a *i.e.* si la limite $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe et est finie. Cette limite est notée $f'_g(a)$.

Dérivabilité à droite : On dit que f est **dérivable à droite** en a si $f|_{I \cap [a; +\infty[}$ est dérivable en a *i.e.* si la limite $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ existe et est finie. Cette limite est notée $f'_d(a)$.

Dans les cas d'existence, $f'_g(a)$ et $f'_d(a)$ s'appellent respectivement les nombres dérivés à gauche et à droite de f en a .



I. Dérivabilité

2. Dérivées à droite et à gauche

Remarques :

- Dire que f est dérivable à gauche ou à droite en a revient à dire que la fonction

$$\begin{aligned}\tau_{a,f} : I \setminus \{a\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}\end{aligned}$$

admet une limite à gauche et à droite respectivement.



I. Dérivabilité

2. Dérivées à droite et à gauche

Remarques :

- Dire que f est dérivable à gauche ou à droite en a revient à dire que la fonction

$$\begin{aligned}\tau_{a,f} : I \setminus \{a\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}\end{aligned}$$

admet une limite à gauche et à droite respectivement.

- Parce qu'elle n'est qu'un cas particulier de la dérivabilité en général, la dérivabilité à gauche (resp. à droite) implique la continuité à gauche (resp. à droite).



I. Dérivabilité

2. Dérivées à droite et à gauche

Remarques :

- Dire que f est dérivable à gauche ou à droite en a revient à dire que la fonction

$$\begin{aligned}\tau_{a,f} : I \setminus \{a\} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \frac{f(x) - f(a)}{x - a}\end{aligned}$$

admet une limite à gauche et à droite respectivement.

- Parce qu'elle n'est qu'un cas particulier de la dérivabilité en général, la dérivabilité à gauche (resp. à droite) implique la continuité à gauche (resp. à droite).
- Évidemment, la première condition pour que la dérivée à gauche (resp. à droite) existe est que cette limite ait un sens, donc que f soit bien définie en a et dans un voisinage à gauche (resp. à droite) de a .



I. Dérivabilité

2. Dérivées à droite et à gauche

Proposition 2 (Caractérisation de la dérivabilité par f'_d et f'_g) :

Soit $a \in I$, non égal à une des bornes de I .

$$f \text{ est dérivable en } a \iff \begin{cases} f \text{ est dérivable à gauche en } a \\ f \text{ est dérivable à droite en } a \\ f'_g(a) = f'_d(a). \end{cases}$$

Dans ce cas, $f'(a) = f'_d(a) = f'_g(a)$.



I. Dérivabilité

2. Dérivées à droite et à gauche

Si f admet une dérivée à droite et à gauche en a tel que $f'_g(a) \neq f'_d(a)$ alors $A(a; f(a))$ est appelé **point anguleux**, en lequel la courbe $\mathcal{C}_f$ admet deux demies-tangentes (représentées traditionnellement par des demi-flèches) non parallèles d'équation respective :

$$(T_{a,g}) : y = f'_g(a)(x-a) + f(a), \forall x \leq a \quad \text{et} \quad (T_{a,d}) : y = f'_d(a)(x-a) + f(a), \forall x \geq a.$$

En particulier, la fonction f n'est pas dérivable en a .




Figure 2 – En un point anguleux, la fonction est continue sans être dérivable.



I. Dérivabilité

2. Dérivées à droite et à gauche

Exemples 2 :

- ❶ La fonction $x \mapsto |x|$, bien que dérivable à gauche et à droite en 0, n'est pas dérivable en 0.



I. Dérivabilité

2. Dérivées à droite et à gauche

Exemples 2 :

- 1 La fonction $x \mapsto |x|$, bien que dérivable à gauche et à droite en 0, n'est pas dérivable en 0.
- 2 La fonction f définie par $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$ est dérivable en 0.



I. Dérivabilité

2. Dérivées à droite et à gauche

Exercice 2 :

Montrer que la fonction $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \begin{cases} \ln(1+x) & \text{si } x \geq 0 \\ \sin(x) & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

est dérivable en 0.



I. Dérivabilité

2. Dérivées à droite et à gauche

Une fonction peut n'être ni dérivable à gauche ni dérivable à droite en un point.

C'est le cas de la fonction

$$f: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$$

ATTENTION

$$x \longmapsto \begin{cases} x \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

En effet, $x \mapsto \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \sin\left(\frac{1}{x}\right)$ n'a pas de limite en 0, ni à gauche ni à droite.




Figure 3 – Une fonction peut être continue sans être dérivable ni à gauche, ni à droite.



I. Dérivabilité

3. Dérivabilité et approximation affine

Proposition 3 (Développement limité d'ordre 1) :

Soient $f : I \mapsto \mathbb{R}$ et $a \in I$.

f est dérivable en a si, et seulement si il existe $\ell \in \mathbb{R}$ et $\varepsilon : I \mapsto \mathbb{R}$ tels que :

$$\forall x \in I, f(x) = f(a) + (x - a)\ell + (x - a)\varepsilon(x) \quad \text{avec} \quad \lim_{x \rightarrow a} \varepsilon(x) = 0. \quad (1)$$

De plus, si ℓ existe alors $f'(a) = \ell$:

$$f(x) = f(a) + (x - a)f'(a) + (x - a)\varepsilon(x). \quad (2)$$



I. Dérivabilité

3. Dérivabilité et approximation affine

- La relation (2) est appelée **développement limité à l'ordre 1 de f en a** .
La fonction f est donc dérivable en a si, et seulement si elle admet un développement limité d'ordre 1 en a .



I. Dérivabilité

3. Dérivabilité et approximation affine

- La relation (2) est appelée **développement limité à l'ordre 1 de f en a** . La fonction f est donc dérivable en a si, et seulement si elle admet un développement limité d'ordre 1 en a .
- L'application affine $x \mapsto f(a) + f'(a)(x - a)$ est appelée l'approximation affine de f en a . Sa courbe représentative est la tangente de f au point d'abscisse a .



I. Dérivabilité

3. Dérivabilité et approximation affine

- La relation (2) est appelée **développement limité à l'ordre 1 de f en a** .
La fonction f est donc dérivable en a si, et seulement si elle admet un développement limité d'ordre 1 en a .
- L'application affine $x \mapsto f(a) + f'(a)(x - a)$ est appelée l'approximation affine de f en a . Sa courbe représentative est la tangente de f au point d'abscisse a .
- On peut montrer que cette approximation affine est la meilleure au point a . On verra plus tard comment contrôler l'erreur commise en remplaçant $f(x)$ par $f(a) + (x - a)f'(a)$.
Graphiquement, cela revient à approcher le point M de $\mathcal{C}_f$ par le point M' de la tangente en a .



I. Dérivabilité

3. Dérivabilité et approximation affine




Figure 4 – La tangente est la meilleure approximation affine de f au point a .



I. Dérivabilité

3. Dérivabilité et approximation affine

Exemple 3 :

Par approximation affine

$$\sqrt{4,001} = \sqrt{4 + 0,001} \simeq \sqrt{4} + \frac{1}{2\sqrt{4}} 0,001 = 2,00025.$$

La calculatrice donne $\sqrt{4,001} \simeq 2,0002499$.



II. Fonctions dérivables

1 Dérivabilité

2 Fonctions dérivables

- Stabilité algébrique
- Dérivabilité d'une composée
- Dérivabilité de la réciproque
- Dérivée d'ordre supérieur

3 Théorème des accroissements finis

4 Applications

5 Fonctions à valeurs complexes



II. Fonctions dérivables

1. Stabilité algébrique

Proposition 4 :

Soient I un intervalle ou une réunion d'intervalles de $\mathbb{R}$ et $a \in I$.

- ④ Toute combinaison linéaire $\lambda f + g$ de fonctions dérivables en a est une fonction dérivable en a et

$$(\lambda f + g)'(a) = \lambda f'(a) + g'(a).$$

II. Fonctions dérivables

1. Stabilité algébrique

Proposition 4 :

Soient I un intervalle ou une réunion d'intervalles de $\mathbb{R}$ et $a \in I$.

- ➊ Toute combinaison linéaire $\lambda f + g$ de fonctions dérivables en a est une fonction dérivable en a et

$$(\lambda f + g)'(a) = \lambda f'(a) + g'(a).$$

- ➋ Le produit de deux fonctions dérivables en a est une fonction dérivable en a et

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

II. Fonctions dérivables

1. Stabilité algébrique

Proposition 4 :

Soient I un intervalle ou une réunion d'intervalles de $\mathbb{R}$ et $a \in I$.

- ❶ Toute combinaison linéaire $\lambda f + g$ de fonctions dérivables en a est une fonction dérivable en a et

$$(\lambda f + g)'(a) = \lambda f'(a) + g'(a).$$

- ❷ Le produit de deux fonctions dérivables en a est une fonction dérivable en a et

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

- ❸ L'inverse d'une fonction dérivable en a et *ne s'annulant pas en a* est une fonction dérivable en a et

$$\left(\frac{1}{f}\right)'(a) = -\frac{f'(a)}{f^2(a)}.$$

II. Fonctions dérivables

1. Stabilité algébrique

Proposition 4 :

Soient I un intervalle ou une réunion d'intervalles de $\mathbb{R}$ et $a \in I$.

- ② Le produit de deux fonctions dérivables en a est une fonction dérivable en a et

$$(fg)'(a) = f'(a)g(a) + f(a)g'(a).$$

- ③ L'inverse d'une fonction dérivable en a et *ne s'annulant pas en a* est une fonction dérivable en a et

$$\left(\frac{1}{f}\right)'(a) = -\frac{f'(a)}{f^2(a)}.$$

- ④ Le quotient de deux fonctions dérivables en a dont *le dénominateur ne s'annule pas en a* est une fonction dérivable en a et

$$\left(\frac{f}{g}\right)'(a) = \frac{f'(a)g(a) - f(a)g'(a)}{g^2(a)}.$$



II. Fonctions dérivables

1. Stabilité algébrique

Exercice 3 :

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $h : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \longmapsto \begin{cases} -(x-a)^2 & \text{si } x < a \\ (x-a)^2 & \text{si } x \geq a \end{cases}$$

- ❶ Démontrer que h est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.



II. Fonctions dérivables

1. Stabilité algébrique

Exercice 3 :

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $h : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$

$$x \longmapsto \begin{cases} -(x-a)^2 & \text{si } x < a \\ (x-a)^2 & \text{si } x \geq a \end{cases}$$

- ❶ Démontrer que h est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
- ❷ La fonction h' est-elle dérivable sur $\mathbb{R}$?



II. Fonctions dérivables

2. Dérivabilité d'une composée

Proposition 5 :

Soient I un intervalle ou une réunion d'intervalles de $\mathbb{R}$ et $a \in I$.

La composée d'une fonction dérivable f en a et d'une fonction dérivable g en $f(a)$ est une fonction dérivable en a et

$$(g \circ f)'(a) = f'(a) \times (g' \circ f)(a).$$



II. Fonctions dérivables

2. Dérivabilité d'une composée

Proposition 5 :

Soient I un intervalle ou une réunion d'intervalles de $\mathbb{R}$ et $a \in I$.

La composée d'une fonction dérivable f en a et d'une fonction dérivable g en $f(a)$ est une fonction dérivable en a et

$$(g \circ f)'(a) = f'(a) \times (g' \circ f)(a).$$

Exercice 4 :

Étudier la dérivabilité de la fonction f définie par :

$$f(x) = \ln \left(x + \sqrt{x(1-x)} \right).$$

Donner sa dérivée le cas échéant.



II. Fonctions dérivables

3. Dérivabilité de la réciproque

Théorème 6 (Continuité et dérivabilité de la réciproque) :

Soit $f : I \rightarrow J$ une bijection où I et J sont deux **intervalles** de $\mathbb{R}$.

Si f est dérivable sur I et si f' ne s'annule pas sur I alors f^{-1} est dérivable sur J et on a :

$$\forall b \in J, (f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))} = \frac{1}{f'(a)} \quad \text{où } b = f(a).$$



II. Fonctions dérivables

3. Dérivabilité de la réciproque

Théorème 6 (Continuité et dérivabilité de la réciproque) :

Soit $f : I \mapsto J$ une bijection où I et J sont deux **intervalles** de $\mathbb{R}$.

Si f est dérivable sur I et si f' ne s'annule pas sur I alors f^{-1} est dérivable sur J et on a :

$$\forall b \in J, (f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))} = \frac{1}{f'(a)} \quad \text{où } b = f(a).$$

Définition 3 (Difféomorphisme) :

On appelle **difféomorphisme** toute bijection dérivable entre deux ouverts de $\mathbb{R}$ dont la bijection réciproque est dérivable.



II. Fonctions dérivables

3. Dérivabilité de la réciproque

Théorème 6 (Continuité et dérivabilité de la réciproque) :

Soit $f : I \rightarrow J$ une bijection où I et J sont deux **intervalles** de $\mathbb{R}$.

Si f est dérivable sur I et si f' ne s'annule pas sur I alors f^{-1} est dérivable sur J et on a :

$$\forall b \in J, (f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(f^{-1}(b))} = \frac{1}{f'(a)} \quad \text{où } b = f(a).$$

Définition 3 (Difféomorphisme) :

On appelle **difféomorphisme** toute bijection dérivable entre deux ouverts de $\mathbb{R}$ dont la bijection réciproque est dérivable.

Le **théorème (6)** affirme donc que les bijections dérivables dont la dérivée ne s'annule pas sur un intervalle I sont des difféomorphismes sur I .



II. Fonctions dérivables

3. Dérivabilité de la réciproque

Exemple 4 :

La fonction exponentielle $\exp : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}_+^*$ est dérivable sur $\mathbb{R}$ dont la dérivée $\exp' = \exp$ ne s'annule pas sur $\mathbb{R}$ et est strictement monotone.

La fonction $\exp$ est donc bijective et sa réciproque $\ln :]0; +\infty[\mapsto \mathbb{R}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et on a :

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \ln'(x) = \frac{1}{\exp'(\exp^{-1} x)} = \frac{1}{\exp(\exp^{-1} x)} = \frac{1}{x}.$$



II. Fonctions dérivables

3. Dérivabilité de la réciproque

Remarques :

- Dans un repère orthonormé, $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ sont symétriques par rapport à $\Delta : y = x$.

La tangente à $\mathcal{C}_f$ en a a pour coefficient directeur $f'(a)$, celle à $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ en $b = f(a)$ a pour coefficient directeur $\frac{1}{f'(a)}$.

Les tangentes sont donc, elles-aussi symétriques par rapport à $\Delta : y = x$.



II. Fonctions dérivables

3. Dérivabilité de la réciproque

Remarques :

- Dans un repère orthonormé, $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ sont symétriques par rapport à $\Delta : y = x$.

La tangente à $\mathcal{C}_f$ en a a pour coefficient directeur $f'(a)$, celle à $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ en $b = f(a)$ a pour coefficient directeur $\frac{1}{f'(a)}$.

Les tangentes sont donc, elles-aussi symétriques par rapport à $\Delta : y = x$.

- Moyen mnémotechnique :

Comme $f \circ f^{-1} = I_d$ alors en utilisant la formule de dérivation d'une fonction composée, $(f^{-1})' \times f' \circ f^{-1} = 1$ et donc $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$.

Ce moyen permet de retrouver la formule, mais ne démontre pas la dérivabilité de f^{-1} .



II. Fonctions dérivables

3. Dérivabilité de la réciproque

Remarques :

- Dans un repère orthonormé, $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ sont symétriques par rapport à $\Delta : y = x$.
La tangente à $\mathcal{C}_f$ en a a pour coefficient directeur $f'(a)$, celle à $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ en $b = f(a)$ a pour coefficient directeur $\frac{1}{f'(a)}$.
Les tangentes sont donc, elles-aussi symétriques par rapport à $\Delta : y = x$.
- Moyen mnémotechnique :
Comme $f \circ f^{-1} = I_d$ alors en utilisant la formule de dérivation d'une fonction composée, $(f^{-1})' \times f' \circ f^{-1} = 1$ et donc $(f^{-1})' = \frac{1}{f' \circ f^{-1}}$.
Ce moyen permet de retrouver la formule, mais ne démontre pas la dérivabilité de f^{-1} .
- Si $f'(a) = 0$, alors, la démonstration précédente prouve que f^{-1} **n'est pas dérivable en b** .
Graphiquement, $\mathcal{C}_f$ admet une tangente horizontale au point $M(a; b)$ où $b = f(a)$.
Par symétrie, on en déduit que $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ admet une tangente verticale au point $M(b; a)$.



II. Fonctions dérivables

3. Dérivabilité de la réciproque

Exemple 5 :

$f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ est bijective et continue sur $\mathbb{R}_+$. Sa réciproque

$$x \mapsto x^2$$

$f^{-1} : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ est définie et continue sur $\mathbb{R}_+$ mais n'est pas dérivable sur $\mathbb{R}_+$

$$x \mapsto \sqrt{x}$$

car $f'(x) = 2x$ s'annule pour $x = 0$.

D'après le théorème de dérivabilité de la fonction réciproque f^{-1} est donc dérivable sur $\mathbb{R}_+ \setminus \{f(0)\}$, et pour $y \in \mathbb{R}_+^*$,

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))} = \frac{1}{2\sqrt{y}}.$$



II. Fonctions dérivables

3. Dérivabilité de la réciproque

Exercice 5 :

Soit $\varphi : x \mapsto x + e^x$.

- 1 Montrer que φ définit une bijection de $\mathbb{R}$ sur un ensemble J à déterminer.



II. Fonctions dérivables

3. Dérivabilité de la réciproque

Exercice 5 :

Soit $\varphi : x \mapsto x + e^x$.

- ❶ Montrer que φ définit une bijection de $\mathbb{R}$ sur un ensemble J à déterminer.
- ❷ Justifier que φ^{-1} est dérivable sur J .



II. Fonctions dérivables

3. Dérivabilité de la réciproque

Exercice 5 :

Soit $\varphi : x \mapsto x + e^x$.

- ❶ Montrer que φ définit une bijection de $\mathbb{R}$ sur un ensemble J à déterminer.
- ❷ Justifier que φ^{-1} est dérivable sur J .
- ❸ Déterminer $(\varphi^{-1})'(1)$.



II. Fonctions dérivables

4. Dérivée d'ordre supérieur

Définition 4 (Dérivée n -ième) :

Soient I une réunion d'intervalles et $f : I \mapsto \mathbb{K}$. On définit récursivement :

■ $f^{(0)} = f$



II. Fonctions dérivables

4. Dérivée d'ordre supérieur

Définition 4 (Dérivée n -ième) :

Soient I une réunion d'intervalles et $f : I \mapsto \mathbb{K}$. On définit récursivement :

- $f^{(0)} = f$
- $\forall n \in \mathbb{N}$, si $f^{(n)}$ est dérivable, $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$.

Si, pour tout $k \leq n$, la fonction $f^{(k)}$ existe, on dit que f est n fois dérivable sur I et on appelle $f^{(n)}$ la dérivée $n^{\text{ème}}$ de f sur I .

On note $\mathcal{D}^n(I; \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions définies et n fois dérivables sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$.



II. Fonctions dérivables

4. Dérivée d'ordre supérieur

Définition 4 (Dérivée n -ième) :

Soient I une réunion d'intervalles et $f : I \mapsto \mathbb{K}$. On définit récursivement :

- $f^{(0)} = f$
- $\forall n \in \mathbb{N}$, si $f^{(n)}$ est dérivable, $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$.

Si, pour tout $k \leq n$, la fonction $f^{(k)}$ existe, on dit que f est n fois dérivable sur I et on appelle $f^{(n)}$ la dérivée $n^{\text{ème}}$ de f sur I .

On note $\mathcal{D}^n(I; \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions définies et n fois dérivables sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$.

Définition 5 (Fonction de classe $\mathcal{C}^n$) :

Une fonction f est dite :

- de classe $\mathcal{C}^n$ sur un intervalle I si elle est n fois dérivable sur I et que $f^{(n)}$ est continue.

II. Fonctions dérivables

4. Dérivée d'ordre supérieur

Définition 4 (Dérivée n -ième) :

Soient I une réunion d'intervalles et $f : I \mapsto \mathbb{K}$. On définit récursivement :

- $f^{(0)} = f$
- $\forall n \in \mathbb{N}$, si $f^{(n)}$ est dérivable, $f^{(n+1)} = (f^{(n)})'$.

Si, pour tout $k \leq n$, la fonction $f^{(k)}$ existe, on dit que f est n fois dérivable sur I et on appelle $f^{(n)}$ la dérivée $n^{\text{ème}}$ de f sur I .

On note $\mathcal{D}^n(I; \mathbb{K})$ l'ensemble des fonctions définies et n fois dérivables sur I à valeurs dans $\mathbb{K}$.

Définition 5 (Fonction de classe $\mathcal{C}^n$) :

Une fonction f est dite :

- de classe $\mathcal{C}^n$ sur un intervalle I si elle est n fois dérivable sur I et que $f^{(n)}$ est continue.
- de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur un intervalle I si elle est de classe $\mathcal{C}^n$ sur I pour tout $n \in \mathbb{N}$.

II. Fonctions dérivables

4. Dérivée d'ordre supérieur

Notation et remarques : Soit I une réunion d'intervalles non triviaux et $n \in \mathbb{N}$.

- Les fonctions de classe $\mathcal{D}^0$ sont les fonctions définies sur I .



II. Fonctions dérivables

4. Dérivée d'ordre supérieur

Notation et remarques : Soit I une réunion d'intervalles non triviaux et $n \in \mathbb{N}$.

- Les fonctions de classe $\mathcal{D}^0$ sont les fonctions définies sur I .
- Les fonctions de classe $\mathcal{C}^0$ sont les fonctions continues sur I .



II. Fonctions dérivables

4. Dérivée d'ordre supérieur

Notation et remarques : Soit I une réunion d'intervalles non triviaux et $n \in \mathbb{N}$.

- Les fonctions de classe $\mathcal{D}^0$ sont les fonctions définies sur I .
- Les fonctions de classe $\mathcal{C}^0$ sont les fonctions continues sur I .
- Les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sont les fonctions (définies, continues,) dérivables sur I et de dérivées (définies et) continues sur I .

Remarquez que la dérivabilité ne suffit pas à obtenir la classe $\mathcal{C}^1$.



II. Fonctions dérivables

4. Dérivée d'ordre supérieur

Notation et remarques : Soit I une réunion d'intervalles non triviaux et $n \in \mathbb{N}$.

- Les fonctions de classe $\mathcal{D}^0$ sont les fonctions définies sur I .
- Les fonctions de classe $\mathcal{C}^0$ sont les fonctions continues sur I .
- Les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sont les fonctions (définies, continues,) dérivables sur I et de dérivées (définies et) continues sur I .

Remarquez que la dérivabilité ne suffit pas à obtenir la classe $\mathcal{C}^1$.

- On note $\mathcal{D}^\infty(I; \mathbb{K})$ les fonctions n fois dérivables pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Il est facile de montrer que

$$\mathcal{C}^\infty(I; \mathbb{K}) = \mathcal{D}^\infty(I; \mathbb{K}) \quad \text{et} \quad \mathcal{C}^\infty(I; \mathbb{K}) = \bigcap_{k \geq 0} \mathcal{C}^k(I; \mathbb{K}).$$



II. Fonctions dérivables

4. Dérivée d'ordre supérieur

Notation et remarques : Soit I une réunion d'intervalles non triviaux et $n \in \mathbb{N}$.

- Les fonctions de classe $\mathcal{D}^0$ sont les fonctions définies sur I .
- Les fonctions de classe $\mathcal{C}^0$ sont les fonctions continues sur I .
- Les fonctions de classe $\mathcal{C}^1$ sont les fonctions (définies, continues,) dérivables sur I et de dérivées (définies et) continues sur I .

Remarquez que la dérivabilité ne suffit pas à obtenir la classe $\mathcal{C}^1$.

- On note $\mathcal{D}^\infty(I; \mathbb{K})$ les fonctions n fois dérivables pour tout $n \in \mathbb{N}$.
Il est facile de montrer que

$$\mathcal{C}^\infty(I; \mathbb{K}) = \mathcal{D}^\infty(I; \mathbb{K}) \quad \text{et} \quad \mathcal{C}^\infty(I; \mathbb{K}) = \bigcap_{k \geq 0} \mathcal{C}^k(I; \mathbb{K}).$$

- Soit $k \in \mathbb{N}^*$. On a la suite d'inclusions ensemblistes :

$$\mathcal{C}^\infty \subsetneq \dots \subsetneq \mathcal{C}^{k+1} \subsetneq \mathcal{D}^{k+1} \subsetneq \mathcal{C}^k \subsetneq \mathcal{D}^k \subsetneq \dots \subsetneq \mathcal{C}^1 \subsetneq \mathcal{D}^1 \subsetneq \mathcal{C}^0 \subsetneq \mathcal{D}^0 \subsetneq \mathbb{K}^I = \mathcal{F}(I; \mathbb{K}).$$

Les inclusions sont strictes.



II. Fonctions dérivables

4. Dérivée d'ordre supérieur

Exemple 6 :

L'exponentielle, les fonctions sinus, cosinus, les polynômes, les fractions rationnelles, le logarithme sur leur ensemble de définition sont de classe $\mathcal{C}^\infty$.

De manière générale, la plupart des fonctions que l'on nomme « usuelles » ou « de référence » sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur leur ensemble de définition ou, à défaut, sur l'intérieur de celui-ci.



II. Fonctions dérivables

4. Dérivée d'ordre supérieur

Exemple 6 :

L'exponentielle, les fonctions sinus, cosinus, les polynômes, les fractions rationnelles, le logarithme sur leur ensemble de définition sont de classe $\mathcal{C}^\infty$.

De manière générale, la plupart des fonctions que l'on nomme « usuelles » ou « de référence » sont de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur leur ensemble de définition ou, à défaut, sur l'intérieur de celui-ci.

Exercice 6 :

Soit $f : x \mapsto x^n$ et $k \in \mathbb{N}$.

Pour tout $k \leq n$, montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f^{(k)}(x) = \frac{n!}{(n-k)!} x^{n-k}$.



II. Fonctions dérivables

4. Dérivée d'ordre supérieur

Proposition 7 (Stabilité de $\mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$) :

Soient $n \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ et I, J des réunions d'intervalles non triviaux de $\mathbb{R}$.

$\mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$ est stable par combinaisons linéaires :

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall f, g \in \mathcal{C}^n(I; \mathbb{K}),$$

$$\lambda f + g \in \mathcal{C}^n(I; \mathbb{K}) \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, (\lambda f + g)^{(n)} = \lambda f^{(n)} + g^{(n)}.$$



II. Fonctions dérivables

4. Dérivée d'ordre supérieur

Proposition 1 (Stabilité de $\mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$) :

Soient $n \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ et I, J des réunions d'intervalles non triviaux de $\mathbb{R}$.

$\mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$ est stable par combinaisons linéaires :

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall f, g \in \mathcal{C}^n(I; \mathbb{K}),$$

$$\lambda f + g \in \mathcal{C}^n(I; \mathbb{K}) \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, (\lambda f + g)^{(n)} = \lambda f^{(n)} + g^{(n)}.$$

$\mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$ est stable par produit :

$$\forall f, g \in \mathcal{C}^n(I; \mathbb{K}),$$

$$f \times g \in \mathcal{C}^n(I; \mathbb{K}) \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, (fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)} \times g^{(n-k)}.$$

(Formule de Leibniz)



II. Fonctions dérivables

4. Dérivée d'ordre supérieur

Proposition 7 (Stabilité de $\mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$) :

$\mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$ est « stable » par quotient et composition :



II. Fonctions dérivables

4. Dérivée d'ordre supérieur

Proposition 7 (Stabilité de $\mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$) :

$\mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$ est « stable » par quotient et composition :

- $\forall f, g \in \mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$, si g ne s'annule pas sur I alors $\frac{f}{g} \in \mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$.



II. Fonctions dérivables

4. Dérivée d'ordre supérieur

Proposition 7 (Stabilité de $\mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$) :

$\mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$ est « stable » par quotient et composition :

- $\forall f, g \in \mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$, si g ne s'annule pas sur I alors $\frac{f}{g} \in \mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$.
- $\forall f \in \mathcal{C}^n(I; J)$ et $g \in \mathcal{C}^n(J; \mathbb{K})$, $g \circ f \in \mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$.



II. Fonctions dérivables

4. Dérivée d'ordre supérieur

Proposition 7 (Stabilité de $\mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$) :

$\mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$ est « stable » par quotient et composition :

- $\forall f, g \in \mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$, si g ne s'annule pas sur I alors $\frac{f}{g} \in \mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$.
- $\forall f \in \mathcal{C}^n(I; J)$ et $g \in \mathcal{C}^n(J; \mathbb{K})$, $g \circ f \in \mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$.

$\mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$ est **presque stable par réciprocité** :

Soient I un **intervalle** et $f \in \mathcal{C}^n(I; \mathbb{R})$ une bijection de I sur $f(J)$.
Si f' ne s'annule pas sur I alors $f^{-1} \in \mathcal{C}^n(J; I)$.



II. Fonctions dérivables

4. Dérivée d'ordre supérieur

Proposition 7 (Stabilité de $\mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$) :

$\mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$ est « stable » par quotient et composition :

- $\forall f, g \in \mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$, si g ne s'annule pas sur I alors $\frac{f}{g} \in \mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$.
- $\forall f \in \mathcal{C}^n(I; J)$ et $g \in \mathcal{C}^n(J; \mathbb{K})$, $g \circ f \in \mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$.

$\mathcal{C}^n(I; \mathbb{K})$ est **presque stable par réciprocité** :

Soient I un **intervalle** et $f \in \mathcal{C}^n(I; \mathbb{R})$ une bijection de I sur $f(J)$.
Si f' ne s'annule pas sur I alors $f^{-1} \in \mathcal{C}^n(J; I)$.

Tous les assertions précédentes restent vraies si l'on remplace $\mathcal{C}^k$ par $\mathcal{D}^k$.



II. Fonctions dérivables

4. Dérivée d'ordre supérieur

Remarques :

- Il existe une formule explicite pour la dérivée d'ordre n d'une composition (formule de Faà di Bruno), mais cette formule est fort complexe et tout à fait inutile à retenir en PTSI.

$$(f \circ g)^{(n)} = \sum_{\substack{(m_1, m_2, \dots, m_n) \in \mathbb{N}^n \\ 1m_1 + 2m_2 + \dots + nm_n = n}} \frac{n!}{m_1! m_2! \dots m_n!} \prod_{k=1}^n \left(\frac{f^{(k)}}{k!} \right) \times g^{(m_1 + m_2 + \dots + m_n)} \circ f.$$



II. Fonctions dérivables

4. Dérivée d'ordre supérieur

Remarques :

- Il existe une formule explicite pour la dérivée d'ordre n d'une composition (formule de Faà di Bruno), mais cette formule est fort complexe et tout à fait inutile à retenir en PTSI.

$$(f \circ g)^{(n)} = \sum_{\substack{(m_1, m_2, \dots, m_n) \in \mathbb{N}^n \\ 1m_1 + 2m_2 + \dots + nm_n = n}} \frac{n!}{m_1! m_2! \dots m_n!} \prod_{k=1}^n \left(\frac{f^{(k)}}{k!} \right) \times g^{(m_1 + m_2 + \dots + m_n)} \circ f.$$

- Une bijection de classe $\mathcal{C}^k$ dont la bijection réciproque est aussi de classe $\mathcal{C}^k$ est appelée un $\mathcal{C}^k$ -difféomorphisme.



II. Fonctions dérivables

4. Dérivée d'ordre supérieur

Exemples 1 :

- La fonction $\exp \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R};]0; +\infty[)$ et, $\forall x \in \mathbb{R}$, $\exp'(x) = \exp(x) \neq 0$.
La fonction $\exp$ établit donc une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\exp(\mathbb{R}) =]0; +\infty[$.
Sa bijection réciproque, la fonction $\ln$, est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0; +\infty[$.



II. Fonctions dérivables

4. Dérivée d'ordre supérieur

Exemples 1 :

- La fonction $\exp \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R};]0; +\infty[)$ et, $\forall x \in \mathbb{R}$, $\exp'(x) = \exp(x) \neq 0$.
La fonction $\exp$ établit donc une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\exp(\mathbb{R}) =]0; +\infty[$.
Sa bijection réciproque, la fonction $\ln$, est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0; +\infty[$.
- La fonction $\tan_{]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[} \in \mathcal{C}^\infty\left(\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[\right]; \mathbb{R}\right)$ et, $\forall x \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[\right]$,
 $\tan'(x) = 1 + \tan^2(x) \neq 0$.
La fonction $\tan_{]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[}$ établit donc une bijection de $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[\right]$ dans
 $\tan_{]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[}\left(\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[\right) = \mathbb{R}$.
Sa bijection réciproque, la fonction $\arctan$, est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.



II. Fonctions dérivables

4. Dérivée d'ordre supérieur

Exemples 1 :

- La fonction $\exp \in \mathcal{C}^\infty(\mathbb{R};]0; +\infty[)$ et, $\forall x \in \mathbb{R}$, $\exp'(x) = \exp(x) \neq 0$.
La fonction $\exp$ établit donc une bijection de $\mathbb{R}$ dans $\exp(\mathbb{R}) =]0; +\infty[$.
Sa bijection réciproque, la fonction $\ln$, est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $]0; +\infty[$.
- La fonction $\tan|_{]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[} \in \mathcal{C}^\infty\left(\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[\right]; \mathbb{R}\right)$ et, $\forall x \in \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[\right]$,
 $\tan'(x) = 1 + \tan^2(x) \neq 0$.
La fonction $\tan|_{]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[}$ établit donc une bijection de $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[\right]$ dans
 $\tan|_{]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[}\left(\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}[\right) = \mathbb{R}$.
Sa bijection réciproque, la fonction $\arctan$, est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$.
- La fonction $\cos|_{]0; \pi[} \in \mathcal{C}^\infty(]0; \pi[; \mathbb{R})$ et, $\forall x \in]0; \pi[$, $\cos'(x) = -\sin(x) \neq 0$.
La fonction $\cos|_{]0; \pi[}$ établit donc une bijection de $]0; \pi[$ dans
 $\cos|_{]0; \pi[}(]0; \pi[) =]-1; 1[$.
Sa bijection réciproque, la fonction $\arccos$, est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $] -1; 1[$.



III. Théorème des accroissements finis

1 Dérivabilité

2 Fonctions dérivables

3 Théorème des accroissements finis

- Extrema
- Théorème de Rolle
- Théorème des accroissements finis

4 Applications

5 Fonctions à valeurs complexes



III. Théorème des accroissements finis

1. Extrema

Théorème 8 (Condition nécessaire d'extremum) :

Soit $f : [a; b] \mapsto \mathbb{R}$ dérivable en un point intérieur $c \in]a; b[$.

Si f admet un extremum local en c , alors $f'(c) = 0$.

On dit alors que c est un point critique ou stationnaire (de f).



III. Théorème des accroissements finis

1. Extrema

Théorème 8 (Condition nécessaire d'extremum) :

Soit $f : [a; b] \mapsto \mathbb{R}$ dérivable en un point intérieur $c \in]a; b[$.

Si f admet un extremum local en c , alors $f'(c) = 0$.

On dit alors que c est un **point critique** ou **stationnaire** (de f).

En un point critique, la courbe représentative de la fonction admet une tangente parallèle à l'axe des abscisses.




III. Théorème des accroissements finis

1. Extrema

ATTENTION

La réciproque de ce théorème est fausse : l'annulation de la dérivée n'est qu'une condition **nécessaire**.

La fonction cube $f : x \mapsto x^3$ admet un point critique en 0 sans que ce ne soit un extremum.



III. Théorème des accroissements finis

1. Extrema

ATTENTION

L'existence d'un extremum n'entraîne en rien la dérivabilité en ce point.

La valeur absolue admet un minimum en 0 où elle n'est pas dérivable.



III. Théorème des accroissements finis

1. Extrema

ATTENTION

L'existence d'un extremum n'entraîne en rien la dérivabilité en ce point.

La valeur absolue admet un minimum en 0 où elle n'est pas dérivable.

ATTENTION

C'est évidemment faux si c n'est pas intérieur (cas d'un extremum sur le bord).

Par exemple la fonction $x \mapsto 1 + x$ admet un maximum sur $[0; 1]$ en $c = 1$ mais $f'(c) = 1 \neq 0$.

C'est un peu pour cela que l'on préfère regarder des intervalles ouverts lorsqu'on parle de dérivabilité.



III. Théorème des accroissements finis

1. Extrema

Exercice 7 :

Étudier la continuité et la dérivabilité de la fonction

$$f : x \mapsto \begin{cases} |x|^a \sin\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 0 & \text{si } x = 0 \end{cases} \quad (a > 0).$$



III. Théorème des accroissements finis

2. Théorème de Rolle

Théorème 9 (Théorème de Rolle ^[2]) :

Soit $f : [a; b] \mapsto \mathbb{R}$ est continue sur $[a; b]$, dérivable sur $]a; b[$.

Si $f(a) = f(b)$, alors il existe $c \in]a; b[$ tel que $f'(c) = 0$.




Figure 5 – La courbe d’une fonction dérivable prenant une même valeur en deux points admet une tangente horizontale entre ces derniers.



III. Théorème des accroissements finis

2. Théorème de Rolle




Figure 6 – La condition $f(a) = f(b)$ est nécessaire.




Figure 7 – La continuité est nécessaire.




Figure 8 – La dérivabilité est nécessaire.



III. Théorème des accroissements finis

2. Théorème de Rolle

Remarques :

- Ce théorème est faux si f n'est pas continue en a ou en b . On ne peut se contenter de la dérivabilité sur $]a; b[$ qui entraîne seulement la continuité de f sur $]a; b[$ ouvert.

Il suffit de prendre $f(x) = x$ sur $[0; 1[$ et $f(1) = 0$.



III. Théorème des accroissements finis

2. Théorème de Rolle

Remarques :

- Ce théorème est faux si f n'est pas continue en a ou en b . On ne peut se contenter de la dérivabilité sur $]a; b[$ qui entraîne seulement la continuité de f sur $]a; b[$ ouvert.

Il suffit de prendre $f(x) = x$ sur $[0; 1[$ et $f(1) = 0$.

- Ce théorème est faux si f est à valeurs complexes car l'ingrédient principal est le **théorème des valeurs intermédiaires**.

Par exemple $t \mapsto f(t) = e^{it}$ vérifie $f(0) = f(2\pi)$ mais $f'(t) = i e^{it}$ ne s'annule jamais sur $[0; 2\pi]$.



III. Théorème des accroissements finis

2. Théorème de Rolle

Remarques :

- Ce théorème est faux si f n'est pas continue en a ou en b . On ne peut se contenter de la dérivabilité sur $]a; b[$ qui entraîne seulement la continuité de f sur $]a; b[$ ouvert.

Il suffit de prendre $f(x) = x$ sur $[0; 1[$ et $f(1) = 0$.

- Ce théorème est faux si f est à valeurs complexes car l'ingrédient principal est le **théorème des valeurs intermédiaires**.

Par exemple $t \mapsto f(t) = e^{it}$ vérifie $f(0) = f(2\pi)$ mais $f'(t) = ie^{it}$ ne s'annule jamais sur $[0; 2\pi]$.

Exemple 8 :

Si $f \in \mathcal{C}^2([a; b]; \mathbb{R})$ et $f(a) = f(b) = f'(a) = 0$ alors f'' s'annule sur $]a; b[$.



III. Théorème des accroissements finis

2. Théorème de Rolle

Exercice 8 :

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ et deux fois dérivable sur $]a, b[$ ($a < b$).

Montrer qu'il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) = f(a) + (b - a)f'(a) + \frac{(b - a)^2}{2}f''(c)$.



III. Théorème des accroissements finis

3. Théorème des accroissements finis

Théorème 10 (Égalité des accroissements finis) :

Soit $f : [a; b] \mapsto \mathbb{R}$ continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$. ($a < b$)

Alors, il existe $c \in]a; b[$ tel que :

$$f(b) - f(a) = (b - a)f'(c) \iff f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$



III. Théorème des accroissements finis

3. Théorème des accroissements finis

Théorème 10 (Égalité des accroissements finis) :

Soit $f : [a; b] \mapsto \mathbb{R}$ continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$. ($a < b$)

Alors, il existe $c \in]a; b[$ tel que :

$$f(b) - f(a) = (b - a)f'(c) \iff f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Le théorème des accroissements finis généralise donc le théorème de Rolle.



III. Théorème des accroissements finis

3. Théorème des accroissements finis

Théorème 10 (Égalité des accroissements finis) :

Soit $f : [a; b] \mapsto \mathbb{R}$ continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$. ($a < b$)

Alors, il existe $c \in]a; b[$ tel que :

$$f(b) - f(a) = (b - a)f'(c) \iff f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Le théorème des accroissements finis généralise donc le théorème de Rolle.




Figure 9 – La courbe d'une fonction dérivable passant par deux points A et B admet une tangente parallèle à la droite (AB) entre ces derniers.



III. Théorème des accroissements finis

3. Théorème des accroissements finis

Théorème II (Inégalité des accroissements finis) :

Soit $f : [a; b] \mapsto \mathbb{R}$ continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$.

S'il existe deux réels m et M tels que $\forall x \in]a; b[, \quad m \leq f'(x) \leq M$ alors

$$m(b - a) \leq f(b) - f(a) \leq M(b - a).$$

Un peu de physique^[3] : Ces inégalités ont une interprétation cinématique assez évidente : si on court, par exemple, deux heures avec une vitesse oscillant entre 7 et 12 kilomètres par heure, on aura sûrement parcouru entre 14 et 24 kilomètres.

[3]. Pas trop compliquée



III. Théorème des accroissements finis

3. Théorème des accroissements finis

Exercice 9 :

Trouver un majorant de l'erreur commise en remplaçant $\sqrt{10001}$ par 100.



III. Théorème des accroissements finis

3. Théorème des accroissements finis

Le **théorème (11)** est souvent employé en se contentant de l'hypothèse que f' est bornée sur $[a; b]$:

$$\exists M \in \mathbb{R}_+, \forall x \in [a; b], \quad |f'(x)| \leq M.$$

Ceci donne de l'importance à une certaine classe de fonctions :

Exemple 9 (Fonctions lipschitziennes) :

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ et soit $k \in \mathbb{R}_+^*$ alors f est lipschitzienne de rapport k sur I si :

$$\forall (x; y) \in I^2 / x \neq y, \quad \left| \frac{f(y) - f(x)}{x - y} \right| \leq k.$$

Or, $\forall (x; y) \in I^2$, tels que $x \neq y$, $\frac{f(y) - f(x)}{x - y}$ représente la pente de la corde passant par les points $M(x; f(x))$ et $N(y; f(y))$.

Ainsi, f est lipschitzienne si les pentes de toutes les cordes de $\mathcal{C}_f$ sont bornées.

En gros, pas de trop grandes variations des images pour une variation donnée des antécédents.

Les fonctions lipschitziennes ont une croissance somme toute modérée.

III. Théorème des accroissements finis

3. Théorème des accroissements finis

Exemples 10 :

- Une fonction constante sur un intervalle I est 0-lipschitzienne sur I .



III. Théorème des accroissements finis

3. Théorème des accroissements finis

Exemples 10 :

- Une fonction constante sur un intervalle I est 0-lipschitzienne sur I .
- Grâce à l'inégalité triangulaire, $f : x \mapsto |x|$ est 1-lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.



III. Théorème des accroissements finis

3. Théorème des accroissements finis

Exemples 10 :

- Une fonction constante sur un intervalle I est 0-lipschitzienne sur I .
- Grâce à l'inégalité triangulaire, $f : x \mapsto |x|$ est 1-lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.
- Pour tout réel x , $\sin'(x) = \cos(x)$ et donc $|\sin'(x)| \leq 1$.

On en déduit que pour tous réels x et y ,

$$|\sin(x) - \sin(y)| \leq |x - y|.$$

De la même façon, on montre que $|\cos(x) - \cos(y)| \leq |x - y|$.

Les fonctions $\cos$ et $\sin$ sont 1-lipschitziennes.



III. Théorème des accroissements finis

3. Théorème des accroissements finis

Exemples 10 :

- Une fonction constante sur un intervalle I est 0-lipschitzienne sur I .
- Grâce à l'inégalité triangulaire, $f : x \mapsto |x|$ est 1-lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.
- Pour tout réel x , $\sin'(x) = \cos(x)$ et donc $|\sin'(x)| \leq 1$.

On en déduit que pour tous réels x et y ,

$$|\sin(x) - \sin(y)| \leq |x - y|.$$

De la même façon, on montre que $|\cos(x) - \cos(y)| \leq |x - y|$.

Les fonctions $\cos$ et $\sin$ sont 1-lipschitziennes.

- Pour tout x, y de $[1; +\infty[$, on a :

$$|\sqrt{x} - \sqrt{y}| \leq \frac{1}{2}|x - y|.$$

La fonction $\sqrt{}$ est donc $\frac{1}{2}$ -lipschitzienne sur $[1; +\infty[$.



III. Théorème des accroissements finis

3. Théorème des accroissements finis

Exercice 10 :

Montrer que la fonction $x \mapsto x^2$ n'est pas lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.



III. Théorème des accroissements finis

3. Théorème des accroissements finis

Proposition 12 :

Soit $f : [a; b] \mapsto \mathbb{R}$ est continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$.

f' est bornée sur $]a; b[$ si, et seulement si f est k -lipschitzienne sur $[a; b]$.



III. Théorème des accroissements finis

3. Théorème des accroissements finis

Proposition 12 :

Soit $f : [a; b] \mapsto \mathbb{R}$ est continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$.

f' est bornée sur $]a; b[$ si, et seulement si f est k -lipschitzienne sur $[a; b]$.

Exemple II :

Sur tout voisinage de zéro, la dérivée de $x \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas bornée donc elle ne peut y être lipschitzienne.



III. Théorème des accroissements finis

3. Théorème des accroissements finis

Proposition 12 :

Soit $f : [a; b] \mapsto \mathbb{R}$ est continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$.

f' est bornée sur $]a; b[$ si, et seulement si f est k -lipschitzienne sur $[a; b]$.

Exemple 11 :

Sur tout voisinage de zéro, la dérivée de $x \mapsto \sqrt{x}$ n'est pas bornée donc elle ne peut y être lipschitzienne.

En conséquence, si $f \in \mathcal{C}^1([a; b]; \mathbb{R})$ alors $|f(b) - f(a)| \leq \underbrace{\max_{t \in [a; b]} |f'(t)|}_k \cdot |b - a|$.

Corollaire 1 :

Toute fonction de classe $\mathcal{C}^1$ sur un **segment** est lipschitzienne sur ce segment.



III. Théorème des accroissements finis

3. Théorème des accroissements finis

Exercice II :

- ❶ Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln x < \frac{1}{x}$.



III. Théorème des accroissements finis

3. Théorème des accroissements finis

Exercice II :

❶ Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln x < \frac{1}{x}$.

❷ En déduire la nature des suites de terme général :

$$S_n = \sum_{p=1}^n \frac{1}{p} \text{ et } T_n = \sum_{p=n+1}^{kn} \frac{1}{p} \text{ (pour } k \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\} \text{ fixé).}$$



III. Théorème des accroissements finis

3. Théorème des accroissements finis

Exercice II :

❶ Montrer que $\forall x \in \mathbb{R}_+^*, \frac{1}{x+1} < \ln(x+1) - \ln x < \frac{1}{x}$.

❷ En déduire la nature des suites de terme général :

$$S_n = \sum_{p=1}^n \frac{1}{p} \text{ et } T_n = \sum_{p=n+1}^{kn} \frac{1}{p} \text{ (pour } k \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\} \text{ fixé).}$$

❸ Déterminer de même le comportement de : $\left(\sum_{p=2}^n \frac{1}{p \ln p} \right)_{n \geq 2}$



IV. Applications

1 Dérivabilité

2 Fonctions dérivables

3 Théorème des accroissements finis

4 Applications

- Caractérisation de la monotonie
- Prolongement de classe $\mathcal{C}^1$

5 Fonctions à valeurs complexes



IV. Applications

1. Caractérisation de la monotonie

Théorème 13 (Caractérisation des fonctions constantes dérivables) :

Soient I un **intervalle** et $f \in \mathcal{D}(I; \mathbb{R})$.

f est constante sur I si, et seulement si f' est identiquement nulle sur $\overset{\circ}{I}$.



IV. Applications

1. Caractérisation de la monotonie

Théorème 13 (Caractérisation des fonctions constantes dérivables) :

Soient I un **intervalle** et $f \in \mathcal{D}(I; \mathbb{R})$.

f est constante sur I si, et seulement si f' est identiquement nulle sur I .

Ce théorème, comme on le verra s'étend aux fonctions à valeurs complexes contrairement au suivant intimement lié à la relation d'ordre.



IV. Applications

1. Caractérisation de la monotonie

Théorème 13 (Caractérisation des fonctions constantes dérivables) :

Soient I un **intervalle** et $f \in \mathcal{D}(I; \mathbb{R})$.

f est constante sur I si, et seulement si f' est identiquement nulle sur $\dot{I}$.

Ce théorème, comme on le verra s'étend aux fonctions à valeurs complexes contrairement au suivant intimement lié à la relation d'ordre.

ATTENTION




Figure 10 – f est constante sur I_1 et I_2 mais n'est pas constante sur $I = I_1 \cup I_2$.



IV. Applications

1. Caractérisation de la monotonie

Théorème 14 (Caractérisation des fonctions monotones dérivables) :

Soient I un intervalle contenant au moins deux points distincts et f une fonction dérivable sur I à valeurs **réelles**.

- ❶ f est croissante sur I si, et seulement si f' est positive ou nulle sur $\overset{\circ}{I}$.



IV. Applications

1. Caractérisation de la monotonie

Théorème 14 (Caractérisation des fonctions monotones dérivables) :

Soient I un intervalle contenant au moins deux points distincts et f une fonction dérivable sur I à valeurs **réelles**.

- ❶ f est croissante sur I si, et seulement si f' est positive ou nulle sur $\overset{\circ}{I}$.
- ❷ f est strictement croissante I si, et seulement si f' est positive ou nulle et qu'il n'existe aucun intervalle $[a; b] \subset \overset{\circ}{I}$ avec $a < b$ sur lequel f' est identiquement nulle.



IV. Applications

1. Caractérisation de la monotonie

Théorème 14 (Caractérisation des fonctions monotones dérivables) :

Soient I un intervalle contenant au moins deux points distincts et f une fonction dérivable sur I à valeurs **réelles**.

- ❶ f est croissante sur I si, et seulement si f' est positive ou nulle sur $\overset{\circ}{I}$.
- ❷ f est strictement croissante I si, et seulement si f' est positive ou nulle et qu'il n'existe aucun intervalle $[a; b] \subset \overset{\circ}{I}$ avec $a < b$ sur lequel f' est identiquement nulle.

On dispose bien sûr d'un résultat analogue sur les fonctions décroissantes.



IV. Applications

1. Caractérisation de la monotonie

Théorème 14 (Caractérisation des fonctions monotones dérivables) :

Soient I un intervalle contenant au moins deux points distincts et f une fonction dérivable sur I à valeurs **réelles**.

- ❶ f est croissante sur I si, et seulement si f' est positive ou nulle sur $\overset{\circ}{I}$.
- ❷ f est strictement croissante I si, et seulement si f' est positive ou nulle et qu'il n'existe aucun intervalle $[a; b] \subset \overset{\circ}{I}$ avec $a < b$ sur lequel f' est identiquement nulle.

On dispose bien sûr d'un résultat analogue sur les fonctions décroissantes.

Toute la puissance et la beauté de ce résultat étant de ramener l'étude des variations d'une fonctions à une simple étude de signes... de sa dérivé.



IV. Applications

1. Caractérisation de la monotonie

Remarque : En particulier si $f'(x) > 0$ pour tout $x \in \overset{\circ}{I}$ sauf peut-être en un nombre fini de points, alors f est strictement croissante sur I .



IV. Applications

1. Caractérisation de la monotonie

Remarque : En particulier si $f'(x) > 0$ pour tout $x \in \overset{\circ}{I}$ sauf peut-être en un nombre fini de points, alors f est strictement croissante sur I .

Pas de réciproque ! La fonction $x \mapsto x^3$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ alors que sa dérivée n'y est pas strictement positive et s'annule en 0.



IV. Applications

1. Caractérisation de la monotonie

Remarque : En particulier si $f'(x) > 0$ pour tout $x \in \overset{\circ}{I}$ sauf peut-être en un nombre fini de points, alors f est strictement croissante sur I .

Pas de réciproque ! La fonction $x \mapsto x^3$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ alors que sa dérivée n'y est pas strictement positive et s'annule en 0.

Dans les cas les plus fréquents, l'ensemble des points où la dérivée s'annule sera fini, mais attention à des fonctions comme la partie entière. On peut faire bien pire !



IV. Applications

1. Caractérisation de la monotonie

ATTENTION

L'hypothèse « I est un intervalle » est indispensable ici. Le théorème est faux si I est une réunion d'intervalles.

La fonction $f : x \mapsto \frac{1}{x}$ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et $\forall x \in \mathbb{R}^*$,

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0.$$

Or, la fonction f n'est pas décroissante sur $\mathbb{R}^*$:

$$f(-1) < f(1).$$




Figure 11 – f est croissante sur I_1 et I_2 donc $f' \geq 0$ mais n'est pas croissante sur $I = I_1 \cup I_2$



IV. Applications

1. Caractérisation de la monotonie

ATTENTION

On lit parfois dans la bibliographie, l'énoncé :

Si f' est strictement positive sur I , sauf éventuellement en un nombre fini de points où elle s'annule alors la fonction f est strictement croissante sur I .

Remarquez bien qu'il s'agit ici d'une simple implication au contraire de l'équivalence du théorème ci-dessus.

En effet, il existe des fonctions monotones ayant une dérivée s'annulant en une infinité de points.



IV. Applications

1. Caractérisation de la monotonie

On peut avoir $f'(a) > 0$ en un point a sans que f soit strictement croissante au voisinage de a .

C'est le cas de $f : x \mapsto x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{x}{2}$.

- On peut prolonger continument f par 0 en 0

ATTENTION



IV. Applications

1. Caractérisation de la monotonie

ATTENTION

On peut avoir $f'(a) > 0$ en un point a sans que f soit strictement croissante au voisinage de a .

C'est le cas de $f : x \mapsto x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{x}{2}$.

- On peut prolonger continument f par 0 en 0
- Bien sûr, f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et en revenant au taux d'accroissement de f , on montre aisément que $f'(0) = \frac{1}{2} > 0$.



IV. Applications

1. Caractérisation de la monotonie

ATTENTION

On peut avoir $f'(a) > 0$ en un point a sans que f soit strictement croissante au voisinage de a .

C'est le cas de $f : x \mapsto x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{x}{2}$.

- On peut prolonger continument f par 0 en 0
- Bien sûr, f est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et en revenant au taux d'accroissement de f , on montre aisément que $f'(0) = \frac{1}{2} > 0$.
- Pourtant $\forall x \in \mathbb{R}^*, f'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) + \frac{1}{2}$.
pour tout $x \in \mathbb{R}^*$, f' change donc de signe régulièrement au voisinage de 0, donc f change de sens de variation régulièrement au voisinage de 0.



IV. Applications

1. Caractérisation de la monotonie




Figure 12 – Une fonction dérivable peut avoir une dérivée strictement positive en un point sans être monotone sur un voisinage de celui-ci.



IV. Applications

2. Prolongement de classe $\mathcal{C}^1$

Rien ne permet a priori d'affirmer que les limites $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ et $\lim_{x \rightarrow a} f'(x)$ sont égales.

Conceptuellement, ces limites sont très différentes. Le théorème ci-dessous donne une réponse affirmative dans le cas où ces limites existent et que la fonction est continue en a .



IV. Applications

2. Prolongement de classe $\mathcal{C}^1$

Théorème 15 (Théorème de la limite de la dérivée) :

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur I et dérivable sur $I \setminus \{a\}$.

$$\text{Si } \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} f'(x) = \ell \in \overline{\mathbb{R}} \quad \text{alors} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell.$$

- ❶ Si $\ell \in \mathbb{R}$, alors f est dérivable en a avec $f'(a) = \ell$ i.e. f est dérivable sur I tout entier et f' est continue en a .



IV. Applications

2. Prolongement de classe $\mathcal{C}^1$

Théorème 15 (Théorème de la limite de la dérivée) :

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \mapsto \mathbb{R}$ continue sur I et dérivable sur $I \setminus \{a\}$.

$$\text{Si } \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} f'(x) = \ell \in \overline{\mathbb{R}} \quad \text{alors} \quad \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \neq a}} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \ell.$$

- ❶ Si $\ell \in \mathbb{R}$, alors f est dérivable en a avec $f'(a) = \ell$ i.e. f est dérivable sur I tout entier et f' est continue en a .
- ❷ Si $\ell = \pm\infty$, alors f n'est pas dérivable en a mais sa courbe représentative admet une tangente verticale au point d'abscisse a .



IV. Applications

2. Prolongement de classe $\mathcal{C}^1$

Exemple 12 :

La fonction f définie par $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.



IV. Applications

2. Prolongement de classe $\mathcal{C}^1$

Exemple 12 :

La fonction f définie par $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Exemple 13 :

$\arcsin$ est dérivable sur $] -1 ; 1[$ et $\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ dont la limite en $x = \pm 1$ est $+\infty$.

On retrouve ainsi que $\arcsin$ n'est pas dérivable en ± 1 et qu'il y a une tangente verticale en ces point pour la courbe.



IV. Applications

2. Prolongement de classe $\mathcal{C}^1$

Exemple 12 :

La fonction f définie par $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}} & \text{si } x > 0 \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}$ est dérivable sur $\mathbb{R}$.

Exemple 13 :

$\arcsin$ est dérivable sur $] -1 ; 1[$ et $\arcsin'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ dont la limite en $x = \pm 1$ est $+\infty$.

On retrouve ainsi que $\arcsin$ n'est pas dérivable en ± 1 et qu'il y a une tangente verticale en ces point pour la courbe.

ATTENTION

Si f' n'a pas de limite en a alors on ne peut rien dire.



IV. Applications

2. Prolongement de classe $\mathcal{C}^1$

Remarques :

- La continuité en a est une hypothèse nécessaire.

Exemple 14 :

La fonction $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable et continue sur $\mathbb{R}^*$.

$$x \mapsto \begin{cases} 0 & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$$

On a, de plus, $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0$ mais f n'est pas dérivable en 0 car $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{1}{x}$ n'existe pas.



IV. Applications

2. Prolongement de classe $\mathcal{C}^1$

Remarques :

- Le théorème de la limite de la dérivée exprime simplement les conditions d'existence d'un prolongement par continuité de la dérivée en a . *confer* le corollaire (2) .



IV. Applications

2. Prolongement de classe $\mathcal{C}^1$

Remarques :

- Le théorème de la limite de la dérivée exprime simplement les conditions d'existence d'un prolongement par continuité de la dérivée en a . *confer* le corollaire (2) .
- Si a est une extrémité de I , la limite du taux d'accroissement et la dérivabilité éventuelle sont obtenues à droite ou à gauche en a comme dans la preuve.



IV. Applications

2. Prolongement de classe $\mathcal{C}^1$

Remarques :

- Ce résultat est intéressant pour étudier la dérivabilité d'une fonction en un point où les théorèmes généraux ne s'appliquent pas sans revenir au taux d'accroissement.

Exemple 14 :

Considérons la fonction $f : x \mapsto x^2 \ln(x)$.

Cette fonction est définie et $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}_+^*$ et peut se prolonger par continuité en posant $f(0) = 0$.

Par ailleurs, $\forall x \in]0; +\infty[$, $f'(x) = 2x \ln(x) + x$ a certainement aussi une limite nulle en 0.

Le théorème de prolongement de la dérivée permet alors d'affirmer que la fonction prolongée est dérivable en 0, et que $f'(0) = 0$: de classe $\mathcal{C}^1$ donc.

Cette information est essentielle pour tracer une allure précise de la courbe au voisinage de 0.



IV. Applications

2. Prolongement de classe $\mathcal{C}^1$

Remarques :

- Le résultat reste vrai pour $f \in \mathcal{C}^0(I; \mathbb{C})$ dérivable sur $I \setminus \{a\}$ et f' ayant une limite (finie) $\ell \in \mathbb{C}$ mais est hors-programme.



IV. Applications

2. Prolongement de classe $\mathcal{C}^1$

Exercice 12 :

On définit $g : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ par $g(0) = 0$ et, $\forall x \neq 0$, $g(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

- ❶ Démontrer que g est dérivable sur $\mathbb{R}$. Donner l'expression de g' .



IV. Applications

2. Prolongement de classe $\mathcal{C}^1$

Exercice 12 :

On définit $g : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ par $g(0) = 0$ et, $\forall x \neq 0$, $g(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

- ❶ Démontrer que g est dérivable sur $\mathbb{R}$. Donner l'expression de g' .
- ❷ La fonction g' a-t-elle une limite en 0 ?



IV. Applications

2. Prolongement de classe $\mathcal{C}^1$

Exercice 12 :

On définit $g : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ par $g(0) = 0$ et, $\forall x \neq 0$, $g(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

- ❶ Démontrer que g est dérivable sur $\mathbb{R}$. Donner l'expression de g' .
- ❷ La fonction g' a-t-elle une limite en 0 ?
- ❸ Quelle est la classe de g ?



IV. Applications

2. Prolongement de classe $\mathcal{C}^1$

Corollaire 2 (Prolongement de classe $\mathcal{C}^1$) :

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \mapsto \mathbb{R}$ continue sur I et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $I \setminus \{a\}$.

Si $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \ell \in \mathbb{R}$ alors f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et $f'(a) = \ell$.



IV. Applications

2. Prolongement de classe $\mathcal{C}^1$

Corollaire 2 (Prolongement de classe $\mathcal{C}^1$) :

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $f : I \mapsto \mathbb{R}$ continue sur I et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $I \setminus \{a\}$.

Si $\lim_{x \rightarrow a} f'(x) = \ell \in \mathbb{R}$ alors f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I et $f'(a) = \ell$.

Ce théorème peut se généraliser à $f \in \mathcal{C}^k(I \setminus \{a\})$ si les dérivées $f^{(j)}$ ($1 \leq j \leq k$) ont toutes une limite finie en a .



V. Fonctions à valeurs complexes

- 1 Dérivabilité
- 2 Fonctions dérivables
- 3 Théorème des accroissements finis
- 4 Applications
- 5 Fonctions à valeurs complexes**



V. Fonctions à valeurs complexes

ATTENTION

Comme on l'a vu, beaucoup de propriétés vraies pour les fonctions à valeurs réelles ne le sont plus pour les fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$ notamment :

- L'image d'un intervalle par une fonction continue n'est pas un intervalle.



V. Fonctions à valeurs complexes

ATTENTION

Comme on l'a vu, beaucoup de propriétés vraies pour les fonctions à valeurs réelles ne le sont plus pour les fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$ notamment :

- L'image d'un intervalle par une fonction continue n'est pas un intervalle.
- Le théorème des valeurs intermédiaires n'est plus vrai.



V. Fonctions à valeurs complexes

ATTENTION

Comme on l'a vu, beaucoup de propriétés vraies pour les fonctions à valeurs réelles ne le sont plus pour les fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$ notamment :

- L'image d'un intervalle par une fonction continue n'est pas un intervalle.
- Le théorème des valeurs intermédiaires n'est plus vrai.
- Le théorème de Rolle n'est plus vrai.



V. Fonctions à valeurs complexes

ATTENTION

Comme on l'a vu, beaucoup de propriétés vraies pour les fonctions à valeurs réelles ne le sont plus pour les fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$ notamment :

- L'image d'un intervalle par une fonction continue n'est pas un intervalle.
- Le théorème des valeurs intermédiaires n'est plus vrai.
- Le théorème de Rolle n'est plus vrai.
- Le théorème des accroissements finis non plus.



V. Fonctions à valeurs complexes

ATTENTION

Comme on l'a vu, beaucoup de propriétés vraies pour les fonctions à valeurs réelles ne le sont plus pour les fonctions à valeurs dans $\mathbb{C}$ notamment :

- L'image d'un intervalle par une fonction continue n'est pas un intervalle.
- Le théorème des valeurs intermédiaires n'est plus vrai.
- Le théorème de Rolle n'est plus vrai.
- Le théorème des accroissements finis non plus.

Bien triste constat mais cela provient d'une non homogénéité entre la source et le but.



V. Fonctions à valeurs complexes

Alors que reste-t-il ?

Théorème 16 (Inégalité des accroissements finis) :

Soit $f : [a; b] \mapsto \mathbb{C}$ continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$.

S'il existe un réel positif M tel que $\forall x \in]a; b[, \quad |f'(x)| \leq M$ alors

$$|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|.$$



V. Fonctions à valeurs complexes

Alors que reste-t-il ?

Théorème 16 (Inégalité des accroissements finis) :

Soit $f : [a; b] \mapsto \mathbb{C}$ continue sur $[a; b]$ et dérivable sur $]a; b[$.

S'il existe un réel positif M tel que $\forall x \in]a; b[, |f'(x)| \leq M$ alors

$$|f(b) - f(a)| \leq M|b - a|.$$

Exemple 14 :

La fonction $t \mapsto e^{it}$ est 1-lipschitzienne.

En particulier, pour tout $a, b \in \mathbb{R}$, $|e^{ia} - e^{ib}| \leq |a - b|$.



V. Fonctions à valeurs complexes

La notion de fonctions monotones pour des fonctions à valeurs complexes n'a aucun sens mais on peut, cependant, caractériser les fonctions constantes :

Théorème 17 (Caractérisation des fonctions constantes dérivables) :

Soient I un **intervalle** et $f \in \mathcal{D}(I; \mathbb{C})$.

f est constante sur I si, et seulement si f' est identiquement nulle sur $\overset{\circ}{I}$.



V. Fonctions à valeurs complexes

À retenir :

Ce qu'on garde	Ce qu'on ne garde pas
Une fonction continue sur un segment $[a ; b]$ est bornée au sens que $ f $ l'est	Le théorème des valeurs intermédiaires



V. Fonctions à valeurs complexes

À retenir :

Ce qu'on garde	Ce qu'on ne garde pas
Une fonction continue sur un segment $[a; b]$ est bornée au sens que $ f $ l'est	Le théorème des valeurs intermédiaires
Dérivabilité $\Rightarrow$ Continuité	Théorème de dérivabilité de la fonction réciproque



V. Fonctions à valeurs complexes

À retenir :

Ce qu'on garde	Ce qu'on ne garde pas
Une fonction continue sur un segment $[a; b]$ est bornée au sens que $ f $ l'est	Le théorème des valeurs intermédiaires
Dérivabilité $\Rightarrow$ Continuité	Théorème de dérivabilité de la fonction réciproque
Opérations sur les dérivées	Théorème de Rolle



V. Fonctions à valeurs complexes

À retenir :

Ce qu'on garde	Ce qu'on ne garde pas
Une fonction continue sur un segment $[a ; b]$ est bornée au sens que $ f $ l'est	Le théorème des valeurs intermédiaires
Dérivabilité $\Rightarrow$ Continuité	Théorème de dérivabilité de la fonction réciproque
Opérations sur les dérivées	Théorème de Rolle
Inégalité des accroissements finis	Théorème des accroissements finis



V. Fonctions à valeurs complexes

À retenir :

Ce qu'on garde	Ce qu'on ne garde pas
Une fonction continue sur un segment $[a ; b]$ est bornée au sens que $ f $ l'est	Le théorème des valeurs intermédiaires
Dérivabilité $\Rightarrow$ Continuité	Théorème de dérivabilité de la fonction réciproque
Opérations sur les dérivées	Théorème de Rolle
Inégalité des accroissements finis	Théorème des accroissements finis
Dérivée bornée $\Rightarrow f$ lipschitzienne	Annulation aux extrema locaux



V. Fonctions à valeurs complexes

À retenir :

Ce qu'on garde	Ce qu'on ne garde pas
Une fonction continue sur un segment $[a; b]$ est bornée au sens que $ f $ l'est	Le théorème des valeurs intermédiaires
Dérivabilité $\Rightarrow$ Continuité	Théorème de dérivabilité de la fonction réciproque
Opérations sur les dérivées	Théorème de Rolle
Inégalité des accroissements finis	Théorème des accroissements finis
Dérivée bornée $\Rightarrow f$ lipschitzienne	Annulation aux extrema locaux
Dérivée nulle sur un intervalle I $\Rightarrow f$ constante sur I	Lien monotonie et signe de la dérivée



V. Fonctions à valeurs complexes

À retenir :

Ce qu'on garde	Ce qu'on ne garde pas
Une fonction continue sur un segment $[a; b]$ est bornée au sens que $ f $ l'est	Le théorème des valeurs intermédiaires
Dérivabilité $\Rightarrow$ Continuité	Théorème de dérivabilité de la fonction réciproque
Opérations sur les dérivées	Théorème de Rolle
Inégalité des accroissements finis	Théorème des accroissements finis
Dérivée bornée $\Rightarrow f$ lipschitzienne	Annulation aux extrema locaux
Dérivée nulle sur un intervalle I $\Rightarrow f$ constante sur I	Lien monotonie et signe de la dérivée
	Théorème de prolongement de la dérivée et prolongement $\mathcal{C}^1$

V. Fonctions à valeurs complexes

Exercice 13 :

Étudier la dérivabilité et donner la fonction dérivée des fonctions à valeurs complexes $\varphi : t \mapsto e^{e^{it}}$ et $\psi : t \mapsto e^{\arccos(t) + i \arcsin(t)}$.

