

Polynômes

Cours de PTSI

Lycée Jules Garnier

Chapitre 20



- 1 L'ensemble $\mathbb{K}[X]$
- 2 Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$
- 3 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$
- 4 Racines d'un polynôme
- 5 Décomposition en facteurs irréductibles
- 6 Somme et produit des racines



Avant de s'attaquer vraiment à l'algèbre linéaire, ce chapitre servira d'introduction par l'exemple aux concepts plus généraux développés ensuite dans toute leur généralité sur les espaces vectoriels.

Ce chapitre sera également l'occasion de croiser sous sa forme originale et épurée une formule d'importance capitale en analyse, et que nous retrouverons sous d'autres formes à plusieurs reprises ensuite : la formule de Taylor.

Dans toute ce chapitre, \mathbb{K} désigne soit l'ensemble \mathbb{R} des nombres réels ou l'ensemble \mathbb{C} des nombres complexes.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

- 1 L'ensemble $\mathbb{K}[X]$
 - Opérations sur $\mathbb{K}[X]$
 - Degré d'un polynôme
 - Notions de polynômes de matrices
- 2 Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$
- 3 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$
- 4 Racines d'un polynôme
- 5 Décomposition en facteurs irréductibles
- 6 Somme et produit des racines



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

Définition 1 :

On appelle **polynôme** à une indéterminée à coefficients dans \mathbb{K} , toute suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de \mathbb{K} **nulle à partir d'un certain rang**.

On note $\mathbb{K}[X]$ leur ensemble.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

Définition 1 :

On appelle **polynôme** à une indéterminée à coefficients dans \mathbb{K} , toute suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de \mathbb{K} **nulle à partir d'un certain rang**.

On note $\mathbb{K}[X]$ leur ensemble.

$$\forall P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}[X], \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, a_n = 0.$$

Remarque : N peut être aussi grand que l'on veut, mais il est toujours fini.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

Définition 1 :

On appelle **polynôme** à une indéterminée à coefficients dans \mathbb{K} , toute suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de \mathbb{K} **nulle à partir d'un certain rang**.

On note $\mathbb{K}[X]$ leur ensemble.

$$\forall P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}[X], \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, a_n = 0.$$

Remarque : N peut être aussi grand que l'on veut, mais il est toujours fini.

Exemple 1 :

$$(1, -2, 3, 0, 0, 4, 0, 0, \dots) = 1 - 2X + 3X^2 + 4X^5.$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

Vocabulaire :

- Pour n fixé, a_n est le $n+1^{\text{ème}}$ coefficient du polynôme.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

Vocabulaire :

- Pour n fixé, a_n est le $n+1^{\text{ème}}$ coefficient du polynôme.
- On note X le polynôme défini par $X = (0, 1, 0, 0, \dots)$ c'est-à-dire défini par la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que :

$$a_0 = 0, a_1 = 1 \text{ et } \forall n \geq 2, a_n = 0.$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

Vocabulaire :

- Pour n fixé, a_n est le $n+1^{\text{ème}}$ coefficient du polynôme.
- On note X le polynôme défini par $X = (0, 1, 0, 0, \dots)$ c'est-à-dire défini par la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que :

$$a_0 = 0, a_1 = 1 \text{ et } \forall n \geq 2, a_n = 0.$$

ATTENTION

X n'est pas un nombre !



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

Vocabulaire :

- Pour n fixé, a_n est le $n+1^{\text{ème}}$ coefficient du polynôme.
- On note X le polynôme défini par $X = (0, 1, 0, 0, \dots)$ c'est-à-dire défini par la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que :

$$a_0 = 0, a_1 = 1 \text{ et } \forall n \geq 2, a_n = 0.$$

ATTENTION

X n'est pas un nombre !

- On appelle polynôme constant, tout polynôme de la forme $(\lambda, 0, 0, \dots)$ où $\lambda \in \mathbb{K}$.
On le notera abusivement λ .



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

Vocabulaire :

- Pour n fixé, a_n est le $n+1^{\text{ème}}$ coefficient du polynôme.
- On note X le polynôme défini par $X = (0, 1, 0, 0, \dots)$ c'est-à-dire défini par la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que :

$$a_0 = 0, a_1 = 1 \text{ et } \forall n \geq 2, a_n = 0.$$

ATTENTION

X n'est pas un nombre !

- On appelle polynôme constant, tout polynôme de la forme $(\lambda, 0, 0, \dots)$ où $\lambda \in \mathbb{K}$.
On le notera abusivement λ .
- Le polynôme défini par la suite nulle $(0, 0, \dots)$ est appelé **polynôme nul** et noté $0_{\mathbb{K}[X]}$, ou dangereusement 0 .



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

Vocabulaire :

- Pour n fixé, a_n est le $n+1^{\text{ème}}$ coefficient du polynôme.
- On note X le polynôme défini par $X = (0, 1, 0, 0, \dots)$ c'est-à-dire défini par la suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que :

$$a_0 = 0, a_1 = 1 \text{ et } \forall n \geq 2, a_n = 0.$$

ATTENTION

X n'est pas un nombre !

- On appelle polynôme constant, tout polynôme de la forme $(\lambda, 0, 0, \dots)$ où $\lambda \in \mathbb{K}$.
On le notera abusivement λ .
- Le polynôme défini par la suite nulle $(0, 0, \dots)$ est appelé **polynôme nul** et noté $0_{\mathbb{K}[X]}$, ou dangereusement 0 .

Par définition, un polynôme est donc nul si, et seulement si tous ses coefficients sont nuls :

$$\forall P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}[X], \quad P \equiv 0_{\mathbb{K}[X]} \iff \forall n \in \mathbb{N}, a_n = 0.$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Définition 2 (Somme de polynômes) :

Soient $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $Q = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$.

On appelle **somme** des polynômes P et Q , notée $P + Q$, le polynôme défini par :

$$P + Q = (a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Définition 2 (Somme de polynômes) :

Soient $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $Q = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux polynômes de $\mathbb{K}[X]$.

On appelle **somme** des polynômes P et Q , notée $P + Q$, le polynôme défini par :

$$P + Q = (a_n + b_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

La loi $+$: $\mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K}[X]$

$(P; Q) \mapsto P + Q$

est appelée **loi de composition interne** (à $\mathbb{K}[X]$).



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Proposition 1 :

L'addition dans $\mathbb{K}[X]$:

est associative : $\forall P, Q, R \in \mathbb{K}[X], (P + Q) + R = P + (Q + R) = P + Q + R.$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Proposition 1 :

L'addition dans $\mathbb{K}[X]$:

est associative : $\forall P, Q, R \in \mathbb{K}[X], (P + Q) + R = P + (Q + R) = P + Q + R.$

est commutative : $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], P + Q = Q + P.$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Proposition 1 :

L'addition dans $\mathbb{K}[X]$:

est associative : $\forall P, Q, R \in \mathbb{K}[X], (P + Q) + R = P + (Q + R) = P + Q + R.$

est commutative : $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], P + Q = Q + P.$

admet un élément neutre : le polynôme nul $0_{\mathbb{K}[X]} = (0, 0, \dots)$ vérifie :

$$P + 0_{\mathbb{K}[X]} = 0_{\mathbb{K}[X]} + P = P.$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Proposition I :

L'addition dans $\mathbb{K}[X]$:

est associative : $\forall P, Q, R \in \mathbb{K}[X], (P + Q) + R = P + (Q + R) = P + Q + R.$

est commutative : $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], P + Q = Q + P.$

admet un élément neutre : le polynôme nul $0_{\mathbb{K}[X]} = (0, 0, \dots)$ vérifie :

$$P + 0_{\mathbb{K}[X]} = 0_{\mathbb{K}[X]} + P = P.$$

est symétrisable : Tout polynôme $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet un symétrique, noté $-P$, et défini par $-P = (-a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant

$$P + (-P) = 0_{\mathbb{K}[X]}.$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Proposition 1 :

L'addition dans $\mathbb{K}[X]$:

est associative : $\forall P, Q, R \in \mathbb{K}[X], (P + Q) + R = P + (Q + R) = P + Q + R.$

est commutative : $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], P + Q = Q + P.$

admet un élément neutre : le polynôme nul $0_{\mathbb{K}[X]} = (0, 0, \dots)$ vérifie :

$$P + 0_{\mathbb{K}[X]} = 0_{\mathbb{K}[X]} + P = P.$$

est symétrisable : Tout polynôme $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet un symétrique, noté $-P$, et défini par $-P = (-a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant

$$P + (-P) = 0_{\mathbb{K}[X]}.$$

Toutes ces propriétés découlent de celles de \mathbb{K} .



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Proposition 1 :

L'addition dans $\mathbb{K}[X]$:

est associative : $\forall P, Q, R \in \mathbb{K}[X], (P + Q) + R = P + (Q + R) = P + Q + R.$

est commutative : $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], P + Q = Q + P.$

admet un élément neutre : le polynôme nul $0_{\mathbb{K}[X]} = (0, 0, \dots)$ vérifie :

$$P + 0_{\mathbb{K}[X]} = 0_{\mathbb{K}[X]} + P = P.$$

est symétrisable : Tout polynôme $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ admet un **symétrique**, noté $-P$, et défini par $-P = (-a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant

$$P + (-P) = 0_{\mathbb{K}[X]}.$$

Toutes ces propriétés découlent de celles de \mathbb{K} .

Vocabulaire : On dit que $(\mathbb{K}[X], +)$ est un groupe commutatif (ou abélien)



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Corollaire I :

Deux polynômes sont égaux si, et seulement si leurs coefficients sont égaux :

$$\forall P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}, Q = (b_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}[X], \quad P \equiv_{\mathbb{K}[X]} Q \iff \forall n \in \mathbb{N}, a_n =_{\mathbb{K}} b_n.$$

En convenant toujours que ces coefficients sont tous nuls à partir d'un certain rang.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Définition 3 (Loi externe) :

Soient $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

On définit le **produit d'un polynôme par un scalaire**, noté $\lambda.P$ ou λP , le polynôme défini par :

$$\lambda.P = (\lambda \times a_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Définition 3 (Loi externe) :

Soient $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

On définit le **produit d'un polynôme par un scalaire**, noté $\lambda \cdot P$ ou λP , le polynôme défini par :

$$\lambda \cdot P = (\lambda \times a_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

La loi $\cdot : \mathbb{K} \times \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K}[X]$

$(\lambda; P) \mapsto \lambda \cdot P$

est alors qualifiée de **loi de composition externe** (à $\mathbb{K}[X]$).



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Définition 3 (Loi externe) :

Soient $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

On définit le **produit d'un polynôme par un scalaire**, noté $\lambda \cdot P$ ou λP , le polynôme défini par :

$$\lambda \cdot P = (\lambda \times a_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

La loi $\cdot : \mathbb{K} \times \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K}[X]$

$(\lambda; P) \mapsto \lambda \cdot P$

est alors qualifiée de **loi de composition externe** (à $\mathbb{K}[X]$).

Corollaire 2 :

L'ensemble $\mathbb{K}[X]$ est stable par combinaisons linéaires.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Définition 3 (Loi externe) :

Soient $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

On définit le **produit d'un polynôme par un scalaire**, noté $\lambda \cdot P$ ou λP , le polynôme défini par :

$$\lambda \cdot P = (\lambda \times a_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

La loi $\cdot : \mathbb{K} \times \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K}[X]$

$$(\lambda; P) \mapsto \lambda \cdot P$$

est alors qualifiée de **loi de composition externe** (à $\mathbb{K}[X]$).

Corollaire 2 :

L'ensemble $\mathbb{K}[X]$ est stable par combinaisons linéaires.

Vocabulaire : On dit que $(\mathbb{K}[X], +, \cdot)$ est un espace vectoriel sur \mathbb{K} .



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

À ce stade, il nous reste à pouvoir multiplier des polynômes entre eux et avoir quelque chose qui ressemble à

$$\left(\sum a_i X^i\right) \times \left(\sum b_j X^j\right) = \sum (a_0 b_k + \dots + a_k b_0) X^k = \sum \left(\sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}\right) X^k,$$

calcul au sein duquel on a simplement regroupé les termes degré par degré. Il ne nous reste plus qu'à forcer le destin.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Définition 4 (Produit de polynômes) :

Soient $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $Q = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux éléments de $\mathbb{K}[X]$.

On appelle **produit** des polynômes P et Q , notée $P \times Q$ ou plus simplement PQ , le polynôme défini par :

$$P \times Q = (c_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{où } \forall n \in \mathbb{N}, c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Définition 4 (Produit de polynômes) :

Soient $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $Q = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux éléments de $\mathbb{K}[X]$.

On appelle **produit** des polynômes P et Q , notée $P \times Q$ ou plus simplement PQ , le polynôme défini par :

$$P \times Q = (c_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{où } \forall n \in \mathbb{N}, c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

Vocabulaire : La suite de terme général $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ est appelée **produit de Cauchy** des suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Définition 4 (Produit de polynômes) :

Soient $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $Q = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux éléments de $\mathbb{K}[X]$.

On appelle **produit** des polynômes P et Q , notée $P \times Q$ ou plus simplement PQ , le polynôme défini par :

$$P \times Q = (c_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{où } \forall n \in \mathbb{N}, c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

Vocabulaire : La suite de terme général $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ est appelée **produit de Cauchy** des suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

En particulier, on a :

- $c_0 = a_0 b_0$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Définition 4 (Produit de polynômes) :

Soient $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $Q = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux éléments de $\mathbb{K}[X]$.

On appelle **produit** des polynômes P et Q , notée $P \times Q$ ou plus simplement PQ , le polynôme défini par :

$$P \times Q = (c_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{où } \forall n \in \mathbb{N}, c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

Vocabulaire : La suite de terme général $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ est appelée **produit de Cauchy** des suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

En particulier, on a :

- $c_0 = a_0 b_0$
- $c_1 = a_1 b_0 + a_0 b_1$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Définition 4 (Produit de polynômes) :

Soient $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $Q = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux éléments de $\mathbb{K}[X]$.

On appelle **produit** des polynômes P et Q , notée $P \times Q$ ou plus simplement PQ , le polynôme défini par :

$$P \times Q = (c_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{où } \forall n \in \mathbb{N}, c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

Vocabulaire : La suite de terme général $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ est appelée **produit de Cauchy** des suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

En particulier, on a :

- $c_0 = a_0 b_0$
- $c_1 = a_1 b_0 + a_0 b_1$
- $c_2 = a_2 b_0 + a_1 b_1 + a_0 b_2$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Définition 4 (Produit de polynômes) :

Soient $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $Q = (b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux éléments de $\mathbb{K}[X]$.

On appelle **produit** des polynômes P et Q , notée $P \times Q$ ou plus simplement PQ , le polynôme défini par :

$$P \times Q = (c_n)_{n \in \mathbb{N}} \quad \text{où } \forall n \in \mathbb{N}, c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

Vocabulaire : La suite de terme général $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ est appelée **produit de Cauchy** des suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

En particulier, on a :

- $c_0 = a_0 b_0$
- $c_1 = a_1 b_0 + a_0 b_1$
- $c_2 = a_2 b_0 + a_1 b_1 + a_0 b_2$
- ...



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Remarque importante :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = \sum_{p+q=n} a_p b_q. \quad (1)$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Remarque importante :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} = \sum_{p+q=n} a_p b_q. \quad (1)$$

Comme l'addition, la loi $\times : \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}[X] \rightarrow \mathbb{K}[X]$

$$(P; Q) \mapsto P \times Q$$

est aussi une loi de composition interne.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Proposition 2 :

Le produit dans $\mathbb{K}[X]$:

est associatif : $\forall P, Q, R \in \mathbb{K}[X], (P \times Q) \times R = P \times (Q \times R) = P \times Q \times R.$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Proposition 2 :

Le produit dans $\mathbb{K}[X]$:

est associatif : $\forall P, Q, R \in \mathbb{K}[X], (P \times Q) \times R = P \times (Q \times R) = P \times Q \times R.$

est commutatif : $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], P \times Q = Q \times P.$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Proposition 2 :

Le produit dans $\mathbb{K}[X]$:

est associatif : $\forall P, Q, R \in \mathbb{K}[X], (P \times Q) \times R = P \times (Q \times R) = P \times Q \times R.$

est commutatif : $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], P \times Q = Q \times P.$

admet un élément neutre : le polynôme $1_{\mathbb{K}[X]} = (1, 0, 0, \dots).$

$$P \times 1_{\mathbb{K}[X]} = 1_{\mathbb{K}[X]} \times P = P.$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Proposition 2 :

Le produit dans $\mathbb{K}[X]$:

est associatif : $\forall P, Q, R \in \mathbb{K}[X], (P \times Q) \times R = P \times (Q \times R) = P \times Q \times R.$

est commutatif : $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], P \times Q = Q \times P.$

admet un élément neutre : le polynôme $1_{\mathbb{K}[X]} = (1, 0, 0, \dots).$

$$P \times 1_{\mathbb{K}[X]} = 1_{\mathbb{K}[X]} \times P = P.$$

est distributif sur l'addition : $\forall P, Q, R \in \mathbb{K}[X],$

$$P \times (Q + R) = P \times Q + P \times R.$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Proposition 2 :

Le produit dans $\mathbb{K}[X]$:

est associatif : $\forall P, Q, R \in \mathbb{K}[X], (P \times Q) \times R = P \times (Q \times R) = P \times Q \times R.$

est commutatif : $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], P \times Q = Q \times P.$

admet un élément neutre : le polynôme $1_{\mathbb{K}[X]} = (1, 0, 0, \dots).$

$$P \times 1_{\mathbb{K}[X]} = 1_{\mathbb{K}[X]} \times P = P.$$

est distributif sur l'addition : $\forall P, Q, R \in \mathbb{K}[X],$

$$P \times (Q + R) = P \times Q + P \times R.$$

est compatible avec la loi externe :

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \lambda.(P \times Q) = (\lambda.P) \times Q = P \times (\lambda.Q)$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Proposition 2 :

Le produit dans $\mathbb{K}[X]$:

est associatif : $\forall P, Q, R \in \mathbb{K}[X], (P \times Q) \times R = P \times (Q \times R) = P \times Q \times R.$

est commutatif : $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], P \times Q = Q \times P.$

admet un élément neutre : le polynôme $1_{\mathbb{K}[X]} = (1, 0, 0, \dots).$

$$P \times 1_{\mathbb{K}[X]} = 1_{\mathbb{K}[X]} \times P = P.$$

est distributif sur l'addition : $\forall P, Q, R \in \mathbb{K}[X],$

$$P \times (Q + R) = P \times Q + P \times R.$$

est compatible avec la loi externe :

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \lambda.(P \times Q) = (\lambda.P) \times Q = P \times (\lambda.Q)$$

On dit que $(\mathbb{K}[X], +, \times)$ est un anneau commutatif et que $(\mathbb{K}[X], +, \times, \cdot)$ est une algèbre commutative (unitaire) sur \mathbb{K} .



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Proposition 2 :

Le produit dans $\mathbb{K}[X]$:

est associatif : $\forall P, Q, R \in \mathbb{K}[X], (P \times Q) \times R = P \times (Q \times R) = P \times Q \times R.$

est commutatif : $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], P \times Q = Q \times P.$

admet un élément neutre : le polynôme $1_{\mathbb{K}[X]} = (1, 0, 0, \dots).$

$$P \times 1_{\mathbb{K}[X]} = 1_{\mathbb{K}[X]} \times P = P.$$

est distributif sur l'addition : $\forall P, Q, R \in \mathbb{K}[X],$

$$P \times (Q + R) = P \times Q + P \times R.$$

est compatible avec la loi externe :

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \lambda.(P \times Q) = (\lambda.P) \times Q = P \times (\lambda.Q)$$

ATTENTION

$(\mathbb{K}[X], \times)$ n'est pas un groupe !



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Proposition 2 :

Le produit dans $\mathbb{K}[X]$:

est associatif : $\forall P, Q, R \in \mathbb{K}[X], (P \times Q) \times R = P \times (Q \times R) = P \times Q \times R.$

est commutatif : $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], P \times Q = Q \times P.$

admet un élément neutre : le polynôme $1_{\mathbb{K}[X]} = (1, 0, 0, \dots).$

$$P \times 1_{\mathbb{K}[X]} = 1_{\mathbb{K}[X]} \times P = P.$$

est distributif sur l'addition : $\forall P, Q, R \in \mathbb{K}[X],$

$$P \times (Q + R) = P \times Q + P \times R.$$

est compatible avec la loi externe :

$$\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \lambda.(P \times Q) = (\lambda.P) \times Q = P \times (\lambda.Q)$$

ATTENTION

On le démontrera plus loin mais les seuls polynômes inversibles pour la loi \times sont les polynômes constants non nuls.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Définition/Théorème 5 (Notation définitive) :

Soit $n \in \mathbb{N}$. On définit la suite des monômes $(X^n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$\begin{cases} X^0 = (1, 0, 0, \dots) \\ X^{n+1} = X^n \times X \end{cases}$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Définition/Théorème 5 (Notation définitive) :

Soit $n \in \mathbb{N}$. On définit la suite des monômes $(X^n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$\begin{cases} X^0 = (1, 0, 0, \dots) \\ X^{n+1} = X^n \times X \end{cases}$$

$X = (0, 1, 0, \dots)$ est appelée l'indéterminée et,

$$\forall n \in \mathbb{N}, X^n = (0, 0, \dots, 0, \underset{\substack{\uparrow \\ (n+1)\text{ème coefficient}}}{1}, 0, \dots) \quad (2)$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Définition/Théorème 5 (Notation définitive) :

Soit $n \in \mathbb{N}$. On définit la suite des monômes $(X^n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$\begin{cases} X^0 = (1, 0, 0, \dots) \\ X^{n+1} = X^n \times X \end{cases}$$

$X = (0, 1, 0, \dots)$ est appelée l'indéterminée et,

$$\forall n \in \mathbb{N}, X^n = (0, 0, \dots, 0, \underset{\substack{\uparrow \\ (n+1)\text{ème}}}{1}, 0, \dots) \quad (2)$$

coefficient

Tout $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}[X]$ s'écrit alors :

$$P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n = \sum_{k=0}^n a_kX^k.$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Définition/Théorème 5 (Notation définitive) :

Soit $n \in \mathbb{N}$. On définit la suite des monômes $(X^n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$\begin{cases} X^0 = (1, 0, 0, \dots) \\ X^{n+1} = X^n \times X \end{cases}$$

$X = (0, 1, 0, \dots)$ est appelée l'indéterminée et,

$$\forall n \in \mathbb{N}, X^n = (0, 0, \dots, 0, \underset{\substack{\uparrow \\ (n+1)\text{ème coefficient}}}{1}, 0, \dots) \quad (2)$$

Tout $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{K}[X]$ s'écrit alors :

$$P = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n = \sum_{k=0}^n a_kX^k.$$

Vocabulaire : On appelle **monôme** tout polynôme de la forme a_kX^k où $k \in \mathbb{N}$ et $a_k \in \mathbb{K}$.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Remarque : On adopte diverses notations pour un polynôme comme

$$\diamond P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}},$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Remarque : On adopte diverses notations pour un polynôme comme

◇ $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$,

◇ P ,



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Remarque : On adopte diverses notations pour un polynôme comme

◇ $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$,

◇ P ,

◇ $\sum a_n X^n$,



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Remarque : On adopte diverses notations pour un polynôme comme

$$\diamond P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}},$$

$$\diamond P,$$

$$\diamond \sum a_n X^n,$$

$$\diamond \sum_{k=0}^n a_k X^k,$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Remarque : On adopte diverses notations pour un polynôme comme

$$\diamond P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}},$$

$$\diamond P,$$

$$\diamond \sum a_n X^n,$$

$$\diamond \sum_{k=0}^n a_k X^k,$$

$$\diamond P(X),$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Remarque : On adopte diverses notations pour un polynôme comme

$$\diamond P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}},$$

$$\diamond P,$$

$$\diamond \sum a_n X^n,$$

$$\diamond \sum_{k=0}^n a_k X^k,$$

$$\diamond P(X),$$

$$\diamond \sum_{k \geq 0} a_k X^k,$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Remarque : On adopte diverses notations pour un polynôme comme

$$\diamond P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}},$$

$$\diamond P,$$

$$\diamond \sum a_n X^n,$$

$$\diamond \sum_{k=0}^n a_k X^k,$$

$$\diamond P(X),$$

$$\diamond \sum_{k \geq 0} a_k X^k,$$

$$\diamond \text{ou } \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k,$$

en convenant toujours que $\forall k > n, a_k = 0$ *i.e.* la somme est finie et on écrira toujours un polynôme dans l'ordre croissant ou décroissant des puissances de X .



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Remarque : On adopte diverses notations pour un polynôme comme

$$\diamond P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}},$$

$$\diamond P,$$

$$\diamond \sum a_n X^n,$$

$$\diamond \sum_{k=0}^n a_k X^k,$$

$$\diamond P(X),$$

$$\diamond \sum_{k \geq 0} a_k X^k,$$

$$\diamond \text{ou } \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k,$$

en convenant toujours que $\forall k > n, a_k = 0$ i.e. la somme est finie et on écrira toujours un polynôme dans l'ordre croissant ou décroissant des puissances de X .

ATTENTION

X n'est pas un nombre !



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Définition \hook (Composition) :

Soient $P = \sum_{k \geq 0} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ et $Q \in \mathbb{K}[X]$.

On appelle polynôme composé Q par P , noté $P \circ Q$, le polynôme

$$P \circ Q = \sum_{k \geq 0} a_k Q^k.$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Définition \circ (Composition) :

Soient $P = \sum_{k \geq 0} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ et $Q \in \mathbb{K}[X]$.

On appelle polynôme composé Q par P , noté $P \circ Q$, le polynôme

$$P \circ Q = \sum_{k \geq 0} a_k Q^k.$$

Remarque : Si $Q = X + a$ où $a \in \mathbb{K}$ et $P = \sum_{k \geq 0} a_k X^k$ alors

$$P \circ Q = P(X + a) = \sum_{k \geq 0} a_k (X + a)^k.$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Exemples 2 (Opérations dans $\mathbb{K}[X]$) :

Soient $P = 1 + 3X - X^2$ et $Q = X + X^2$.

Somme : $P + Q = 1 + 4X$.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Exemples 2 (Opérations dans $\mathbb{K}[X]$) :

Soient $P = 1 + 3X - X^2$ et $Q = X + X^2$.

Somme : $P + Q = 1 + 4X$.

Loi externe : $2P = 2 + 6X - 2X^2$.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Exemples 2 (Opérations dans $\mathbb{K}[X]$) :

Soient $P = 1 + 3X - X^2$ et $Q = X + X^2$.

Somme : $P + Q = 1 + 4X$.

Loi externe : $2P = 2 + 6X - 2X^2$.

Produit :

k	0	1	2	3	4
a_k	1	3	-1		
b_k	0	1	1		
c_k	0	1	4	2	-1

$$\Rightarrow \begin{cases} c_0 = a_0 b_0 = 0 \\ c_1 = a_0 b_1 + a_1 b_0 = 1 \\ c_2 = a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0 = 4 \\ c_3 = a_0 b_3 + a_1 b_2 + a_2 b_1 + a_3 b_0 = 2 \\ c_4 = a_0 b_4 + a_1 b_3 + a_2 b_2 + a_3 b_1 + a_4 b_0 = -1 \end{cases}$$

$$PQ = X + 4X^2 + 2X^3 - X^4.$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Exemples 2 (Opérations dans $\mathbb{K}[X]$) :

Soient $P = 1 + 3X - X^2$ et $Q = X + X^2$.

Somme : $P + Q = 1 + 4X$.

Loi externe : $2P = 2 + 6X - 2X^2$.

Produit :

k	0	1	2	3	4
a_k	1	3	-1		
b_k	0	1	1		
c_k	0	1	4	2	-1

$$\Rightarrow \begin{cases} c_0 = a_0 b_0 = 0 \\ c_1 = a_0 b_1 + a_1 b_0 = 1 \\ c_2 = a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0 = 4 \\ c_3 = a_0 b_3 + a_1 b_2 + a_2 b_1 + a_3 b_0 = 2 \\ c_4 = a_0 b_4 + a_1 b_3 + a_2 b_2 + a_3 b_1 + a_4 b_0 = -1 \end{cases}$$

$$PQ = X + 4X^2 + 2X^3 - X^4.$$

Composition : $P \circ Q = 1 + 3(X + X^2) - (X + X^2)^2 = 1 + 3X - 2X^2 - 2X^3 - X^4$.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Exercice I :

Soient $P(X) = X^2 + 3X - 2$ et $Q(X) = 6X - X^2 + 1$.

Déterminer $P + Q$, $3P - 2Q$, P^3 , PQ et $P(Q(X))$.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Proposition 3 (Binôme de Newton) :

Soient P et Q deux polynômes sur \mathbb{K} .

$$\forall n \in \mathbb{N}, (P + Q)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^k Q^{n-k}$$

$$\text{et } \forall n \in \mathbb{N}^*, P^n - Q^n = (P - Q) \sum_{k=0}^{n-1} P^k Q^{n-1-k}.$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Proposition 3 (Binôme de Newton) :

Soient P et Q deux polynômes sur \mathbb{K} .

$$\forall n \in \mathbb{N}, (P + Q)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^k Q^{n-k}$$

$$\text{et } \forall n \in \mathbb{N}^*, P^n - Q^n = (P - Q) \sum_{k=0}^{n-1} P^k Q^{n-1-k}.$$

Exemple 3 :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, 1 - X^n = (1 - X) \sum_{k=0}^{n-1} X^k.$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

1. Opérations sur $\mathbb{K}[X]$

Proposition 3 (Binôme de Newton) :

Soient P et Q deux polynômes sur \mathbb{K} .

$$\forall n \in \mathbb{N}, (P + Q)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^k Q^{n-k}$$

$$\text{et } \forall n \in \mathbb{N}^*, P^n - Q^n = (P - Q) \sum_{k=0}^{n-1} P^k Q^{n-1-k}.$$

Exemple 3 :

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, 1 - X^n = (1 - X) \sum_{k=0}^{n-1} X^k.$$

Exercice 2 :

Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$(X^3 + X^2 + X + 1) \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k X^k = X^{2n+3} + X^{2n+1} + X^2 + 1.$$

I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

2. Degré d'un polynôme

Définition 1 :

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ un polynôme non nul.

On appelle **degré de P** et on note $\deg(P)$ le plus grand entier k tel que $a_k \neq 0$.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

2. Degré d'un polynôme

Définition 1 :

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ un polynôme non nul.

On appelle **degré de P** et on note $\deg(P)$ le plus grand entier k tel que $a_k \neq 0$.

On convient que $\deg(0_{\mathbb{K}[X]}) = -\infty$.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

2. Degré d'un polynôme

Définition 1 :

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$ un polynôme non nul.

On appelle **degré de P** et on note $\deg(P)$ le plus grand entier k tel que $a_k \neq 0$.

On convient que $\deg(0_{\mathbb{K}[X]}) = -\infty$.

Exemple 4 :

Si $P = X^2 + 5X^3 + X^9$, on a $\deg(P) = 9$.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

2. Degré d'un polynôme

Remarques :

- si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, on n'a pas nécessairement $\deg(P) = n$. Ce n'est le cas que si $a_n \neq 0$.

Le coefficient a_n s'appelle alors le **coefficient dominant**, $a_n X^n$ le monôme dominant.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

2. Degré d'un polynôme

Remarques :

- si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, on n'a pas nécessairement $\deg(P) = n$. Ce n'est le cas que si $a_n \neq 0$.

Le coefficient a_n s'appelle alors le **coefficient dominant**, $a_n X^n$ le monôme dominant.

- On dit que P est **unitaire** ou **normalisé** si $P \neq 0$ et si son coefficient dominant est égal à 1.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

2. Degré d'un polynôme

Remarques :

- si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, on n'a pas nécessairement $\deg(P) = n$. Ce n'est le cas que si $a_n \neq 0$.

Le coefficient a_n s'appelle alors le **coefficient dominant**, $a_n X^n$ le monôme dominant.

- On dit que P est **unitaire** ou **normalisé** si $P \neq 0$ et si son coefficient dominant est égal à 1.
- Si $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est le polynôme nul alors, par définition, $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = 0$. De fait, il n'existe pas d'entier n tel que $a_n \neq 0$. C'est la raison de la définition ci-dessus.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

2. Degré d'un polynôme

Remarques :

- si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, on n'a pas nécessairement $\deg(P) = n$. Ce n'est le cas que si $a_n \neq 0$.

Le coefficient a_n s'appelle alors le **coefficient dominant**, $a_n X^n$ le monôme dominant.

- On dit que P est **unitaire** ou **normalisé** si $P \neq 0$ et si son coefficient dominant est égal à 1.
- Si $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est le polynôme nul alors, par définition, $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = 0$. De fait, il n'existe pas d'entier n tel que $a_n \neq 0$. C'est la raison de la définition ci-dessus.

ATTENTION

- Les polynômes constants ont un degré ≤ 0 .



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

2. Degré d'un polynôme

Remarques :

- si $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k$, on n'a pas nécessairement $\deg(P) = n$. Ce n'est le cas que si $a_n \neq 0$.

Le coefficient a_n s'appelle alors le **coefficient dominant**, $a_n X^n$ le monôme dominant.

- On dit que P est **unitaire** ou **normalisé** si $P \neq 0$ et si son coefficient dominant est égal à 1.
- Si $P = (a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est le polynôme nul alors, par définition, $\forall n \in \mathbb{N}, a_n = 0$. De fait, il n'existe pas d'entier n tel que $a_n \neq 0$. C'est la raison de la définition ci-dessus.

ATTENTION

- Les polynômes constants ont un degré ≤ 0 .
- Les polynômes de degré nul sont les polynômes constants non nuls.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

2. Degré d'un polynôme

Proposition \dagger :

$$\bullet \forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad \deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q)).$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

2. Degré d'un polynôme

Proposition \dagger :

$$\textcircled{1} \quad \forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad \deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q)).$$

$$\textcircled{2} \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall P \in \mathbb{K}[X], \quad \deg(\lambda P) = \begin{cases} \deg(P) & \text{si } \lambda \neq 0, \\ -\infty & \text{si } \lambda = 0. \end{cases}$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

2. Degré d'un polynôme

Proposition \dagger :

- ① $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad \deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q)).$
- ② $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall P \in \mathbb{K}[X], \quad \deg(\lambda P) = \begin{cases} \deg(P) & \text{si } \lambda \neq 0, \\ -\infty & \text{si } \lambda = 0. \end{cases}$
- ③ $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad \deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q).$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

2. Degré d'un polynôme

Proposition \dagger :

$$\textcircled{1} \quad \forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad \deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q)).$$

$$\textcircled{2} \quad \forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall P \in \mathbb{K}[X], \quad \deg(\lambda P) = \begin{cases} \deg(P) & \text{si } \lambda \neq 0, \\ -\infty & \text{si } \lambda = 0. \end{cases}$$

$$\textcircled{3} \quad \forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad \deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q).$$

$$\textcircled{4} \quad \forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad \deg(P \circ Q) = \deg(P) \times \deg(Q).$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

2. Degré d'un polynôme

Proposition 4 :

- ① $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad \deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q)).$
- ② $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall P \in \mathbb{K}[X], \quad \deg(\lambda P) = \begin{cases} \deg(P) & \text{si } \lambda \neq 0, \\ -\infty & \text{si } \lambda = 0. \end{cases}$
- ③ $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad \deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q).$
- ④ $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad \deg(P \circ Q) = \deg(P) \times \deg(Q).$

Exercice 3 :

Déterminer le degré et le coefficient dominant des polynômes suivants :

① $P_1(X) = X^3 - X(X - 2 + i)^2$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

2. Degré d'un polynôme

Proposition 4 :

- 1 $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad \deg(P + Q) \leq \max(\deg(P), \deg(Q)).$
- 2 $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \forall P \in \mathbb{K}[X], \quad \deg(\lambda P) = \begin{cases} \deg(P) & \text{si } \lambda \neq 0, \\ -\infty & \text{si } \lambda = 0. \end{cases}$
- 3 $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad \deg(PQ) = \deg(P) + \deg(Q).$
- 4 $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad \deg(P \circ Q) = \deg(P) \times \deg(Q).$

Exercice 3 :

Déterminer le degré et le coefficient dominant des polynômes suivants :

- 1 $P_1(X) = X^3 - X(X - 2 + i)^2$
- 2 $P_2(X) = (X + 1)^n - (X - 1)^n$, où $n \in \mathbb{N}$.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

2. Degré d'un polynôme

Corollaire 3 :

- ① Les seuls polynômes inversibles sont les polynômes constants non nuls.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

2. Degré d'un polynôme

Corollaire 3 :

- ① Les seuls polynômes inversibles sont les polynômes constants non nuls.
- ② $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad PQ = 0_{\mathbb{K}[X]} \iff P = 0_{\mathbb{K}[X]} \text{ ou } Q = 0_{\mathbb{K}[X]}.$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

2. Degré d'un polynôme

Corollaire 3 :

- ① Les seuls polynômes inversibles sont les polynômes constants non nuls.
- ② $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad PQ = 0_{\mathbb{K}[X]} \iff P = 0_{\mathbb{K}[X]} \text{ ou } Q = 0_{\mathbb{K}[X]}.$

Vocabulaire : On dit que $(\mathbb{K}[X], +, \times)$ est un anneau **intègre**.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

2. Degré d'un polynôme

Définition 8 :

Soit $n \in \mathbb{N}$.

On note $\mathbb{K}_n[X]$ l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n .



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

2. Degré d'un polynôme

Définition 8 :

Soit $n \in \mathbb{N}$.

On note $\mathbb{K}_n[X]$ l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n .

Proposition 5 :

$\mathbb{K}_n[X]$ est stable par combinaisons linéaires.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

2. Degré d'un polynôme

Définition 8 :

Soit $n \in \mathbb{N}$.

On note $\mathbb{K}_n[X]$ l'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n .

Proposition 5 :

$\mathbb{K}_n[X]$ est stable par combinaisons linéaires.

Exercice 4 :

Pour tout $P \in \mathbb{R}_3[X]$ on définit $f(P) = P(X + 1) - P(X)$.

Calculer $f(X^3)$, $f(X^2)$, $f(X)$ et $f(1)$ puis montrer que, pour tout $P \in \mathbb{R}_3[X]$, $f(P) \in \mathbb{R}_2[X]$.



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

3. Notions de polynômes de matrices

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $P = \sum_{i=0}^p a_i X^i$ un polynôme de $\mathbb{K}[X]$.

Depuis le chapitre sur le calcul matriciel, on sait qu'une combinaison linéaire et un produit de matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont encore des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on note alors $P(M)$ la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ définie par :

$$P(M) = \sum_{i=0}^p a_i M^i = a_p M^p + \dots + a_1 M + a_0 I_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

3. Notions de polynômes de matrices

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $P = \sum_{i=0}^p a_i X^i$ un polynôme de $\mathbb{K}[X]$.

Depuis le chapitre sur le calcul matriciel, on sait qu'une combinaison linéaire et un produit de matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont encore des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on note alors $P(M)$ la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ définie par :

$$P(M) = \sum_{i=0}^p a_i M^i = a_p M^p + \dots + a_1 M + a_0 I_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$$

Définition/Théorème 9 :

- Un polynôme en M commute avec la matrice M : $P(M) \times M = M \times P(M)$.

I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

3. Notions de polynômes de matrices

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $P = \sum_{i=0}^p a_i X^i$ un polynôme de $\mathbb{K}[X]$.

Depuis le chapitre sur le calcul matriciel, on sait qu'une combinaison linéaire et un produit de matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont encore des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on note alors $P(M)$ la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ définie par :

$$P(M) = \sum_{i=0}^p a_i M^i = a_p M^p + \dots + a_1 M + a_0 I_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$$

Définition/Théorème 9 :

- Un polynôme en M commute avec la matrice M : $P(M) \times M = M \times P(M)$.
- Lorsque $P(M) = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$, on dit que P est un **polynôme annulateur** de M .

I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

3. Notions de polynômes de matrices

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $P = \sum_{i=0}^p a_i X^i$ un polynôme de $\mathbb{K}[X]$.

Depuis le chapitre sur le calcul matriciel, on sait qu'une combinaison linéaire et un produit de matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont encore des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on note alors $P(M)$ la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ définie par :

$$P(M) = \sum_{i=0}^p a_i M^i = a_p M^p + \dots + a_1 M + a_0 I_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$$

Définition/Théorème 9 :

- Un polynôme en M commute avec la matrice M : $P(M) \times M = M \times P(M)$.
- Lorsque $P(M) = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$, on dit que P est un **polynôme annulateur** de M .
- Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.
Alors,

I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

3. Notions de polynômes de matrices

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $P = \sum_{i=0}^p a_i X^i$ un polynôme de $\mathbb{K}[X]$.

Depuis le chapitre sur le calcul matriciel, on sait qu'une combinaison linéaire et un produit de matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont encore des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on note alors $P(M)$ la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ définie par :

$$P(M) = \sum_{i=0}^p a_i M^i = a_p M^p + \dots + a_1 M + a_0 I_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$$

Définition/Théorème 9 :

- Un polynôme en M commute avec la matrice M : $P(M) \times M = M \times P(M)$.
- Lorsque $P(M) = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$, on dit que P est un **polynôme annulateur** de M .
- Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.
Alors,
 - $(P \times_{\mathbb{K}[X]} Q)(M) = P(M) \times_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})} Q(M)$,

I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

3. Notions de polynômes de matrices

Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $P = \sum_{i=0}^p a_i X^i$ un polynôme de $\mathbb{K}[X]$.

Depuis le chapitre sur le calcul matriciel, on sait qu'une combinaison linéaire et un produit de matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont encore des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on note alors $P(M)$ la matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ définie par :

$$P(M) = \sum_{i=0}^p a_i M^i = a_p M^p + \dots + a_1 M + a_0 I_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K}).$$

Définition/Théorème 9 :

- Un polynôme en M commute avec la matrice M : $P(M) \times M = M \times P(M)$.
- Lorsque $P(M) = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$, on dit que P est un **polynôme annulateur** de M .
- Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.
Alors,
 - $(P \times_{\mathbb{K}[X]} Q)(M) = P(M) \times_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})} Q(M)$,
 - $(\lambda \cdot_{\mathbb{K}[X]} P +_{\mathbb{K}[X]} Q)(M) = \lambda \cdot_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})} P(M) +_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})} Q(M)$.

I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

3. Notions de polynômes de matrices

Définition/Théorème 9 :

- Un polynôme en M commute avec la matrice M : $P(M) \times M = M \times P(M)$.
- Lorsque $P(M) = 0_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})}$, on dit que P est un **polynôme annulateur** de M .
- Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ et $\lambda \in \mathbb{K}$.

Alors,

- $(P \times_{\mathbb{K}[X]} Q)(M) = P(M) \times_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})} Q(M)$,
- $(\lambda \cdot_{\mathbb{K}[X]} P +_{\mathbb{K}[X]} Q)(M) = \lambda \cdot_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})} P(M) +_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})} Q(M)$.

Corollaire 4 :

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

Alors,

$$P(M) \times_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})} Q(M) = Q(M) \times_{\mathcal{M}_n(\mathbb{K})} P(M).$$



I. L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

3. Notions de polynômes de matrices

Exercice 5 :

$$\text{Soit } A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Montrer que $A^2 + A - 2I_3 = 0_3$. En déduire que A est inversible et calculer A^{-1} .



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

1 L'ensemble $\mathbb{K}[X]$

2 **Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$**

- Polynôme dérivé
- Degré du polynôme dérivé
- Dérivation et opérations
- Fonction polynomiale associée à un polynôme
- Formules de Taylor

3 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

4 Racines d'un polynôme

5 Décomposition en facteurs irréductibles

6 Somme et produit des racines



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

1. Polynôme dérivé

Définition 10 :

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

On appelle **polynôme dérivé de P**, noté P' , le polynôme défini par :

$$P' = \sum_{k=1}^n k a_k X^{k-1}$$



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

1. Polynôme dérivé

Définition 10 :

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

On appelle **polynôme dérivé de P**, noté P' , le polynôme défini par :

$$P' = \sum_{k=1}^n k a_k X^{k-1}$$

On définit également, par récurrence, le **polynôme dérivé k -ième de P**, noté $P^{(k)}$, par

$$\begin{cases} P^{(0)} = P \\ \forall k \in \mathbb{N}, P^{(k+1)} = (P^{(k)})' \end{cases}$$



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

1. Polynôme dérivé

Définition 10 :

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

On appelle **polynôme dérivé de P**, noté P' , le polynôme défini par :

$$P' = \sum_{k=1}^n k a_k X^{k-1}$$

On définit également, par récurrence, le **polynôme dérivé k -ième de P**, noté $P^{(k)}$, par

$$\begin{cases} P^{(0)} = P \\ \forall k \in \mathbb{N}, P^{(k+1)} = (P^{(k)})' \end{cases}$$

Remarque : Il s'agit d'une dérivation formelle : il n'y a pas de question à se poser sur la dérivabilité d'un polynôme comme pour les fonctions de la variable réelle.



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

1. Polynôme dérivé

Définition 10 :

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$.

On appelle **polynôme dérivé de P**, noté P' , le polynôme défini par :

$$P' = \sum_{k=1}^n k a_k X^{k-1}$$

On définit également, par récurrence, le **polynôme dérivé k -ième de P**, noté $P^{(k)}$, par

$$\begin{cases} P^{(0)} = P \\ \forall k \in \mathbb{N}, \quad P^{(k+1)} = (P^{(k)})' \end{cases}$$

Remarque : Il s'agit d'une dérivation formelle : il n'y a pas de question à se poser sur la dérivabilité d'un polynôme comme pour les fonctions de la variable réelle.

Exemple 5 :

$$(1 + 3X - X^2)' = 3 - 2X \quad \text{et} \quad (20)' = 0.$$



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

2. Degré du polynôme dérivé

Proposition 6 :

$$\forall P \in \mathbb{K}[X], \quad \deg(P') = \begin{cases} \deg(P) - 1 & \text{si } \deg(P) \geq 1 \\ -\infty & \text{si } \deg(P) \leq 0 \end{cases}$$



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

2. Degré du polynôme dérivé

Proposition 6 :

$$\forall P \in \mathbb{K}[X], \quad \deg(P') = \begin{cases} \deg(P) - 1 & \text{si } \deg(P) \geq 1 \\ -\infty & \text{si } \deg(P) \leq 0 \end{cases}$$

En particulier, $\forall P \in \mathbb{K}[X], \quad \deg(P) \leq n \implies P^{(n+1)} = 0_{\mathbb{K}[X]}$



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

2. Degré du polynôme dérivé

Proposition 6 :

$$\forall P \in \mathbb{K}[X], \quad \deg(P') = \begin{cases} \deg(P) - 1 & \text{si } \deg(P) \geq 1 \\ -\infty & \text{si } \deg(P) \leq 0 \end{cases}$$

En particulier, $\forall P \in \mathbb{K}[X], \quad \deg(P) \leq n \implies P^{(n+1)} = 0_{\mathbb{K}[X]}$

Remarque : $\forall P \in \mathbb{K}[X], P' = 0_{\mathbb{K}[X]} \iff \deg(P) \leq 0 \iff P$ est constant.



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

3. Dérivation et opérations

Proposition 7 :

$$\bullet \forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \quad (\lambda P + \mu Q)' = \lambda P' + \mu Q'.$$



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

3. Dérivation et opérations

Proposition 7 :

- ❶ $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, (\lambda P + \mu Q)' = \lambda P' + \mu Q'$.
- ❷ $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], (PQ)' = P'Q + PQ'$.



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

3. Dérivation et opérations

Proposition 7 :

- 1 $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, (\lambda P + \mu Q)' = \lambda P' + \mu Q'.$
- 2 $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], (PQ)' = P'Q + PQ'.$
- 3 $\forall P \in \mathbb{K}[X], \forall n \in \mathbb{N}, (P^n)' = nP' \times P^{n-1}.$



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

3. Dérivation et opérations

Proposition 7 :

- 1 $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, (\lambda P + \mu Q)' = \lambda P' + \mu Q'.$
- 2 $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], (PQ)' = P'Q + PQ'.$
- 3 $\forall P \in \mathbb{K}[X], \forall n \in \mathbb{N}, (P^n)' = nP' \times P^{n-1}.$

La dérivation des polynômes est donc, comme pour les fonctions, linéaire



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

3. Dérivation et opérations

Proposition 7 :

- 1 $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, (\lambda P + \mu Q)' = \lambda P' + \mu Q'$.
- 2 $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], (PQ)' = P'Q + PQ'$.
- 3 $\forall P \in \mathbb{K}[X], \forall n \in \mathbb{N}, (P^n)' = nP' \times P^{n-1}$.

La dérivation des polynômes est donc, comme pour les fonctions, linéaire

Exercice 6 :

Déterminer les polynômes :

- 1 $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que $(1 - X)P' - P = X^n$.



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

3. Dérivation et opérations

Proposition 7 :

- 1 $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}, \quad (\lambda P + \mu Q)' = \lambda P' + \mu Q'.$
- 2 $\forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad (PQ)' = P'Q + PQ'.$
- 3 $\forall P \in \mathbb{K}[X], \forall n \in \mathbb{N}, \quad (P^n)' = nP' \times P^{n-1}.$

La dérivation des polynômes est donc, comme pour les fonctions, linéaire

Exercice 6 :

Déterminer les polynômes :

- 1 $P \in \mathbb{R}[X]$ tels que $(1 - X)P' - P = X^n.$
- 2 $P \in \mathbb{C}[X]$ tels que $(X^2 + 1)P' - 6P = 0.$



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

3. Dérivation et opérations

En généralisant,

Proposition 8 :

$$\bullet \forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}[X], \forall n \in \mathbb{N}, \quad (\lambda P + \mu Q)^{(n)} = \lambda P^{(n)} + \mu Q^{(n)}.$$



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

3. Dérivation et opérations

En généralisant,

Proposition 8 :

$$\textcircled{1} \quad \forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \forall \lambda, \mu \in \mathbb{K}[X], \forall n \in \mathbb{N}, \quad (\lambda P + \mu Q)^{(n)} = \lambda P^{(n)} + \mu Q^{(n)}.$$

$$\textcircled{2} \quad \forall P, Q \in \mathbb{K}[X], \forall n \in \mathbb{N}, \quad (PQ)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^{(k)} Q^{(n-k)}.$$

Formule de Leibniz



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

4. Fonction polynomiale associée à un polynôme

Définition II :

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ où $n \in \mathbb{N}$.

La fonction polynomiale associée à P est la fonction définie par

$$\begin{aligned}\tilde{P} : \mathbb{K} &\longrightarrow \mathbb{K} \\ x &\longmapsto \sum_{k=0}^n a_k x^k\end{aligned}$$

II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

4. Fonction polynomiale associée à un polynôme

Définition II :

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ où $n \in \mathbb{N}$.

La fonction polynomiale associée à P est la fonction définie par

$$\begin{aligned}\tilde{P} : \mathbb{K} &\longrightarrow \mathbb{K} \\ x &\longmapsto \sum_{k=0}^n a_k x^k\end{aligned}$$

On appelle **fonction polynomiale** toute fonction $f \in \mathcal{F}(\mathbb{K}, \mathbb{K})$ telle qu'il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ vérifiant :

$$f = \tilde{P}.$$

II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

4. Fonction polynomiale associée à un polynôme

Définition II :

Soit $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ où $n \in \mathbb{N}$.

La fonction polynomiale associée à P est la fonction définie par

$$\begin{aligned}\tilde{P} : \mathbb{K} &\longrightarrow \mathbb{K} \\ x &\longmapsto \sum_{k=0}^n a_k x^k\end{aligned}$$

On appelle fonction polynomiale toute fonction $f \in \mathcal{F}(\mathbb{K}, \mathbb{K})$ telle qu'il existe $P \in \mathbb{K}[X]$ vérifiant :

$$f = \tilde{P}.$$

L'ensemble des fonctions polynomiales définies sur \mathbb{K} à valeurs dans \mathbb{K} est ici noté $Pol(\mathbb{K})$.

II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

4. Fonction polynomiale associée à un polynôme

Exemple 6 :

Si $P = X^2 + 1$, alors $\tilde{P} : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.
 $x \mapsto x^2 + 1$



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

4. Fonction polynomiale associée à un polynôme

Exemple 6 :

$$\begin{aligned} \text{Si } P = X^2 + 1, \text{ alors } \tilde{P} : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^2 + 1 \end{aligned}$$

Par construction,

Corollaire 5 :

$$\begin{aligned} \text{L'application } \Phi : \mathbb{K}[X] &\longrightarrow \text{Pol}(\mathbb{K}) \text{ est surjective.} \\ P &\longmapsto \tilde{P} \end{aligned}$$



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

4. Fonction polynomiale associée à un polynôme

Exemple 6 :

$$\begin{aligned} \text{Si } P = X^2 + 1, \text{ alors } \tilde{P} : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto x^2 + 1 \end{aligned}$$

Par construction,

Corollaire 5 :

$$\begin{aligned} \text{L'application } \Phi : \mathbb{K}[X] &\longrightarrow \text{Pol}(\mathbb{K}) \text{ est surjective.} \\ P &\longmapsto \tilde{P} \end{aligned}$$

ATTENTION

X n'est toujours pas un nombre ! On ne dit pas « Posons $X = 1$ », mais « Évaluons en 1 ».



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

4. Fonction polynomiale associée à un polynôme

Proposition 9 :

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a :

$$\bullet \quad \widetilde{\lambda P + \mu Q} = \lambda \widetilde{P} + \mu \widetilde{Q}.$$



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

4. Fonction polynomiale associée à un polynôme

Proposition 9 :

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a :

$$\textcircled{1} \quad \widetilde{\lambda P + \mu Q} = \lambda \widetilde{P} + \mu \widetilde{Q}.$$

$$\textcircled{2} \quad \widetilde{PQ} = \widetilde{P} \widetilde{Q}.$$



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

4. Fonction polynomiale associée à un polynôme

Proposition 9 :

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a :

$$\textcircled{1} \quad \widetilde{\lambda P + \mu Q} = \lambda \widetilde{P} + \mu \widetilde{Q}.$$

$$\textcircled{2} \quad \widetilde{P \circ Q} = \widetilde{P} \circ \widetilde{Q}.$$

$$\textcircled{3} \quad \widetilde{PQ} = \widetilde{P} \widetilde{Q}.$$



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

4. Fonction polynomiale associée à un polynôme

Proposition 9 :

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a :

$$\textcircled{1} \quad \widetilde{\lambda P + \mu Q} = \lambda \widetilde{P} + \mu \widetilde{Q}.$$

$$\textcircled{2} \quad \widetilde{PQ} = \widetilde{P} \widetilde{Q}.$$

$$\textcircled{3} \quad \widetilde{P \circ Q} = \widetilde{P} \circ \widetilde{Q}.$$

$$\textcircled{4} \quad \widetilde{P'} = (\widetilde{P})'.$$



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

4. Fonction polynomiale associée à un polynôme

Proposition 9 :

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a :

$$\textcircled{1} \quad \widetilde{\lambda P + \mu Q} = \lambda \widetilde{P} + \mu \widetilde{Q}.$$

$$\textcircled{3} \quad \widetilde{P \circ Q} = \widetilde{P} \circ \widetilde{Q}.$$

$$\textcircled{2} \quad \widetilde{PQ} = \widetilde{P} \widetilde{Q}.$$

$$\textcircled{4} \quad \widetilde{P'} = (\widetilde{P})'.$$

$\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ sont dotés de notions différentes d'addition, multiplication, composition et dérivation.

ATTENTION



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

4. Fonction polynomiale associée à un polynôme

Proposition 9 :

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a :

$$\textcircled{1} \quad \widetilde{\lambda P + \mu Q} = \lambda \widetilde{P} + \mu \widetilde{Q}.$$

$$\textcircled{3} \quad \widetilde{P \circ Q} = \widetilde{P} \circ \widetilde{Q}.$$

$$\textcircled{2} \quad \widetilde{PQ} = \widetilde{P} \widetilde{Q}.$$

$$\textcircled{4} \quad \widetilde{P'} = (\widetilde{P})'.$$

$\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ sont dotés de notions différentes d'addition, multiplication, composition et dérivation.

Dans la formule $\widetilde{P \circ Q} = \widetilde{P} \circ \widetilde{Q}$ par exemple, ce ne sont pas les mêmes « \circ » qu'on trouve à gauche et à droite.

ATTENTION



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

4. Fonction polynomiale associée à un polynôme

Proposition 9 :

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a :

$$\textcircled{1} \quad \widetilde{\lambda P + \mu Q} = \lambda \widetilde{P} + \mu \widetilde{Q}.$$

$$\textcircled{3} \quad \widetilde{P \circ Q} = \widetilde{P} \circ \widetilde{Q}.$$

$$\textcircled{2} \quad \widetilde{PQ} = \widetilde{P} \widetilde{Q}.$$

$$\textcircled{4} \quad \widetilde{P'} = (\widetilde{P})'.$$

$\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ sont dotés de notions différentes d'addition, multiplication, composition et dérivation.

Dans la formule $\widetilde{P \circ Q} = \widetilde{P} \circ \widetilde{Q}$ par exemple, ce ne sont pas les mêmes « \circ » qu'on trouve à gauche et à droite.

Pire, dans la formule $\widetilde{P'} = (\widetilde{P})'$, la dérivée P' est une dérivée formelle alors que la dérivée \widetilde{P}' est la dérivée d'une fonction définie comme limite d'un taux d'accroissement.

ATTENTION



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

4. Fonction polynomiale associée à un polynôme

Proposition 9 :

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$. On a :

$$\textcircled{1} \quad \widetilde{\lambda P + \mu Q} = \lambda \widetilde{P} + \mu \widetilde{Q}.$$

$$\textcircled{3} \quad \widetilde{P \circ Q} = \widetilde{P} \circ \widetilde{Q}.$$

$$\textcircled{2} \quad \widetilde{PQ} = \widetilde{P} \widetilde{Q}.$$

$$\textcircled{4} \quad \widetilde{P'} = (\widetilde{P})'.$$

$\mathbb{R}[X]$ et $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ sont dotés de notions différentes d'addition, multiplication, composition et dérivation.

Dans la formule $\widetilde{P \circ Q} = \widetilde{P} \circ \widetilde{Q}$ par exemple, ce ne sont pas les mêmes « \circ » qu'on trouve à gauche et à droite.

Pire, dans la formule $\widetilde{P'} = (\widetilde{P})'$, la dérivée P' est une dérivée formelle alors que la dérivée \widetilde{P}' est la dérivée d'une fonction définie comme limite d'un taux d'accroissement.

Sachant que $\widetilde{1}$ est la fonction constante $x \mapsto 1$, élément neutre de $\mathbb{K}^{\mathbb{K}}$ l'application $P \mapsto \widetilde{P}$ s'avère être un morphisme d'anneaux de $\mathbb{K}[X]$ dans $\mathbb{K}^{\mathbb{K}}$.



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

5. Formules de Taylor

Théorème 10 (Théorème de Taylor) :

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$. On suppose que $\deg(P) = p$.

Alors :

$$\begin{aligned} P &= \sum_{n=0}^p \frac{\tilde{P}^{(n)}(a)}{n!} (X - a)^n \\ &= \tilde{P}(a) + \tilde{P}'(a)(X - a) + \frac{\tilde{P}''(a)}{2!} (X - a)^2 + \dots + \frac{\tilde{P}^{(p)}(a)}{p!} (X - a)^p. \end{aligned}$$



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

5. Formules de Taylor

L'ensemble $\mathbb{R}_n[X]$ étant ce qu'on appelle un espace vectoriel de dimension $n + 1$ (on expliquera cela plus tard), on peut décrire un polynôme de degré n en donnant $n + 1$ réels.

On peut le faire d'au moins trois façons :

- 1 donner les coefficients du polynôme. C'est la façon la plus classique de procéder, mais l'information donnée est finalement assez peu commode à exploiter autrement que très globalement (que signifie le fait qu'un polynôme de degré 8 a un coefficient de degré 3 égal à 5 ? Essentiellement rien).



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

5. Formules de Taylor

L'ensemble $\mathbb{R}_n[X]$ étant ce qu'on appelle un espace vectoriel de dimension $n + 1$ (on expliquera cela plus tard), on peut décrire un polynôme de degré n en donnant $n + 1$ réels.

On peut le faire d'au moins trois façons :

- 1 donner les coefficients du polynôme. C'est la façon la plus classique de procéder, mais l'information donnée est finalement assez peu commode à exploiter autrement que très globalement (que signifie le fait qu'un polynôme de degré 8 a un coefficient de degré 3 égal à 5 ? Essentiellement rien).
- 2 donner les valeurs du polynôme en $n + 1$ réels distincts. Nous détaillerons sûrement cette méthode dans un devoir sur les polynômes dits de Lagrange qui donne une information très concrète mais éparpillée à $n + 1$ endroits différents.



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

5. Formules de Taylor

L'ensemble $\mathbb{R}_n[X]$ étant ce qu'on appelle un espace vectoriel de dimension $n + 1$ (on expliquera cela plus tard), on peut décrire un polynôme de degré n en donnant $n + 1$ réels.

On peut le faire d'au moins trois façons :

- 1 donner les coefficients du polynôme. C'est la façon la plus classique de procéder, mais l'information donnée est finalement assez peu commode à exploiter autrement que très globalement (que signifie le fait qu'un polynôme de degré 8 a un coefficient de degré 3 égal à 5 ? Essentiellement rien).
- 2 donner les valeurs du polynôme en $n + 1$ réels distincts. Nous détaillerons sûrement cette méthode dans un devoir sur les polynômes dits de Lagrange qui donne une information très concrète mais éparpillée à $n + 1$ endroits différents.
- 3 la troisième méthode que nous venons de voir concentre réellement toute l'information au même endroit, puisque la formule de Taylor reconstitue le polynôme à partir des valeurs de ses différentes dérivées en un même réel a .



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

5. Formules de Taylor

Exemple 1 :

$$\text{Soit } f(x) = \frac{2x^3 + 2x^2 + 3x - 4}{(x-1)^3}.$$

Imaginons que nous voulions effectuer sa décomposition en éléments simples dans le but de calculer une primitive de f par exemple.



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

5. Formules de Taylor

Exemple 7 :

$$\text{Soit } f(x) = \frac{2x^3 + 2x^2 + 3x - 4}{(x-1)^3}.$$

Imaginons que nous voulions effectuer sa décomposition en éléments simples dans le but de calculer une primitive de f par exemple.

On souhaite donc écrire $f(x)$ sous la forme $a + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2} + \frac{d}{(x-1)^3}$.



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

5. Formules de Taylor

Exemple 7 :

$$\text{Soit } f(x) = \frac{2x^3 + 2x^2 + 3x - 4}{(x-1)^3}.$$

Imaginons que nous voulions effectuer sa décomposition en éléments simples dans le but de calculer une primitive de f par exemple.

On souhaite donc écrire $f(x)$ sous la forme $a + \frac{b}{x-1} + \frac{c}{(x-1)^2} + \frac{d}{(x-1)^3}$.

Il suffirait de savoir écrire $2x^3 + 2x^2 + 3x - 4$ sous la forme $a(x-1)^3 + b(x-1)^2 + c(x-1) + d$ pour conclure.

La formule de Taylor permet d'éviter les développements, l'identification, et la résolution du système.



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

5. Formules de Taylor

Exemple 1 :

$$\text{Soit } f(x) = \frac{2x^3 + 2x^2 + 3x - 4}{(x-1)^3}.$$

$$\begin{array}{ll} P = 2X^3 + 2X^2 + 3X - 4 & \text{donc } P(1) = 3 \\ P' = 6X^2 + 4X + 3 & \text{donc } P'(1) = 13 \\ P'' = 12X + 4 & \text{donc } P''(1) = 16 \\ P^{(3)} = 12 & \text{donc } P^{(3)}(1) = 12 \end{array}$$



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

5. Formules de Taylor

Exemple 1 :

$$\text{Soit } f(x) = \frac{2x^3 + 2x^2 + 3x - 4}{(x-1)^3}.$$

$$\begin{array}{ll} P = 2X^3 + 2X^2 + 3X - 4 & \text{donc } P(1) = 3 \\ P' = 6X^2 + 4X + 3 & \text{donc } P'(1) = 13 \\ P'' = 12X + 4 & \text{donc } P''(1) = 16 \\ P^{(3)} = 12 & \text{donc } P^{(3)}(1) = 12 \end{array}$$

D'après le théorème de Taylor :

$$P = P(1) + P'(1)(X-1) + \frac{P''(1)}{2}(X-1)^2 + \frac{P^{(3)}(1)}{3!}(X-1)^3.$$



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

5. Formules de Taylor

Exemple 1 :

$$\text{Soit } f(x) = \frac{2x^3 + 2x^2 + 3x - 4}{(x-1)^3}.$$

$$\begin{array}{ll} P = 2X^3 + 2X^2 + 3X - 4 & \text{donc } P(1) = 3 \\ P' = 6X^2 + 4X + 3 & \text{donc } P'(1) = 13 \\ P'' = 12X + 4 & \text{donc } P''(1) = 16 \\ P^{(3)} = 12 & \text{donc } P^{(3)}(1) = 12 \end{array}$$

D'après le théorème de Taylor :

$$P = P(1) + P'(1)(X-1) + \frac{P''(1)}{2}(X-1)^2 + \frac{P^{(3)}(1)}{3!}(X-1)^3.$$

$$\text{D'où } P = 3 + 13(X-1) + 8(X-1)^2 + 2(X-1)^3 \text{ et } f(x) = \frac{3}{(x-1)^3} + \frac{13}{(x-1)^2} + \frac{8}{x-1} + 2.$$



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

5. Formules de Taylor

Exemple 1 :

$$\text{Soit } f(x) = \frac{2x^3 + 2x^2 + 3x - 4}{(x-1)^3}.$$

$$\begin{array}{ll} P = 2X^3 + 2X^2 + 3X - 4 & \text{donc } P(1) = 3 \\ P' = 6X^2 + 4X + 3 & \text{donc } P'(1) = 13 \\ P'' = 12X + 4 & \text{donc } P''(1) = 16 \\ P^{(3)} = 12 & \text{donc } P^{(3)}(1) = 12 \end{array}$$

D'après le théorème de Taylor :

$$P = P(1) + P'(1)(X-1) + \frac{P''(1)}{2}(X-1)^2 + \frac{P^{(3)}(1)}{3!}(X-1)^3.$$

$$\text{D'où } P = 3 + 13(X-1) + 8(X-1)^2 + 2(X-1)^3 \text{ et } f(x) = \frac{3}{(x-1)^3} + \frac{13}{(x-1)^2} + \frac{8}{x-1} + 2.$$

Exercice 1 :

$$\text{Donner la décomposition en éléments simples de } f : x \mapsto \frac{4x^3 - 3x^2 + 7x - 1}{(x-2)^3}.$$

II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

5. Formules de Taylor

Corollaire 6 :

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$. On suppose que $\deg(P) = p$.

Alors :

$$P(X + a) = \sum_{n=0}^p \frac{\tilde{P}^{(n)}(a)}{n!} X^n.$$



II. Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$

5. Formules de Taylor

Corollaire 6 :

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$. On suppose que $\deg(P) = p$.

Alors :

$$P(X + a) = \sum_{n=0}^p \frac{\tilde{P}^{(n)}(a)}{n!} X^n.$$

Théorème II (Théorème de Taylor-Mac Laurin) :

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$. On suppose que $\deg(P) = p$.

Alors :

$$P = \sum_{n=0}^p \frac{\tilde{P}^{(n)}(0)}{n!} X^n.$$



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

- 1 L'ensemble $\mathbb{K}[X]$
- 2 Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$
- 3 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$**
 - Divisibilité
 - Division euclidienne
 - Polynômes irréductibles
- 4 Racines d'un polynôme
- 5 Décomposition en facteurs irréductibles
- 6 Somme et produit des racines



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

1. Divisibilité

Définition 12 :

Soient $A, P \in \mathbb{K}[X]$.

- On dit que **A divise P**, noté $A|P$, s'il existe un polynôme $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = AQ$.
On dit alors que **A est un diviseur** de P ou que P est **un multiple** de A .



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

1. Divisibilité

Définition 12 :

Soient $A, P \in \mathbb{K}[X]$.

- On dit que **A divise P**, noté $A|P$, s'il existe un polynôme $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = AQ$.
On dit alors que **A** est un **diviseur** de **P** ou que **P** est un **multiple** de **A**.
- On dit que **A** et **P** sont **associés** s'il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $P = \lambda A$.



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

1. Divisibilité

Définition 12 :

Soient $A, P \in \mathbb{K}[X]$.

- On dit que **A divise P**, noté $A|P$, s'il existe un polynôme $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = AQ$.
On dit alors que **A est un diviseur** de P ou que P est **un multiple** de A .
- On dit que **A et P sont associés** s'il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $P = \lambda A$.

Exemples 8 :

- $X - 1 | X^2 - 1$ car $X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$.



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

1. Divisibilité

Définition 12 :

Soient $A, P \in \mathbb{K}[X]$.

- On dit que **A divise P**, noté $A|P$, s'il existe un polynôme $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = AQ$.
On dit alors que **A** est un **diviseur** de **P** ou que **P** est un **multiple** de **A**.
- On dit que **A** et **P** sont **associés** s'il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $P = \lambda A$.

Exemples 8 :

- $X - 1|X^2 - 1$ car $X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$.
- $X - 3$ et $2X - 6$ sont associés car $2X - 6 = 2(X - 3)$.



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

1. Divisibilité

Définition 12 :

Soient $A, P \in \mathbb{K}[X]$.

- On dit que **A divise P**, noté $A|P$, s'il existe un polynôme $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = AQ$.
On dit alors que **A** est un **diviseur** de **P** ou que **P** est un **multiple** de **A**.
- On dit que **A** et **P** sont **associés** s'il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $P = \lambda A$.

Exemples 8 :

- $X - 1|X^2 - 1$ car $X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$.
- $X - 3$ et $2X - 6$ sont associés car $2X - 6 = 2(X - 3)$.
- Tous les polynômes divisent le polynôme nul.



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

1. Divisibilité

Définition 12 :

Soient $A, P \in \mathbb{K}[X]$.

- On dit que **A divise P**, noté $A|P$, s'il existe un polynôme $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = AQ$.
On dit alors que **A** est un **diviseur** de **P** ou que **P** est un **multiple** de **A**.
- On dit que **A** et **P** sont **associés** s'il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $P = \lambda A$.

Exemples 8 :

- $X - 1|X^2 - 1$ car $X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$.
- $X - 3$ et $2X - 6$ sont associés car $2X - 6 = 2(X - 3)$.
- Tous les polynômes divisent le polynôme nul.
- $\forall P \in \mathbb{K}[X], \quad 0|P \iff P = 0$.



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

1. Divisibilité

Proposition 12 :

$$\textcircled{1} \quad \forall A \in \mathbb{K}[X], \quad A|A \text{ et } A|0$$



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

1. Divisibilité

Proposition 12 :

① $\forall A \in \mathbb{K}[X], \quad A|A \text{ et } A|0$

② $\forall A, B \in \mathbb{K}[X], \quad \begin{cases} A|B \\ B|A \end{cases} \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^*, \quad B = \lambda A.$



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

1. Divisibilité

Proposition 12 :

① $\forall A \in \mathbb{K}[X], \quad A|A \text{ et } A|0$

② $\forall A, B \in \mathbb{K}[X], \quad \begin{cases} A|B \\ B|A \end{cases} \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^*, \quad B = \lambda A.$

③ $\forall A, B, C \in \mathbb{K}[X], \quad \begin{cases} A|B \\ B|C \end{cases} \implies A|C.$



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

1. Divisibilité

Proposition 12 :

$$\textcircled{1} \quad \forall A \in \mathbb{K}[X], \quad A|A \text{ et } A|0$$

$$\textcircled{2} \quad \forall A, B \in \mathbb{K}[X], \quad \begin{cases} A|B \\ B|A \end{cases} \iff \exists \lambda \in \mathbb{K}^*, \quad B = \lambda A.$$

$$\textcircled{3} \quad \forall A, B, C \in \mathbb{K}[X], \quad \begin{cases} A|B \\ B|C \end{cases} \implies A|C.$$

Remarque : La divisibilité dans $\mathbb{K}[X]$ n'est pas une relation d'ordre.



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

1. Divisibilité

Proposition 13 (Compatibilité avec les opérations) :

$$\bullet \forall A, P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad A|P \implies A|PQ$$



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

1. Divisibilité

Proposition 13 (Compatibilité avec les opérations) :

$$\textcircled{1} \quad \forall A, P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad A|P \implies A|PQ$$

$$\textcircled{2} \quad \forall A, P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad \begin{cases} A|P \\ A|Q \end{cases} \implies A|P + Q$$



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

1. Divisibilité

Proposition 13 (Compatibilité avec les opérations) :

$$\textcircled{1} \quad \forall A, P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad A|P \implies A|PQ$$

$$\textcircled{2} \quad \forall A, P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad \begin{cases} A|P \\ A|Q \end{cases} \implies A|P + Q$$

$$\textcircled{3} \quad \forall A, P, B, Q \in \mathbb{K}[X], \quad \begin{cases} A|P \\ B|Q \end{cases} \implies AB|PQ$$



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

1. Divisibilité

Proposition 13 (Compatibilité avec les opérations) :

$$\textcircled{1} \quad \forall A, P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad A|P \implies A|PQ$$

$$\textcircled{2} \quad \forall A, P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad \begin{cases} A|P \\ A|Q \end{cases} \implies A|P + Q$$

$$\textcircled{3} \quad \forall A, P, B, Q \in \mathbb{K}[X], \quad \begin{cases} A|P \\ B|Q \end{cases} \implies AB|PQ$$

$$\textcircled{4} \quad \forall A, P \in \mathbb{K}[X], \forall n \in \mathbb{N}, \quad A|P \implies A^n|P^n$$



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

1. Divisibilité

Proposition 13 (Compatibilité avec les opérations) :

$$\textcircled{1} \quad \forall A, P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad A|P \implies A|PQ$$

$$\textcircled{2} \quad \forall A, P, Q \in \mathbb{K}[X], \quad \begin{cases} A|P \\ A|Q \end{cases} \implies A|P + Q$$

$$\textcircled{3} \quad \forall A, P, B, Q \in \mathbb{K}[X], \quad \begin{cases} A|P \\ B|Q \end{cases} \implies AB|PQ$$

$$\textcircled{4} \quad \forall A, P \in \mathbb{K}[X], \forall n \in \mathbb{N}, \quad A|P \implies A^n|P^n$$

ATTENTION

$\begin{cases} A|P \\ B|P \end{cases}$ n'implique pas $AB|P$.



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

2. Division euclidienne

Théorème 14 :

Soient $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$, avec $B \neq 0$.

Il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que :

$$A = BQ + R \quad \text{et} \quad \deg(R) < \deg(B).$$



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

2. Division euclidienne

Théorème 14 :

Soient $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$, avec $B \neq 0$.

Il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que :

$$A = BQ + R \quad \text{et} \quad \deg(R) < \deg(B).$$

Lorsqu'on a obtenu cette écriture, on dit qu'on a effectué la **division euclidienne** de A par B .

A est le **dividende**, B le **diviseur**, Q le **quotient** et R le **reste**.



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

2. Division euclidienne

Théorème 14 :

Soient $(A, B) \in \mathbb{K}[X]^2$, avec $B \neq 0$.

Il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]^2$ tel que :

$$A = BQ + R \quad \text{et} \quad \deg(R) < \deg(B).$$

Lorsqu'on a obtenu cette écriture, on dit qu'on a effectué la **division euclidienne** de A par B .

A est le **dividende**, B le **diviseur**, Q le **quotient** et R le **reste**.

Exemple 9 :

$$2X^4 - X^3 + 6X^2 + 7X - 14 = (X^2 + X + 1)(2X^2 - 3X + 7) + (3X - 21)$$



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

2. Division euclidienne

Exercice 8 :

Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}, X^2 \mid (X+1)^n - nX + 1$.



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

2. Division euclidienne

Exemple 10 :

Soit $P = X^4 + 5X^3 + 5X^2 - 5X - 6$. Effectuons la division euclidienne de P par $X - 1$.

$$\begin{array}{r|l} X^4 + 5X^3 + 5X^2 - 5X - 6 & X - 1 \\ \hline & \end{array}$$



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

2. Division euclidienne

Exemple 10 :

Soit $P = X^4 + 5X^3 + 5X^2 - 5X - 6$. Effectuons la division euclidienne de P par $X - 1$.

$$\begin{array}{r|l} 1X^4 + 5X^3 + 5X^2 - 5X - 6 & X - 1 \\ -(X^4 - X^3) & \hline \hline 6X^3 + 5X^2 - 5X - 6 & 1X^3 \end{array}$$



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

2. Division euclidienne

Exemple 10 :

Soit $P = X^4 + 5X^3 + 5X^2 - 5X - 6$. Effectuons la division euclidienne de P par $X - 1$.

$$\begin{array}{r|l} 1X^4 & + & 5X^3 & + & 5X^2 & - & 5X & - & 6 \\ -(X^4 & - & X^3) & & & & & & \\ \hline & & 6X^3 & + & 5X^2 & - & 5X & - & 6 \\ & & -(6X^3 & - & 6X^2) & & & & \\ & & & & 11X^2 & - & 5X & - & 6 \end{array}$$



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

2. Division euclidienne

Exemple 10 :

Soit $P = X^4 + 5X^3 + 5X^2 - 5X - 6$. Effectuons la division euclidienne de P par $X - 1$.

$$\begin{array}{r} 1X^4 + 5X^3 + 5X^2 - 5X - 6 \\ -(X^4 - X^3) \\ \hline 6X^3 + 5X^2 - 5X - 6 \\ -(6X^3 - 6X^2) \\ \hline 11X^2 - 5X - 6 \\ -(11X^2 - 11X) \\ \hline 6X - 6 \end{array} \quad \begin{array}{l} X - 1 \\ \hline 1X^3 + 6X^2 + 11X \end{array}$$



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

2. Division euclidienne

Exemple 10 :

Soit $P = X^4 + 5X^3 + 5X^2 - 5X - 6$. Effectuons la division euclidienne de P par $X - 1$.

$$\begin{array}{r} 1X^4 + 5X^3 + 5X^2 - 5X - 6 \\ -(X^4 - X^3) \\ \hline 6X^3 + 5X^2 - 5X - 6 \\ -(6X^3 - 6X^2) \\ \hline 11X^2 - 5X - 6 \\ -(11X^2 - 11X) \\ \hline 6X - 6 \\ -(6X - 6) \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} X - 1 \\ \hline 1X^3 + 6X^2 + 11X + 6 \end{array}$$



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

2. Division euclidienne

Exemple 10 :

Soit $P = X^4 + 5X^3 + 5X^2 - 5X - 6$. Effectuons la division euclidienne de P par $X - 1$.

$$\begin{array}{r|l} \begin{array}{r} 1X^4 + 5X^3 + 5X^2 - 5X - 6 \\ -(X^4 - X^3) \\ \hline 6X^3 + 5X^2 - 5X - 6 \\ -(6X^3 - 6X^2) \\ \hline 11X^2 - 5X - 6 \\ -(11X^2 - 11X) \\ \hline 6X - 6 \\ -(6X - 6) \\ \hline 0 \end{array} & \begin{array}{l} X - 1 \\ \hline 1X^3 + 6X^2 + 11X + 6 \end{array} \end{array}$$

On obtient donc, $P = (X - 1)(X^3 + 6X^2 + 11X + 6)$.



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

2. Division euclidienne

Exemple 10 :

Soit $P = X^4 + 5X^3 + 5X^2 - 5X - 6$. Effectuons la division euclidienne de P par $X - 1$.

$$\begin{array}{r|l} 1X^4 & + & 5X^3 & + & 5X^2 & - & 5X & - & 6 & & X - 1 \\ -(X^4 & - & X^3) & & & & & & & & \hline \hline & & 6X^3 & + & 5X^2 & - & 5X & - & 6 & & 1X^3 + 6X^2 + 11X + 6 \\ & & -(6X^3 & - & 6X^2) & & & & & & \hline & & & & 11X^2 & - & 5X & - & 6 & & \\ & & & & -(11X^2 & - & 11X) & & & & \hline & & & & & & 6X & - & 6 & & \\ & & & & & & -(6X & - & 6) & & \hline & & & & & & & & 0 & & \end{array}$$

On obtient donc, $P = (X - 1)(X^3 + 6X^2 + 11X + 6)$.

Cette méthode de calcul est une alternative à l'identification lorsqu'on cherche à factoriser un polynôme comme ici, par exemple, après avoir trouvé 1 comme racine évidente.



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

2. Division euclidienne

Exercice 9 :

Soit la matrice $M = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

- 1 Vérifier que $M^2 + 2M - 3I_3 = 0_3$.



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

2. Division euclidienne

Exercice 9 :

Soit la matrice $M = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

- 1 Vérifier que $M^2 + 2M - 3I_3 = 0_3$.
- 2 En déduire que M est inversible.



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

2. Division euclidienne

Exercice 9 :

Soit la matrice $M = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

- 1 Vérifier que $M^2 + 2M - 3I_3 = 0_3$.
- 2 En déduire que M est inversible.
- 3 On définit le polynôme $P = X^2 + 2X - 3$.



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

2. Division euclidienne

Exercice 9 :

Soit la matrice $M = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

- 1 Vérifier que $M^2 + 2M - 3I_3 = 0_3$.
- 2 En déduire que M est inversible.
- 3 On définit le polynôme $P = X^2 + 2X - 3$.
 - 1 Factoriser P .



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

2. Division euclidienne

Exercice 9 :

Soit la matrice $M = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

- 1 Vérifier que $M^2 + 2M - 3I_3 = 0_3$.
- 2 En déduire que M est inversible.
- 3 On définit le polynôme $P = X^2 + 2X - 3$.
 - 1 Factoriser P .
 - 2 Déterminer le reste R de la division euclidienne de X^n par P .



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

2. Division euclidienne

Exercice 9 :

Soit la matrice $M = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 2 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

- 1 Vérifier que $M^2 + 2M - 3I_3 = 0_3$.
- 2 En déduire que M est inversible.
- 3 On définit le polynôme $P = X^2 + 2X - 3$.
 - 1 Factoriser P .
 - 2 Déterminer le reste R de la division euclidienne de X^n par P .
 - 3 En déduire M^n



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

2. Division euclidienne

La méthode exposée dans l'exercice précédent est générale :

Méthode 1 :

Si P est un polynôme annulateur de la matrice A *i.e.* si $P(A) = 0$, on écrit la division euclidienne de X^n par P :

$$\exists Q_n, R_n \in \mathbb{K}[X], X^n = Q_n P + R_n \quad \text{et} \quad \deg(R_n) < \deg(P).$$



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

2. Division euclidienne

La méthode exposée dans l'exercice précédent est générale :

Méthode I :

Si P est un polynôme annulateur de la matrice A *i.e.* si $P(A) = 0$, on écrit la division euclidienne de X^n par P :

$$\exists Q_n, R_n \in \mathbb{K}[X], X^n = Q_n P + R_n \quad \text{et} \quad \deg(R_n) < \deg(P).$$

La relation matricielle $A^n = \underbrace{P(A)}_{=0} \times Q_n(A) + R_n(A)$ donne $A^n = R_n(A)$.



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

2. Division euclidienne

La méthode exposée dans l'exercice précédent est générale :

Méthode I :

Si P est un polynôme annulateur de la matrice A *i.e.* si $P(A) = 0$, on écrit la division euclidienne de X^n par P :

$$\exists Q_n, R_n \in \mathbb{K}[X], X^n = Q_n P + R_n \quad \text{et} \quad \deg(R_n) < \deg(P).$$

La relation matricielle $A^n = \underbrace{P(A)}_{=0} \times Q_n(A) + R_n(A)$ donne $A^n = R_n(A)$. Il suffit donc de connaître R_n .



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

2. Division euclidienne

Proposition 15 :

Soient A et B deux polynômes avec B non nul.

$B|A \iff$ le reste dans la division euclidienne de A par B est nul.



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

2. Division euclidienne

Proposition 15 :

Soient A et B deux polynômes avec B non nul.

$B|A \iff$ le reste dans la division euclidienne de A par B est nul.

Exercice 10 :

Démontrer que $X^2 - 3X + 2$ divise le polynôme $(X - 2)^{2n} + (X - 1)^n - 1$.



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

3. Polynômes irréductibles

Définition 13 :

Un polynôme de $\mathbb{K}[X]$ est dit **irréductible** ou **premier** si :

- $\deg(P) \geq 1$



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

3. Polynômes irréductibles

Définition 13 :

Un polynôme de $\mathbb{K}[X]$ est dit **irréductible** ou **premier** si :

- $\deg(P) \geq 1$
- P n'admet comme diviseurs que les λ (avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$) et les μP (avec $\mu \in \mathbb{K}^*$).



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

3. Polynômes irréductibles

Définition 13 :

Un polynôme de $\mathbb{K}[X]$ est dit **irréductible** ou **premier** si :

- $\deg(P) \geq 1$
- P n'admet comme diviseurs que les λ (avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$) et les μP (avec $\mu \in \mathbb{K}^*$).

Un même polynôme peut être irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ mais pas dans $\mathbb{C}[X]$:

ATTENTION

- $X^2 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$.



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

3. Polynômes irréductibles

Définition 13 :

Un polynôme de $\mathbb{K}[X]$ est dit **irréductible** ou **premier** si :

- $\deg(P) \geq 1$
- P n'admet comme diviseurs que les λ (avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$) et les μP (avec $\mu \in \mathbb{K}^*$).

Un même polynôme peut être irréductible dans $\mathbb{R}[X]$ mais pas dans $\mathbb{C}[X]$:

ATTENTION

- $X^2 + 1$ est irréductible dans $\mathbb{R}[X]$.
- $X^2 + 1 = (X + i)(X - i)$ dans $\mathbb{C}[X]$ et donc il est non irréductible.



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

3. Polynômes irréductibles

Théorème 16 (Admis) :

Tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré ≥ 1 admet une décomposition en produit de polynômes irréductibles, unique à l'ordre près des facteurs et aux constantes multiplicatives près.



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

3. Polynômes irréductibles

Théorème 16 (Admis) :

Tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré ≥ 1 admet une décomposition en produit de polynômes irréductibles, unique à l'ordre près des facteurs et aux constantes multiplicatives près.

On dit que $\mathbb{K}[X]$, tout comme \mathbb{Z} , est un anneau *factoriel*.



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

3. Polynômes irréductibles

Théorème 16 (Admis) :

Tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré ≥ 1 admet une décomposition en produit de polynômes irréductibles, unique à l'ordre près des facteurs et aux constantes multiplicatives près.

On dit que $\mathbb{K}[X]$, tout comme \mathbb{Z} , est un anneau *factoriel*.

Exemples II :

Dans $\mathbb{R}[X]$, $X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1) = \left(\frac{1}{2}X + \frac{1}{2}\right)(2X^2 + 2X + 2)$.



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

3. Polynômes irréductibles

Théorème 16 (Admis) :

Tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré ≥ 1 admet une décomposition en produit de polynômes irréductibles, unique à l'ordre près des facteurs et aux constantes multiplicatives près.

On dit que $\mathbb{K}[X]$, tout comme \mathbb{Z} , est un anneau *factoriel*.

Exemples II :

$$\text{Dans } \mathbb{R}[X], X^3 - 1 = (X - 1)(X^2 + X + 1) = \left(\frac{1}{2}X + \frac{1}{2}\right)(2X^2 + 2X + 2).$$

$$\text{Dans } \mathbb{C}[X], X^3 - 1 = (X - 1)(X - j)(X - \bar{j}) = \left(\frac{1}{6}X + \frac{1}{6}\right)(2X - 2j)(3X - 3\bar{j}).$$



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

3. Polynômes irréductibles

Corollaire 7 :

Tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré ≥ 1 admet (au moins) un diviseur irréductible.



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

3. Polynômes irréductibles

Corollaire 7 :

Tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré ≥ 1 admet (au moins) un diviseur irréductible.

Proposition 17 :

Les polynômes de $\mathbb{K}[X]$ de degré 1 sont irréductibles.



III. Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

3. Polynômes irréductibles

Corollaire 7 :

Tout polynôme de $\mathbb{K}[X]$ de degré ≥ 1 admet (au moins) un diviseur irréductible.

Proposition 17 :

Les polynômes de $\mathbb{K}[X]$ de degré 1 sont irréductibles.

Toute la question va être de savoir si la réciproque est vraie ou non *i.e.* les polynômes irréductibles SONT les polynômes de degré 1. Cela va dépendre de \mathbb{K} .



IV. Racines d'un polynôme

- 1 L'ensemble $\mathbb{K}[X]$
- 2 Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$
- 3 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$
- 4 Racines d'un polynôme**
 - Identification entre $Pol(\mathbb{K})$ et $\mathbb{K}[X]$
 - Ordre de multiplicité d'une racine
- 5 Décomposition en facteurs irréductibles
- 6 Somme et produit des racines



IV. Racines d'un polynôme

Définition 14 :

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

On dit que α est **une racine de P** (ou **un zéro P**) lorsque $\tilde{P}(\alpha) = 0$.



IV. Racines d'un polynôme

Définition 14 :

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

On dit que α est **une racine de P** (ou **un zéro P**) lorsque $\tilde{P}(\alpha) = 0$.

Exemple 12 :

1 est une racine de $P = X^2 - 1$ car $\tilde{P}(x) = x^2 - 1$ et $\tilde{P}(1) = 1^2 - 1 = 0$.



IV. Racines d'un polynôme

Définition 14 :

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

On dit que α est une racine de P (ou un zéro P) lorsque $\tilde{P}(\alpha) = 0$.

Exemple 12 :

1 est une racine de $P = X^2 - 1$ car $\tilde{P}(x) = x^2 - 1$ et $\tilde{P}(1) = 1^2 - 1 = 0$.

Théorème 18 :

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

α est une racine de $P \iff P$ est divisible par $X - \alpha$.



IV. Racines d'un polynôme

Définition 14 :

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

On dit que α est une racine de P (ou un zéro P) lorsque $\tilde{P}(\alpha) = 0$.

Exemple 12 :

1 est une racine de $P = X^2 - 1$ car $\tilde{P}(x) = x^2 - 1$ et $\tilde{P}(1) = 1^2 - 1 = 0$.

Théorème 18 :

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

α est une racine de $P \iff P$ est divisible par $X - \alpha$.

Remarque : Le reste dans la division euclidienne de P par $X - \alpha$ est $\tilde{P}(\alpha)$.



IV. Racines d'un polynôme

Corollaire 8 :

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$.

Si P admet n racines distinctes $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, alors P est divisible par $\prod_{k=1}^n (X - \alpha_k)$.



IV. Racines d'un polynôme

Corollaire 8 :

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$.

Si P admet n racines distinctes $\alpha_1, \dots, \alpha_n$, alors P est divisible par $\prod_{k=1}^n (X - \alpha_k)$.

Exercice II :

À quelle condition nécessaire et suffisante sur $n \in \mathbb{N}$ le polynôme $X^2 + 1$ divise-t-il $X^n + 1$?



IV. Racines d'un polynôme

Théorème 19 :

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul, de degré $n \geq 0$.

Alors, P possède au maximum n racines.



IV. Racines d'un polynôme

Théorème 19 :

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul, de degré $n \geq 0$.

Alors, P possède au maximum n racines.

ATTENTION

Dans \mathbb{R} , un polynôme de degré n ne possède pas forcément n racines.



IV. Racines d'un polynôme

Théorème 19 :

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul, de degré $n \geq 0$.

Alors, P possède au maximum n racines.

ATTENTION

Dans \mathbb{R} , un polynôme de degré n ne possède pas forcément n racines.

Corollaire 9 :

- 1 Tout polynôme non nul possède un nombre fini de racines.



IV. Racines d'un polynôme

Théorème 19 :

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul, de degré $n \geq 0$.

Alors, P possède au maximum n racines.

ATTENTION

Dans \mathbb{R} , un polynôme de degré n ne possède pas forcément n racines.

Corollaire 9 :

- 1 Tout polynôme non nul possède un nombre fini de racines.
- 2 Le seul polynôme admettant une infinité de racines est le polynôme nul.



IV. Racines d'un polynôme

Théorème 19 :

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ non nul, de degré $n \geq 0$.

Alors, P possède au maximum n racines.

ATTENTION

Dans \mathbb{R} , un polynôme de degré n ne possède pas forcément n racines.

Corollaire 9 :

- 1 Tout polynôme non nul possède un nombre fini de racines.
- 2 Le seul polynôme admettant une infinité de racines est le polynôme nul.

Exemple 13 :

La fonction \cos n'est pas polynomiale.



IV. Racines d'un polynôme

Exercice 12 (Polynômes de Tchebychev) :

- ① Démontrer qu'il existe une unique suite de polynômes $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que :
 $T_0 = 1$, $T_1 = X$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n$.



IV. Racines d'un polynôme

Exercice 12 (Polynômes de Tchebychev) :

- 1 Démontrer qu'il existe une unique suite de polynômes $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que :
 $T_0 = 1$, $T_1 = X$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n$.
- 2 Calculer T_2 , T_3 , et T_4 .



IV. Racines d'un polynôme

Exercice 12 (Polynômes de Tchebychev) :

- 1 Démontrer qu'il existe une unique suite de polynômes $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ telle que :
 $T_0 = 1$, $T_1 = X$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $T_{n+2} = 2XT_{n+1} - T_n$.
- 2 Calculer T_2 , T_3 , et T_4 .
- 3 Démontrer que $T_n(\cos \theta) = \cos n\theta$ pour tout $\theta \in \mathbb{R}$.
En déduire les racines de T_n .



IV. Racines d'un polynôme

1. Identification entre $Pol(\mathbb{K})$ et $\mathbb{K}[X]$

Proposition 20 :

L'application $\Phi : \mathbb{K}[X] \rightarrow Pol(\mathbb{K})$ est bijective.

$$P \mapsto \tilde{P}$$



IV. Racines d'un polynôme

1. Identification entre $Pol(\mathbb{K})$ et $\mathbb{K}[X]$

Proposition 20 :

L'application $\Phi : \mathbb{K}[X] \rightarrow Pol(\mathbb{K})$ est bijective.

$$P \mapsto \tilde{P}$$

Chaque fonction polynomiale f est donc associée de manière unique à un et un seul polynôme P .



IV. Racines d'un polynôme

1. Identification entre $Pol(\mathbb{K})$ et $\mathbb{K}[X]$

Proposition 20 :

L'application $\Phi : \mathbb{K}[X] \rightarrow Pol(\mathbb{K})$ est bijective.

$$P \mapsto \tilde{P}$$

Chaque fonction polynomiale f est donc associée de manière unique à un et un seul polynôme P .

On se permettra donc par la suite d'identifier P et \tilde{P} , ce que l'on avait commencé à faire avec les polynômes constants.



IV. Racines d'un polynôme

1. Identification entre $Pol(\mathbb{K})$ et $\mathbb{K}[X]$

Proposition 20 :

L'application $\Phi : \mathbb{K}[X] \rightarrow Pol(\mathbb{K})$ est bijective.

$$P \mapsto \tilde{P}$$

Chaque fonction polynomiale f est donc associée de manière unique à un et un seul polynôme P .

On se permettra donc par la suite d'identifier P et \tilde{P} , ce que l'on avait commencé à faire avec les polynômes constants.

On écrira donc en particulier à partir de maintenant $P(\alpha)$ au lieu de $\tilde{P}(\alpha)$ ($\alpha \in \mathbb{K}$).



IV. Racines d'un polynôme

1. Identification entre $\text{Pol}(\mathbb{K})$ et $\mathbb{K}[X]$

Corollaire 10 (Polynômes de Lagrange) :

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, x_2, \dots, x_{n+1} \in \mathbb{K}$ distincts deux à deux et $y_1, y_2, \dots, y_{n+1} \in \mathbb{K}$.

Il existe un unique polynôme de degré inférieur ou égal à n tel que :

$$\forall i \in \llbracket 1; n+1 \rrbracket, \quad P(x_i) = y_i.$$



IV. Racines d'un polynôme

1. Identification entre $\text{Pol}(\mathbb{K})$ et $\mathbb{K}[X]$

Corollaire 10 (Polynômes de Lagrange) :

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, x_2, \dots, x_{n+1} \in \mathbb{K}$ distincts deux à deux et $y_1, y_2, \dots, y_{n+1} \in \mathbb{K}$.

Il existe un unique polynôme de degré inférieur ou égal à n tel que :

$$\forall i \in \llbracket 1; n+1 \rrbracket, \quad P(x_i) = y_i.$$

Il s'agit du polynôme défini par la formule :

$$P = \sum_{i=1}^{n+1} \left(\prod_{k \neq i} \frac{X - x_k}{x_i - x_k} \right) y_i.$$



IV. Racines d'un polynôme

1. Identification entre $\text{Pol}(\mathbb{K})$ et $\mathbb{K}[X]$

Corollaire 10 (Polynômes de Lagrange) :

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $x_1, x_2, \dots, x_{n+1} \in \mathbb{K}$ distincts deux à deux et $y_1, y_2, \dots, y_{n+1} \in \mathbb{K}$.

Il existe un unique polynôme de degré inférieur ou égal à n tel que :

$$\forall i \in \llbracket 1; n+1 \rrbracket, \quad P(x_i) = y_i.$$

Il s'agit du polynôme défini par la formule :

$$P = \sum_{i=1}^{n+1} \left(\prod_{k \neq i} \frac{X - x_k}{x_i - x_k} \right) y_i.$$

Remarque : Lorsque $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, cela signifie qu'il existe une unique fonction polynômiale P de degré inférieur au égal à n dont le graphe passe par les $n+1$ points du plan $M_1(x_1, y_1), \dots, M_{n+1}(x_{n+1}, y_{n+1})$.



IV. Racines d'un polynôme

2. Ordre de multiplicité d'une racine

Définition 15 :

Soit P un polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

Si α est une racine de P , on appelle **ordre de multiplicité de la racine α dans P** le plus grand entier n tel que $(X - \alpha)^n | P$.



IV. Racines d'un polynôme

2. Ordre de multiplicité d'une racine

Définition 15 :

Soit P un polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

Si α est une racine de P , on appelle **ordre de multiplicité de la racine α dans P** le plus grand entier n tel que $(X - \alpha)^n | P$.

Remarques :

- Comme α est une racine de P , $E = \{n \in \mathbb{N}, (X - \alpha)^n | P\}$ est non vide, puisque $1 \in E$.
D'autre part, E est majoré par le degré de P . Donc $E \subset \mathbb{N}$ admet un plus grand élément *i.e.* la multiplicité d'une racine est bien définie.



IV. Racines d'un polynôme

2. Ordre de multiplicité d'une racine

Définition 15 :

Soit P un polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

Si α est une racine de P , on appelle **ordre de multiplicité de la racine α dans P** le plus grand entier n tel que $(X - \alpha)^n | P$.

Remarques :

- Comme α est une racine de P , $E = \{n \in \mathbb{N}, (X - \alpha)^n | P\}$ est non vide, puisque $1 \in E$.
D'autre part, E est majoré par le degré de P . Donc $E \subset \mathbb{N}$ admet un plus grand élément *i.e.* la multiplicité d'une racine est bien définie.
- Si la multiplicité de α est 1, 2, 3, ... on parle de racine simple, double, triple.
On convient que si l'ordre est 0, α n'est pas une racine de P .



IV. Racines d'un polynôme

2. Ordre de multiplicité d'une racine

Définition 15 :

Soit P un polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

Si α est une racine de P , on appelle **ordre de multiplicité de la racine α dans P** le plus grand entier n tel que $(X - \alpha)^n | P$.

Remarques :

- Comme α est une racine de P , $E = \{n \in \mathbb{N}, (X - \alpha)^n | P\}$ est non vide, puisque $1 \in E$.
D'autre part, E est majoré par le degré de P . Donc $E \subset \mathbb{N}$ admet un plus grand élément *i.e.* la multiplicité d'une racine est bien définie.
- Si la multiplicité de α est 1, 2, 3, ... on parle de racine simple, double, triple. On convient que si l'ordre est 0, α n'est pas une racine de P .
- Par définition de l'ordre de multiplicité, si n est celui d'une racine α alors $(X - \alpha)^{n+1}$ ne divise pas P .



IV. Racines d'un polynôme

2. Ordre de multiplicité d'une racine

Théorème 21 :

Soit P un polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

Les trois propositions suivantes sont équivalentes :

- 1 α est une racine de P de multiplicité m .



IV. Racines d'un polynôme

2. Ordre de multiplicité d'une racine

Théorème 21 :

Soit P un polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

Les trois propositions suivantes sont équivalentes :

- 1 α est une racine de P de multiplicité m .
- 2 $\exists Q \in \mathbb{K}[X], P = (X - \alpha)^m Q$ et $Q(\alpha) \neq 0$.



IV. Racines d'un polynôme

2. Ordre de multiplicité d'une racine

Théorème 21 :

Soit P un polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

Les trois propositions suivantes sont équivalentes :

- 1 α est une racine de P de multiplicité m .
- 2 $\exists Q \in \mathbb{K}[X], P = (X - \alpha)^m Q$ et $Q(\alpha) \neq 0$.
- 3 $P(\alpha) = P'(\alpha) = \dots = P^{(m-1)}(\alpha) = 0$ et $P^{(m)}(\alpha) \neq 0$.



IV. Racines d'un polynôme

2. Ordre de multiplicité d'une racine

Théorème 21 :

Soit P un polynôme non nul de $\mathbb{K}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{K}$.

Les trois propositions suivantes sont équivalentes :

- 1 α est une racine de P de multiplicité m .
- 2 $\exists Q \in \mathbb{K}[X]$, $P = (X - \alpha)^m Q$ et $Q(\alpha) \neq 0$.
- 3 $P(\alpha) = P'(\alpha) = \dots = P^{(m-1)}(\alpha) = 0$ et $P^{(m)}(\alpha) \neq 0$.

À retenir :

On dit que $\alpha \in \mathbb{K}$, est racine de $P \in \mathbb{K}[X]$ d'ordre de multiplicité au moins $m \in \mathbb{N}^*$ si $(X - \alpha)^m | P$ ou s'il existe $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X - \alpha)^m Q$ ou si $\forall m \in \llbracket 0; m - 1 \rrbracket$, $P^{(k)}(\alpha) = 0$.



IV. Racines d'un polynôme

2. Ordre de multiplicité d'une racine

Exemples 14 :

- Déterminer les racines de $P = (X - 1)(X^2 - 1)(X^3 - 1)(X^4 - 1) \in \mathbb{R}[X]$ et leur multiplicité.

$$\begin{aligned}P &= (X - 1)(X^2 - 1)(X^3 - 1)(X^4 - 1) \\ &= (X - 1)[(X - 1)(X + 1)][(X - 1)(X^2 + X + 1)][(X - 1)(X + 1)(X^2 + 1)] \\ &= (X - 1)^4(X + 1)^2(X^2 + X + 1)(X^2 + 1)\end{aligned}$$

$X^2 + X + 1$ n'a pas de racine réelle ($\Delta = -3$) et $X^2 + 1$ non plus.

P a donc deux racines réelles : 1 de multiplicité 4 et -1 de multiplicité 2.



IV. Racines d'un polynôme

2. Ordre de multiplicité d'une racine

Exemples 14 :

- Déterminer les racines de $P = (X - 1)(X^2 - 1)(X^3 - 1)(X^4 - 1) \in \mathbb{R}[X]$ et leur multiplicité.

$$\begin{aligned}P &= (X - 1)(X^2 - 1)(X^3 - 1)(X^4 - 1) \\ &= (X - 1)[(X - 1)(X + 1)][(X - 1)(X^2 + X + 1)][(X - 1)(X + 1)(X^2 + 1)] \\ &= (X - 1)^4(X + 1)^2(X^2 + X + 1)(X^2 + 1)\end{aligned}$$

$X^2 + X + 1$ n'a pas de racine réelle ($\Delta = -3$) et $X^2 + 1$ non plus.

P a donc deux racines réelles : 1 de multiplicité 4 et -1 de multiplicité 2.

- $P = aX^2 + bX + c$ avec $a \neq 0$.

Si $\Delta = 0$, $x_0 = -\frac{b}{2a}$ est une racine double de P : $P = a(X - x_0)^2$.



IV. Racines d'un polynôme

2. Ordre de multiplicité d'une racine

Exercice B :

Montrer que, $\forall n \in \mathbb{N}$, $P_n = nX^{n+1} - (n+1)X^n + 1$ est divisible par $(X-1)^2$.



IV. Racines d'un polynôme

2. Ordre de multiplicité d'une racine

Corollaire II :

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$.

Si P admet n racines distinctes $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ de multiplicités respectives m_1, m_2, \dots, m_n , alors P est divisible par $\prod_{k=1}^n (X - \alpha_k)^{m_k}$.



IV. Racines d'un polynôme

2. Ordre de multiplicité d'une racine

Corollaire II :

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$.

Si P admet n racines distinctes $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ de multiplicités respectives m_1, m_2, \dots, m_n , alors P est divisible par $\prod_{k=1}^n (X - \alpha_k)^{m_k}$.

Exercice 14 :

Montrer que le polynôme $P_n = \sum_{k=0}^n \frac{X^k}{k!}$ n'admet que des racines simples.



V. Décomposition en facteurs irréductibles

- 1 L'ensemble $\mathbb{K}[X]$
- 2 Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$
- 3 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$
- 4 Racines d'un polynôme
- 5 Décomposition en facteurs irréductibles**
 - Polynôme scindé
 - Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$
 - Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$
 - En pratique,
 - Algorithme de Hörner
- 6 Somme et produit des racines



V. Décomposition en facteurs irréductibles

1. Polynôme scindé

Définition 16 :

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme non nul.

On dit que P est **scindé** lorsqu'il est constant, ou s'il s'écrit comme un produit de facteurs de degré 1.



V. Décomposition en facteurs irréductibles

1. Polynôme scindé

Définition 16 :

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme non nul.

On dit que P est **scindé** lorsqu'il est constant, ou s'il s'écrit comme un produit de facteurs de degré 1.

Plus précisément, P est scindé si, et seulement si il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ et $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ tels que :

$$P = \lambda \prod_{k=1}^n (X - a_k).$$



V. Décomposition en facteurs irréductibles

1. Polynôme scindé

Exemples 15 :

- $(X - 2)(X - 3)$ est scindé.



V. Décomposition en facteurs irréductibles

1. Polynôme scindé

Exemples 15 :

- $(X - 2)(X - 3)$ est scindé.
- $(X - 1)^8$ est scindé.



V. Décomposition en facteurs irréductibles

1. Polynôme scindé

Exemples 15 :

- $(X - 2)(X - 3)$ est scindé.
- $(X - 1)^8$ est scindé.
- $X^2 + 1$ ne peut s'écrire sous la forme $(X - \alpha)(X - \beta)$ dans $\mathbb{R}[X]$. Sinon, α et β seraient des racines réelles de $X^2 + 1$ qui n'en a pas!



V. Décomposition en facteurs irréductibles

1. Polynôme scindé

Exemples 15 :

- $(X - 2)(X - 3)$ est scindé.
- $(X - 1)^8$ est scindé.
- $X^2 + 1$ ne peut s'écrire sous la forme $(X - \alpha)(X - \beta)$ dans $\mathbb{R}[X]$. Sinon, α et β seraient des racines réelles de $X^2 + 1$ qui n'en a pas!
Par conséquent, $X^2 + 1$ n'est pas scindé dans $\mathbb{R}[X]$.

ATTENTION

La notion de polynôme scindé dépend du corps \mathbb{K} .



V. Décomposition en facteurs irréductibles

1. Polynôme scindé

Exemples 15 :

- $(X - 2)(X - 3)$ est scindé.
- $(X - 1)^8$ est scindé.
- $X^2 + 1$ ne peut s'écrire sous la forme $(X - \alpha)(X - \beta)$ dans $\mathbb{R}[X]$. Sinon, α et β seraient des racines réelles de $X^2 + 1$ qui n'en a pas!

Par conséquent, $X^2 + 1$ n'est pas scindé dans $\mathbb{R}[X]$.

Il est scindé dans $\mathbb{C}[X]$ puisqu'on peut écrire $X^2 + 1 = (X - i)(X + i)$.

ATTENTION

La notion de polynôme scindé dépend du corps \mathbb{K} .



V. Décomposition en facteurs irréductibles

2. Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$

Dans \mathbb{C} , le problème est résolu depuis longtemps sous le nom du théorème de D'Alembert-Gauss :

Théorème 22 (de D'Alembert-Gauss) :

Dans $\mathbb{C}[X]$, tout polynôme non constant admet au moins une racine (dans \mathbb{C}).



V. Décomposition en facteurs irréductibles

2. Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$

Dans \mathbb{C} , le problème est résolu depuis longtemps sous le nom du théorème de D'Alembert-Gauss :

Théorème 22 (de D'Alembert-Gauss) :

Dans $\mathbb{C}[X]$, tout polynôme non constant admet au moins une racine (dans \mathbb{C}).

Corollaire 12 :

Dans $\mathbb{C}[X]$, tout polynôme est scindé.



V. Décomposition en facteurs irréductibles

2. Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$

Dans \mathbb{C} , le problème est résolu depuis longtemps sous le nom du théorème de D'Alembert-Gauss :

Théorème 22 (de D'Alembert-Gauss) :

Dans $\mathbb{C}[X]$, tout polynôme non constant admet au moins une racine (dans \mathbb{C}).

Corollaire 12 :

Dans $\mathbb{C}[X]$, tout polynôme est scindé.

On dit que \mathbb{C} est algébriquement clos.



V. Décomposition en facteurs irréductibles

2. Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$

Corollaire B :

Dans $\mathbb{C}[X]$, tout polynôme P s'écrit sous la forme :

$$P = \lambda \prod_{k=1}^n (X - \alpha_k)^{m_k}$$

Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$

où $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ sont les racines de P de multiplicités m_1, m_2, \dots, m_n et λ est le coefficient dominant de P .



V. Décomposition en facteurs irréductibles

2. Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$

Corollaire B :

Dans $\mathbb{C}[X]$, tout polynôme P s'écrit sous la forme :

$$P = \lambda \prod_{k=1}^n (X - \alpha_k)^{m_k}$$

Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$

où $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ sont les racines de P de multiplicités m_1, m_2, \dots, m_n et λ est le coefficient dominant de P .

Corollaire H :

Les seuls polynômes irréductibles dans $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.



V. Décomposition en facteurs irréductibles

2. Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$

Exemple 16 :

Soit $P = X^n - 1$ avec $n \geq 1$.

Dans \mathbb{C} , les racines de P sont les racines $n^{\text{èmes}}$ de l'unité. Il y en a n distinctes.

Donc
$$\prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right) | P.$$

V. Décomposition en facteurs irréductibles

2. Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$

Exemple 16 :

Soit $P = X^n - 1$ avec $n \geq 1$.

Dans \mathbb{C} , les racines de P sont les racines $n^{\text{èmes}}$ de l'unité. Il y en a n distinctes.

Donc $\prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right) \mid P$.

On a donc $P = \left[\prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right) \right] Q$ avec $Q \in \mathbb{C}[X]$.

V. Décomposition en facteurs irréductibles

2. Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$

Exemple 16 :

Soit $P = X^n - 1$ avec $n \geq 1$.

Dans \mathbb{C} , les racines de P sont les racines $n^{\text{èmes}}$ de l'unité. Il y en a n distinctes.

Donc $\prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right) \mid P$.

On a donc $P = \left[\prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right) \right] Q$ avec $Q \in \mathbb{C}[X]$.

Or, $\deg(P) = n + \deg(Q)$ d'où $\deg(Q) = 0$ et $Q = \lambda$ avec $\lambda \in \mathbb{C}^*$.

V. Décomposition en facteurs irréductibles

2. Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$

Exemple 16 :

Soit $P = X^n - 1$ avec $n \geq 1$.

Dans \mathbb{C} , les racines de P sont les racines $n^{\text{èmes}}$ de l'unité. Il y en a n distinctes.

Donc $\prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right) | P$.

On a donc $P = \left[\prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right) \right] Q$ avec $Q \in \mathbb{C}[X]$.

Or, $\deg(P) = n + \deg(Q)$ d'où $\deg(Q) = 0$ et $Q = \lambda$ avec $\lambda \in \mathbb{C}^*$.

D'où, $P = \lambda \prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right)$.

V. Décomposition en facteurs irréductibles

2. Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$

Exemple 16 :

Soit $P = X^n - 1$ avec $n \geq 1$.

Dans \mathbb{C} , les racines de P sont les racines $n^{\text{èmes}}$ de l'unité. Il y en a n distinctes.

Donc $\prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right) | P$.

On a donc $P = \left[\prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right) \right] Q$ avec $Q \in \mathbb{C}[X]$.

Or, $\deg(P) = n + \deg(Q)$ d'où $\deg(Q) = 0$ et $Q = \lambda$ avec $\lambda \in \mathbb{C}^*$.

D'où, $P = \lambda \prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right)$.

Enfin, par identification des coefficients dominants, $\lambda = 1$.

V. Décomposition en facteurs irréductibles

2. Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$

Exemple 16 :

Soit $P = X^n - 1$ avec $n \geq 1$.

Dans \mathbb{C} , les racines de P sont les racines $n^{\text{èmes}}$ de l'unité. Il y en a n distinctes.

Donc $\prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right) | P$.

On a donc $P = \left[\prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right) \right] Q$ avec $Q \in \mathbb{C}[X]$.

Or, $\deg(P) = n + \deg(Q)$ d'où $\deg(Q) = 0$ et $Q = \lambda$ avec $\lambda \in \mathbb{C}^*$.

D'où, $P = \lambda \prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right)$.

Enfin, par identification des coefficients dominants, $\lambda = 1$.

$$\text{En conclusion, } X^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} \left(X - e^{\frac{2ik\pi}{n}} \right) = \prod_{\zeta \in \mathbb{U}_n} (X - \zeta).$$

V. Décomposition en facteurs irréductibles

2. Factorisation dans $\mathbb{C}[X]$

Exercice 15 :

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $P = (X + i)^{2n+1} - (X - i)^{2n+1}$.

Factoriser P dans $\mathbb{C}[X]$.



V. Décomposition en facteurs irréductibles

3. Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$

Proposition 23 (Racines complexes d'un polynôme réel) :

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{C}$.

Si α est une racine de P , alors $\bar{\alpha}$ est aussi une racine de P .



V. Décomposition en facteurs irréductibles

3. Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$

Proposition 23 (Racines complexes d'un polynôme réel) :

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{C}$.

Si α est une racine de P , alors $\bar{\alpha}$ est aussi une racine de P .

ATTENTION

i est une racine de $(X - i)(X + 2)$ mais \bar{i} ne l'est pas.

Pas de contradiction avec la propriété ci-dessous car $(X - i)(X + 2) \notin \mathbb{R}[X]$.



V. Décomposition en facteurs irréductibles

3. Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$

Proposition 23 (Racines complexes d'un polynôme réel) :

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{C}$.

Si α est une racine de P , alors $\bar{\alpha}$ est aussi une racine de P .

ATTENTION

i est une racine de $(X - i)(X + 2)$ mais \bar{i} ne l'est pas.

Pas de contradiction avec la propriété ci-dessous car $(X - i)(X + 2) \notin \mathbb{R}[X]$.

On a même un peu mieux :

Proposition 24 :

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$ et $\alpha \in \mathbb{C}$.

Si α est une racine de P de multiplicité m , alors $\bar{\alpha}$ est une racine de P de multiplicité m également.

V. Décomposition en facteurs irréductibles

4. En pratique,

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. En particulier, $P \in \mathbb{C}[X]$ et on sait factoriser P dans $\mathbb{C}[X]$ connaissant son coefficient dominant λ et ses racines notées :

- Racines réelles : $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ de multiplicité m_1, m_2, \dots, m_r .



V. Décomposition en facteurs irréductibles

4. En pratique,

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. En particulier, $P \in \mathbb{C}[X]$ et on sait factoriser P dans $\mathbb{C}[X]$ connaissant son coefficient dominant λ et ses racines notées :

- Racines réelles : $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ de multiplicité m_1, m_2, \dots, m_r .
- Racines complexes : $\beta_1, \bar{\beta}_1, \beta_2, \bar{\beta}_2, \dots, \beta_s, \bar{\beta}_s$ de multiplicité $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_s$.



V. Décomposition en facteurs irréductibles

4. En pratique,

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. En particulier, $P \in \mathbb{C}[X]$ et on sait factoriser P dans $\mathbb{C}[X]$ connaissant son coefficient dominant λ et ses racines notées :

- Racines réelles : $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ de multiplicité m_1, m_2, \dots, m_r .
- Racines complexes : $\beta_1, \bar{\beta}_1, \beta_2, \bar{\beta}_2, \dots, \beta_s, \bar{\beta}_s$ de multiplicité $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_s$.

$$P = \lambda \prod_{k=1}^r (X - \alpha_k)^{m_k} \prod_{\ell=1}^s (X - \beta_\ell)^{\mu_\ell} (X - \bar{\beta}_\ell)^{\mu_\ell}$$



V. Décomposition en facteurs irréductibles

4. En pratique,

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. En particulier, $P \in \mathbb{C}[X]$ et on sait factoriser P dans $\mathbb{C}[X]$ connaissant son coefficient dominant λ et ses racines notées :

- Racines réelles : $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ de multiplicité m_1, m_2, \dots, m_r .
- Racines complexes : $\beta_1, \bar{\beta}_1, \beta_2, \bar{\beta}_2, \dots, \beta_s, \bar{\beta}_s$ de multiplicité $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_s$.

$$\begin{aligned} P &= \lambda \prod_{k=1}^r (X - \alpha_k)^{m_k} \prod_{\ell=1}^s (X - \beta_\ell)^{\mu_\ell} (X - \bar{\beta}_\ell)^{\mu_\ell} \\ &= \lambda \prod_{k=1}^r (X - \alpha_k)^{m_k} \prod_{\ell=1}^s \left[(X - \beta_\ell)(X - \bar{\beta}_\ell) \right]^{\mu_\ell} \end{aligned}$$



V. Décomposition en facteurs irréductibles

4. En pratique,

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. En particulier, $P \in \mathbb{C}[X]$ et on sait factoriser P dans $\mathbb{C}[X]$ connaissant son coefficient dominant λ et ses racines notées :

- Racines réelles : $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ de multiplicité m_1, m_2, \dots, m_r .
- Racines complexes : $\beta_1, \bar{\beta}_1, \beta_2, \bar{\beta}_2, \dots, \beta_s, \bar{\beta}_s$ de multiplicité $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_s$.

$$\begin{aligned} P &= \lambda \prod_{k=1}^r (X - \alpha_k)^{m_k} \prod_{\ell=1}^s (X - \beta_\ell)^{\mu_\ell} (X - \bar{\beta}_\ell)^{\mu_\ell} \\ &= \lambda \prod_{k=1}^r (X - \alpha_k)^{m_k} \prod_{\ell=1}^s \left[(X - \beta_\ell)(X - \bar{\beta}_\ell) \right]^{\mu_\ell} \\ &= \lambda \prod_{k=1}^r (X - \alpha_k)^{m_k} \prod_{\ell=1}^s \left[X^2 - (\beta_\ell + \bar{\beta}_\ell)X + \beta_\ell \bar{\beta}_\ell \right]^{\mu_\ell} \end{aligned}$$



V. Décomposition en facteurs irréductibles

4. En pratique,

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. En particulier, $P \in \mathbb{C}[X]$ et on sait factoriser P dans $\mathbb{C}[X]$ connaissant son coefficient dominant λ et ses racines notées :

- Racines réelles : $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ de multiplicité m_1, m_2, \dots, m_r .
- Racines complexes : $\beta_1, \bar{\beta}_1, \beta_2, \bar{\beta}_2, \dots, \beta_s, \bar{\beta}_s$ de multiplicité $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_s$.

$$\begin{aligned} P &= \lambda \prod_{k=1}^r (X - \alpha_k)^{m_k} \prod_{\ell=1}^s (X - \beta_\ell)^{\mu_\ell} (X - \bar{\beta}_\ell)^{\mu_\ell} \\ &= \lambda \prod_{k=1}^r (X - \alpha_k)^{m_k} \prod_{\ell=1}^s \left[(X - \beta_\ell)(X - \bar{\beta}_\ell) \right]^{\mu_\ell} \\ &= \lambda \prod_{k=1}^r (X - \alpha_k)^{m_k} \prod_{\ell=1}^s \left[X^2 - (\beta_\ell + \bar{\beta}_\ell)X + \beta_\ell \bar{\beta}_\ell \right]^{\mu_\ell} \end{aligned}$$

$$P = \lambda \prod_{k=1}^r (X - \alpha_k)^{m_k} \prod_{\ell=1}^s [X^2 + u_\ell X + v_\ell]^{\mu_\ell}$$

en posant $\begin{cases} u_\ell = -(\beta_\ell + \bar{\beta}_\ell) = -2\operatorname{Re}(\beta_\ell) \in \mathbb{R} \\ v_\ell = \beta_\ell \bar{\beta}_\ell = |\beta_\ell|^2 \in \mathbb{R} \end{cases}$.



V. Décomposition en facteurs irréductibles

4. En pratique,

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. En particulier, $P \in \mathbb{C}[X]$ et on sait factoriser P dans $\mathbb{C}[X]$ connaissant son coefficient dominant λ et ses racines notées :

- Racines réelles : $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ de multiplicité m_1, m_2, \dots, m_r .
- Racines complexes : $\beta_1, \bar{\beta}_1, \beta_2, \bar{\beta}_2, \dots, \beta_s, \bar{\beta}_s$ de multiplicité $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_s$.

$$P = \lambda \prod_{k=1}^r (X - \alpha_k)^{m_k} \prod_{\ell=1}^s [X^2 + u_\ell X + v_\ell]^{\mu_\ell}$$

en posant
$$\begin{cases} u_\ell = -(\beta_\ell + \bar{\beta}_\ell) = -2\operatorname{Re}(\beta_\ell) \in \mathbb{R} \\ v_\ell = \beta_\ell \bar{\beta}_\ell = |\beta_\ell|^2 \in \mathbb{R} \end{cases} .$$

Et on a $\Delta_\ell = (u_\ell)^2 - 4v_\ell = 4\operatorname{Re}(\beta_\ell)^2 - 4|\beta_\ell|^2 = 4(\operatorname{Re}(\beta_\ell)^2 - |\beta_\ell|^2) < 0$.

En effet, $|\operatorname{Re}(\beta_\ell)| \leq |\beta_\ell|$ avec égalité uniquement si $\beta_\ell \in \mathbb{R}$, ce qui n'est pas le cas ici.



V. Décomposition en facteurs irréductibles

4. En pratique,

Corollaire 15 :

Dans $\mathbb{R}[X]$, tout polynôme P s'écrit sous la forme :

$$P = \lambda \prod_{k=1}^r (X - \alpha_k)^{m_k} \prod_{\ell=1}^s [X^2 + u_\ell X + v_\ell]^{\mu_\ell} \quad (3)$$

Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$

où :

- λ est le coefficient dominant de P .



V. Décomposition en facteurs irréductibles

4. En pratique,

Corollaire 15 :

Dans $\mathbb{R}[X]$, tout polynôme P s'écrit sous la forme :

$$P = \lambda \prod_{k=1}^r (X - \alpha_k)^{m_k} \prod_{\ell=1}^s [X^2 + u_\ell X + v_\ell]^{\mu_\ell} \quad (3)$$

Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$

où :

- λ est le coefficient dominant de P .
- $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ sont les racines réelles de P de multiplicités m_1, m_2, \dots, m_r .



V. Décomposition en facteurs irréductibles

4. En pratique,

Corollaire 15 :

Dans $\mathbb{R}[X]$, tout polynôme P s'écrit sous la forme :

$$P = \lambda \prod_{k=1}^r (X - \alpha_k)^{m_k} \prod_{\ell=1}^s [X^2 + u_\ell X + v_\ell]^{\mu_\ell} \quad (3)$$

Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$

où :

- λ est le coefficient dominant de P .
- $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ sont les racines réelles de P de multiplicités m_1, m_2, \dots, m_r .
- $(u_1, v_1), (u_2, v_2), \dots, (u_s, v_s)$ sont des couples de réels tels que $\forall k \in \llbracket 1; s \rrbracket$, $u_k^2 - 4v_k < 0$, i.e. $X^2 + u_k X + v_k$ n'a pas de racines réelles.



V. Décomposition en facteurs irréductibles

4. En pratique,

Corollaire 15 :

Dans $\mathbb{R}[X]$, tout polynôme P s'écrit sous la forme :

$$P = \lambda \prod_{k=1}^r (X - \alpha_k)^{m_k} \prod_{\ell=1}^s [X^2 + u_\ell X + v_\ell]^{\mu_\ell} \quad (3)$$

Factorisation dans $\mathbb{R}[X]$

où :

- λ est le coefficient dominant de P .
- $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ sont les racines réelles de P de multiplicités m_1, m_2, \dots, m_r .
- $(u_1, v_1), (u_2, v_2), \dots, (u_s, v_s)$ sont des couples de réels tels que $\forall k \in \llbracket 1; s \rrbracket$, $u_k^2 - 4v_k < 0$, i.e. $X^2 + u_k X + v_k$ n'a pas de racines réelles.
- $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_s \in \mathbb{N}$.



V. Décomposition en facteurs irréductibles

4. En pratique,

Corollaire 16 :

Les seuls polynômes normalisés irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ sont :

- Les polynômes de degré 1 de la forme $X - \alpha$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$;



V. Décomposition en facteurs irréductibles

4. En pratique,

Corollaire \mathbb{R} :

Les seuls polynômes normalisés irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ sont :

- Les polynômes de degré 1 de la forme $X - \alpha$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$;
- Les polynômes de degré 2 irréductibles de la forme $X^2 + uX + v$ avec $u, v \in \mathbb{R}$ et $u^2 - 4v < 0$.



V. Décomposition en facteurs irréductibles

4. En pratique,

Corollaire \mathbb{K} :

Les seuls polynômes normalisés irréductibles dans $\mathbb{R}[X]$ sont :

- Les polynômes de degré 1 de la forme $X - \alpha$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$;
- Les polynômes de degré 2 irréductibles de la forme $X^2 + uX + v$ avec $u, v \in \mathbb{R}$ et $u^2 - 4v < 0$.

ATTENTION

Un polynôme peut très bien ne pas avoir de racines dans \mathbb{K} et ne pas être irréductible :

$X^4 + 1 = (X^2 + X\sqrt{2} + 1)(X^2 - X\sqrt{2} + 1)$ n'a pas de racines réelles.



V. Décomposition en facteurs irréductibles

4. En pratique,

Exemple 17 :

Comment factoriser $P = X^6 - 1$ dans $\mathbb{R}[X]$?



V. Décomposition en facteurs irréductibles

4. En pratique,

Exemple 17 :

Comment factoriser $P = X^6 - 1$ dans $\mathbb{R}[X]$?

On le factorise dans $\mathbb{C}[X]$, puis on regroupe les racines avec leur conjugué.

$$\begin{aligned} P &= \prod_{k=0}^5 \left(X - e^{\frac{2ik\pi}{6}} \right) \\ &= (X - 1) \left(X - e^{\frac{i\pi}{3}} \right) \left(X - e^{\frac{2i\pi}{3}} \right) (X + 1) \left(X - e^{\frac{4i\pi}{3}} \right) \left(X - e^{\frac{5i\pi}{3}} \right) \\ &= (X - 1)(X + 1) \left(X - e^{\frac{i\pi}{3}} \right) \left(X - e^{-\frac{i\pi}{3}} \right) \left(X - e^{\frac{2i\pi}{3}} \right) \left(X - e^{-\frac{2i\pi}{3}} \right) \\ &= (X - 1)(X + 1) (X^2 - X + 1) (X^2 + X + 1). \end{aligned}$$

Finalement, $X^6 - 1 = (X - 1)(X + 1) (X^2 - X + 1) (X^2 + X + 1)$.



V. Décomposition en facteurs irréductibles

4. En pratique,

Exemple 17 :

Comment factoriser $P = X^6 - 1$ dans $\mathbb{R}[X]$?

On le factorise dans $\mathbb{C}[X]$, puis on regroupe les racines avec leur conjugué.

$$\begin{aligned} P &= \prod_{k=0}^5 \left(X - e^{\frac{2ik\pi}{6}} \right) \\ &= (X - 1) \left(X - e^{\frac{i\pi}{3}} \right) \left(X - e^{\frac{2i\pi}{3}} \right) (X + 1) \left(X - e^{\frac{4i\pi}{3}} \right) \left(X - e^{\frac{5i\pi}{3}} \right) \\ &= (X - 1)(X + 1) \left(X - e^{\frac{i\pi}{3}} \right) \left(X - e^{-\frac{i\pi}{3}} \right) \left(X - e^{\frac{2i\pi}{3}} \right) \left(X - e^{-\frac{2i\pi}{3}} \right) \\ &= (X - 1)(X + 1) (X^2 - X + 1) (X^2 + X + 1). \end{aligned}$$

Finalement, $X^6 - 1 = (X - 1)(X + 1) (X^2 - X + 1) (X^2 + X + 1)$.

Remarque : Bien sûr, on peut également reconnaître que $X^6 - 1 = (X^3)^2 - 1$ ou $X^6 - 1 = (X^2)^3 - 1$ puis factoriser, à la main, chaque facteur.



V. Décomposition en facteurs irréductibles

4. En pratique,

Exercice 16 :

Factoriser $X^6 + 1$ dans $\mathbb{R}[X]$.



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

Soit f une fonction polynomiale de degré $n > 0$ et $a \in \mathbb{R}$ une racine de f .

Il existe donc un polynôme Q de degré $n - 1$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (x - a)Q(x)$.

$$\begin{aligned} \text{On pose : } \quad f(x) &= a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 & a_n \neq 0 \\ Q(x) &= b_{n-1} x^{n-1} + b_{n-2} x^{n-2} + \dots + b_1 x + b_0. \end{aligned}$$



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

Soit f une fonction polynomiale de degré $n > 0$ et $a \in \mathbb{R}$ une racine de f .

Il existe donc un polynôme Q de degré $n - 1$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (x - a)Q(x)$.

$$\begin{aligned} \text{On pose : } \quad f(x) &= a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 & a_n \neq 0 \\ Q(x) &= b_{n-1} x^{n-1} + b_{n-2} x^{n-2} + \dots + b_1 x + b_0. \end{aligned}$$

Cette méthode, appelée aussi algorithme de Ruffini-Hörner, consiste à calculer les coefficients de Q de proche en proche à partir de b_{n-1} puis en descendant jusqu'à b_0 .



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

Soit f une fonction polynomiale de degré $n > 0$ et $a \in \mathbb{R}$ une racine de f .

Il existe donc un polynôme Q de degré $n - 1$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (x - a)Q(x)$.

$$\begin{aligned} \text{On pose :} \quad f(x) &= a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 & a_n &\neq 0 \\ Q(x) &= b_{n-1} x^{n-1} + b_{n-2} x^{n-2} + \dots + b_1 x + b_0. \end{aligned}$$

Cette méthode, appelée aussi algorithme de Ruffini-Hörner, consiste à calculer les coefficients de Q de proche en proche à partir de b_{n-1} puis en descendant jusqu'à b_0 .

$$a_n = b_{n-1}$$

$$b_{n-1} = a_n$$



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

Soit f une fonction polynomiale de degré $n > 0$ et $a \in \mathbb{R}$ une racine de f .

Il existe donc un polynôme Q de degré $n - 1$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (x - a)Q(x)$.

$$\begin{aligned} \text{On pose : } \quad f(x) &= a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 & a_n &\neq 0 \\ Q(x) &= b_{n-1} x^{n-1} + b_{n-2} x^{n-2} + \dots + b_1 x + b_0. \end{aligned}$$

Cette méthode, appelée aussi algorithme de Ruffini-Hörner, consiste à calculer les coefficients de Q de proche en proche à partir de b_{n-1} puis en descendant jusqu'à b_0 .

$$\begin{aligned} a_n &= b_{n-1} & b_{n-1} &= a_n \\ \forall k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket, a_k &= b_{k-1} - ab_k & b_{k-1} &= a_k + ab_k \end{aligned}$$



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

Soit f une fonction polynomiale de degré $n > 0$ et $a \in \mathbb{R}$ une racine de f .

Il existe donc un polynôme Q de degré $n - 1$ tel que $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (x - a)Q(x)$.

$$\begin{aligned} \text{On pose : } \quad f(x) &= a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0 & a_n &\neq 0 \\ Q(x) &= b_{n-1} x^{n-1} + b_{n-2} x^{n-2} + \dots + b_1 x + b_0. \end{aligned}$$

Cette méthode, appelée aussi algorithme de Ruffini-Hörner, consiste à calculer les coefficients de Q de proche en proche à partir de b_{n-1} puis en descendant jusqu'à b_0 .

$$\begin{aligned} a_n &= b_{n-1} & b_{n-1} &= a_n \\ \forall k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket, a_k &= b_{k-1} - ab_k & b_{k-1} &= a_k + ab_k \\ a_0 &= -ab_0. & b_0 &= -\frac{a_0}{a}. \end{aligned}$$



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

$$\begin{aligned} a_n &= b_{n-1} & b_{n-1} &= a_n \\ \forall k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket, a_k &= b_{k-1} - ab_k & b_{k-1} &= a_k + ab_k \\ a_0 &= -ab_0. & b_0 &= -\frac{a_0}{a}. \end{aligned}$$

On calcule, en général, ces coefficients à partir d'un tableau que l'on remplit de gauche à droite :



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

$$\begin{aligned} a_n &= b_{n-1} & b_{n-1} &= a_n \\ \forall k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket, a_k &= b_{k-1} - ab_k & b_{k-1} &= a_k + ab_k \\ a_0 &= -ab_0. & b_0 &= -\frac{a_0}{a}. \end{aligned}$$

On calcule, en général, ces coefficients à partir d'un tableau que l'on remplit de gauche à droite :

a_n					



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

$$\begin{aligned} a_n &= b_{n-1} & b_{n-1} &= a_n \\ \forall k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket, a_k &= b_{k-1} - ab_k & b_{k-1} &= a_k + ab_k \\ a_0 &= -ab_0. & b_0 &= -\frac{a_0}{a}. \end{aligned}$$

On calcule, en général, ces coefficients à partir d'un tableau que l'on remplit de gauche à droite :

a_n					
$b_{n-1} = a_n$					



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

$$\begin{aligned} a_n &= b_{n-1} & b_{n-1} &= a_n \\ \forall k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket, a_k &= b_{k-1} - ab_k & b_{k-1} &= a_k + ab_k \\ a_0 &= -ab_0. & b_0 &= -\frac{a_0}{a}. \end{aligned}$$

On calcule, en général, ces coefficients à partir d'un tableau que l'on remplit de gauche à droite :

a_n	a_{n-1}				
$b_{n-1} = a_n$					



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

$$\begin{aligned} a_n &= b_{n-1} & b_{n-1} &= a_n \\ \forall k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket, a_k &= b_{k-1} - ab_k & b_{k-1} &= a_k + ab_k \\ a_0 &= -ab_0. & b_0 &= -\frac{a_0}{a}. \end{aligned}$$

On calcule, en général, ces coefficients à partir d'un tableau que l'on remplit de gauche à droite :

a_n	a_{n-1}				
$b_{n-1} = a_n$	$b_{n-2} = a_{n-1} + ab_{n-1}$				



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

$$\begin{aligned} a_n &= b_{n-1} & b_{n-1} &= a_n \\ \forall k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket, a_k &= b_{k-1} - ab_k & b_{k-1} &= a_k + ab_k \\ a_0 &= -ab_0. & b_0 &= -\frac{a_0}{a}. \end{aligned}$$

On calcule, en général, ces coefficients à partir d'un tableau que l'on remplit de gauche à droite :

a_n	a_{n-1}	...	a_2		
$b_{n-1} = a_n$	$b_{n-2} = a_{n-1} + ab_{n-1}$				



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

$$\begin{aligned} a_n &= b_{n-1} & b_{n-1} &= a_n \\ \forall k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket, a_k &= b_{k-1} - ab_k & b_{k-1} &= a_k + ab_k \\ a_0 &= -ab_0. & b_0 &= -\frac{a_0}{a}. \end{aligned}$$

On calcule, en général, ces coefficients à partir d'un tableau que l'on remplit de gauche à droite :

a_n	a_{n-1}	...	a_2		
$b_{n-1} = a_n$	$b_{n-2} = a_{n-1} + ab_{n-1}$		$b_1 = a_2 + ab_2$		



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

$$\begin{aligned} a_n &= b_{n-1} & b_{n-1} &= a_n \\ \forall k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket, a_k &= b_{k-1} - ab_k & b_{k-1} &= a_k + ab_k \\ a_0 &= -ab_0. & b_0 &= -\frac{a_0}{a}. \end{aligned}$$

On calcule, en général, ces coefficients à partir d'un tableau que l'on remplit de gauche à droite :

a_n	a_{n-1}	...	a_2	a_1	
$b_{n-1} = a_n$	$b_{n-2} = a_{n-1} + ab_{n-1}$		$b_1 = a_2 + ab_2$		



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

$$\begin{aligned} a_n &= b_{n-1} & b_{n-1} &= a_n \\ \forall k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket, a_k &= b_{k-1} - ab_k & b_{k-1} &= a_k + ab_k \\ a_0 &= -ab_0. & b_0 &= -\frac{a_0}{a}. \end{aligned}$$

On calcule, en général, ces coefficients à partir d'un tableau que l'on remplit de gauche à droite :

a_n	a_{n-1}	...	a_2	a_1	
$b_{n-1} = a_n$	$b_{n-2} = a_{n-1} + ab_{n-1}$		$b_1 = a_2 + ab_2$	$b_0 = a_1 + ab_1$	



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

$$\begin{aligned} a_n &= b_{n-1} & b_{n-1} &= a_n \\ \forall k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket, a_k &= b_{k-1} - ab_k & b_{k-1} &= a_k + ab_k \\ a_0 &= -ab_0. & b_0 &= -\frac{a_0}{a}. \end{aligned}$$

On calcule, en général, ces coefficients à partir d'un tableau que l'on remplit de gauche à droite :

a_n	a_{n-1}	...	a_2	a_1	a_0
$b_{n-1} = a_n$	$b_{n-2} = a_{n-1} + ab_{n-1}$		$b_1 = a_2 + ab_2$	$b_0 = a_1 + ab_1$	



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

$$\begin{aligned} a_n &= b_{n-1} & b_{n-1} &= a_n \\ \forall k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket, a_k &= b_{k-1} - ab_k & b_{k-1} &= a_k + ab_k \\ a_0 &= -ab_0. & b_0 &= -\frac{a_0}{a}. \end{aligned}$$

On calcule, en général, ces coefficients à partir d'un tableau que l'on remplit de gauche à droite :

a_n	a_{n-1}	...	a_2	a_1	a_0
$b_{n-1} = a_n$	$b_{n-2} = a_{n-1} + ab_{n-1}$		$b_1 = a_2 + ab_2$	$b_0 = a_1 + ab_1$	$b_0 = -\frac{a_0}{a}$



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

$$\begin{aligned} a_n &= b_{n-1} & b_{n-1} &= a_n \\ \forall k \in \llbracket 1; n-1 \rrbracket, a_k &= b_{k-1} - ab_k & b_{k-1} &= a_k + ab_k \\ a_0 &= -ab_0. & b_0 &= -\frac{a_0}{a}. \end{aligned}$$

On calcule, en général, ces coefficients à partir d'un tableau que l'on remplit de gauche à droite :

a_n	a_{n-1}	...	a_2	a_1	a_0
$b_{n-1} = a_n$	$b_{n-2} = a_{n-1} + ab_{n-1}$		$b_1 = a_2 + ab_2$	$b_0 = a_1 + ab_1$	$b_0 = -\frac{a_0}{a}$

La redondance des deux dernières colonnes permettant de vérifier ses calculs.



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

Exemple 18 :

Soit la fonction polynômiale définie par

$$f(x) = x^4 + 5x^3 + 5x^2 - 5x - 6 \quad \text{avec} \quad a = 1.$$

L'algorithme d'Hörner s'écrit :

1	5	5	-5	-6
---	---	---	----	----



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

Exemple 18 :

Soit la fonction polynômiale définie par

$$f(x) = x^4 + 5x^3 + 5x^2 - 5x - 6 \quad \text{avec} \quad a = 1.$$

L'algorithme d'Hörner s'écrit :

(Calcul de b_3)

1	5	5	-5	-6
1				



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

Exemple 18 :

Soit la fonction polynômiale définie par

$$f(x) = x^4 + 5x^3 + 5x^2 - 5x - 6 \quad \text{avec} \quad a = 1.$$

L'algorithme d'Hörner s'écrit :

	1	5	5	-5	-6
(Calcul de b_3)	1				
(Calcul de b_2)	1	$6 = 5 + 1 \times 1$			



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

Exemple 18 :

Soit la fonction polynômiale définie par

$$f(x) = x^4 + 5x^3 + 5x^2 - 5x - 6 \quad \text{avec} \quad a = 1.$$

L'algorithme d'Hörner s'écrit :

	1	5	5	-5	-6
(Calcul de b_3)	1				
(Calcul de b_2)	1	$6 = 5 + 1 \times 1$			
(Calcul de b_1)	1	6	$11 = 5 + 1 \times 6$		



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

Exemple 18 :

Soit la fonction polynômiale définie par

$$f(x) = x^4 + 5x^3 + 5x^2 - 5x - 6 \quad \text{avec} \quad a = 1.$$

L'algorithme d'Hörner s'écrit :

	1	5	5	-5	-6
(Calcul de b_3)	1				
(Calcul de b_2)	1	$6 = 5 + 1 \times 1$			
(Calcul de b_1)	1	6	$11 = 5 + 1 \times 6$		
(Calcul de b_0)	1	6	11	6	$-\frac{-6}{1} = 6$



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

Exemple 18 :

Soit la fonction polynômiale définie par

$$f(x) = x^4 + 5x^3 + 5x^2 - 5x - 6 \quad \text{avec} \quad a = 1.$$

L'algorithme d'Hörner s'écrit :

	1	5	5	-5	-6
(Calcul de b_3)	1				
(Calcul de b_2)	1	$6 = 5 + 1 \times 1$			
(Calcul de b_1)	1	6	$11 = 5 + 1 \times 6$		
(Calcul de b_0)	1	6	11	6	$-\frac{-6}{1} = 6$

On retrouve : $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (x - 1)(x^3 + 6x^2 + 11x + 6)$.



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

Exemple 18 :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (x - 1)(x^3 + 6x^2 + 11x + 6).$$

Et on continue avec $a = -1$:

(Avec $a = -1$)

1	6	11	6
1	5	6	6



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

Exemple 18 :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (x - 1)(x^3 + 6x^2 + 11x + 6).$$

Et on continue avec $a = -1$:

(Avec $a = -1$)

1	6	11	6
1	5	6	6

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (x - 1)(x + 1)(x^2 + x + 6).$$



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

Exemple 18 :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (x-1)(x^3 + 6x^2 + 11x + 6).$$

Et on continue avec $a = -1$:

(Avec $a = -1$)

(Avec $a = -2$)

1	6	11	6
1	5	6	6
1	3	3	



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

Exemple 18 :

$$\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (x-1)(x^3 + 6x^2 + 11x + 6).$$

Et on continue avec $a = -1$:

	1	6	11	6
(Avec $a = -1$)	1	5	6	6
(Avec $a = -2$)	1	3	3	

On retrouve encore, $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) = (x-1)(x+1)(x+2)(x+3).$



V. Décomposition en facteurs irréductibles

5. Algorithme de Hörner

Exercice 17 :

Factoriser $P = 4X^3 - 16X^2 - 19X - 5$ à l'aide de l'algorithme de Hörner sachant que 5 est une des racines.



VI. Somme et produit des racines

- 1 L'ensemble $\mathbb{K}[X]$
- 2 Dérivation dans $\mathbb{K}[X]$
- 3 Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$
- 4 Racines d'un polynôme
- 5 Décomposition en facteurs irréductibles
- 6 Somme et produit des racines**
 - Degré 2
 - Cas général



VI. Somme et produit des racines

Il est très difficile d'exprimer les racines en fonction des coefficients d'un polynôme. C'est même impossible dans le cas général à partir du degré 5.



VI. Somme et produit des racines

Il est très difficile d'exprimer les racines en fonction des coefficients d'un polynôme. C'est même impossible dans le cas général à partir du degré 5.

En revanche on peut facilement exprimer les coefficients en fonction des racines d'un polynôme scindé :



VI. Somme et produit des racines

1. Degré 2

Dans le cas du degré 2, en identifiant $P = aX^2 + bX + c$ et $P = a(X - \alpha_1)(X - \alpha_2)$, on obtient :

Proposition 25 :

Soit $P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{K}[X]$ avec $a \in \mathbb{K}^*$.

$$\alpha_1 \text{ et } \alpha_2 \text{ sont racines de } P \text{ si, et seulement si } \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = -\frac{b}{a} \\ \alpha_1 \alpha_2 = \frac{c}{a}. \end{cases}$$



VI. Somme et produit des racines

1. Degré 2

Dans le cas du degré 2, en identifiant $P = aX^2 + bX + c$ et $P = a(X - \alpha_1)(X - \alpha_2)$, on obtient :

Proposition 25 :

Soit $P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{K}[X]$ avec $a \in \mathbb{K}^*$.

$$\alpha_1 \text{ et } \alpha_2 \text{ sont racines de } P \text{ si, et seulement si } \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = -\frac{b}{a} \\ \alpha_1 \alpha_2 = \frac{c}{a}. \end{cases}$$

Exemple 19 :

$$\forall \alpha \in \mathbb{C}, \quad (X - \alpha)(X - \bar{\alpha}) = X^2 - 2\operatorname{Re}(\alpha)X + |\alpha|^2.$$

$$\text{En particulier : } \forall \theta \in \mathbb{R}, \quad (X - e^{i\theta})(X - e^{-i\theta}) = X^2 - 2\cos(\theta)X + 1.$$



VI. Somme et produit des racines

2. Cas général

Considérons $P = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_0$.

Posons $P = a_n (X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \dots (X - \alpha_n)$ (les α_i éventuellement identiques en cas de racines multiples).



VI. Somme et produit des racines

2. Cas général

Considérons $P = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_0$.

Posons $P = a_n (X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \dots (X - \alpha_n)$ (les α_i éventuellement identiques en cas de racines multiples).

En développant, on a

$$P = a_n \left(X^n - (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n) X^{n-1} + \dots + (-1)^n \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \right)$$



VI. Somme et produit des racines

2. Cas général

Considérons $P = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_0$.

Posons $P = a_n (X - \alpha_1)(X - \alpha_2) \dots (X - \alpha_n)$ (les α_i éventuellement identiques en cas de racines multiples).

En développant, on a

$$P = a_n \left(X^n - (\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n) X^{n-1} + \dots + (-1)^n \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \right)$$

En identifiant, on a (entre autres) $\begin{cases} a_{n-1} = -a_n(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n) \\ a_0 = a_n(-1)^n \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \end{cases}$.



VI. Somme et produit des racines

2. Cas général

On peut donc trouver facilement la somme et le produit des racines ainsi que d'autres sommes remarquables :

Proposition 26 :

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme scindé de degré n i.e. $a_n \neq 0$.

Si $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ sont les racines de P alors,

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n \\ \end{array} \right. = -\frac{a_{n-1}}{a_n}$$

VI. Somme et produit des racines

2. Cas général

On peut donc trouver facilement la somme et le produit des racines ainsi que d'autres sommes remarquables :

Proposition 26 :

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme scindé de degré n i.e. $a_n \neq 0$.

Si $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ sont les racines de P alors,

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n \\ \sum_{1 \leq i < j \leq n} \alpha_i \alpha_j \end{array} \right. \begin{array}{l} = -\frac{a_{n-1}}{a_n} \\ = \frac{a_{n-2}}{a_n} \end{array}$$

VI. Somme et produit des racines

2. Cas général

On peut donc trouver facilement la somme et le produit des racines ainsi que d'autres sommes remarquables :

Proposition 26 :

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme scindé de degré n i.e. $a_n \neq 0$.

Si $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ sont les racines de P alors,

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n \\ \sum_{1 \leq i < j \leq n} \alpha_i \alpha_j \\ \vdots \\ \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} \alpha_{i_1} \alpha_{i_2} \dots \alpha_{i_p} \end{array} \right. = \begin{array}{l} -\frac{a_{n-1}}{a_n} \\ \frac{a_{n-2}}{a_n} \\ \vdots \\ (-1)^p \frac{a_{n-p}}{a_n} \end{array}$$

VI. Somme et produit des racines

2. Cas général

On peut donc trouver facilement la somme et le produit des racines ainsi que d'autres sommes remarquables :

Proposition 26 :

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $P = \sum_{k=0}^n a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ un polynôme scindé de degré n i.e. $a_n \neq 0$.

Si $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ sont les racines de P alors,

$$\left\{ \begin{array}{l} \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n \\ \sum_{1 \leq i < j \leq n} \alpha_i \alpha_j \\ \vdots \\ \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_p \leq n} \alpha_{i_1} \alpha_{i_2} \dots \alpha_{i_p} \\ \vdots \\ \alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n \end{array} \right. = \begin{array}{l} -\frac{a_{n-1}}{a_n} \\ \frac{a_{n-2}}{a_n} \\ \vdots \\ (-1)^p \frac{a_{n-p}}{a_n} \\ \vdots \\ (-1)^n \frac{a_0}{a_n}. \end{array}$$

VI. Somme et produit des racines

2. Cas général

Exemple 20 :

Soit $n \geq 2$. On a vu que $X^n - 1 = \prod_{\zeta \in U_n} (X - \zeta)$.

Donc $\sum_{\zeta \in U_n} \zeta = 0$: la somme des racines $n^{\text{èmes}}$ de l'unité est nulle.



VI. Somme et produit des racines

2. Cas général

Exercice 18 :

Soient a, b, c les trois racines complexes de $P = X^3 - 3X - 1$.

Calculer :

① $a + b + c,$



VI. Somme et produit des racines

2. Cas général

Exercice 18 :

Soient a, b, c les trois racines complexes de $P = X^3 - 3X - 1$.

Calculer :

- 1 $a + b + c,$
- 2 $ab + ac + bc,$



VI. Somme et produit des racines

2. Cas général

Exercice 18 :

Soient a, b, c les trois racines complexes de $P = X^3 - 3X - 1$.

Calculer :

- ① $a + b + c,$
- ② $ab + ac + bc,$
- ③ $abc,$



VI. Somme et produit des racines

2. Cas général

Exercice 18 :

Soient a, b, c les trois racines complexes de $P = X^3 - 3X - 1$.

Calculer :

- ① $a + b + c,$
- ② $ab + ac + bc,$
- ③ $abc,$
- ④ $a^2 + b^2 + c^2,$



VI. Somme et produit des racines

2. Cas général

Exercice 18 :

Soient a, b, c les trois racines complexes de $P = X^3 - 3X - 1$.

Calculer :

❶ $a + b + c,$

❸ $abc,$

❺ $a^3 + b^3 + c^3,$

❷ $ab + ac + bc,$

❹ $a^2 + b^2 + c^2,$



VI. Somme et produit des racines

2. Cas général

Exercice 18 :

Soient a, b, c les trois racines complexes de $P = X^3 - 3X - 1$.

Calculer :

❶ $a + b + c,$

❸ $abc,$

❺ $a^3 + b^3 + c^3,$

❷ $ab + ac + bc,$

❹ $a^2 + b^2 + c^2,$

❻ $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c},$



VI. Somme et produit des racines

2. Cas général

Exercice 18 :

Soient a, b, c les trois racines complexes de $P = X^3 - 3X - 1$.

Calculer :

❶ $a + b + c,$

❸ $abc,$

❺ $a^3 + b^3 + c^3,$

❽ $a^7 + b^7 + c^7.$

❷ $ab + ac + bc,$

❹ $a^2 + b^2 + c^2,$

❻ $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c},$

