

TD 14

Éléments de correction

EXERCICE 4

Soit f la fonction définie sur $]0; 1[\cup]1; +\infty[$ par $\forall x \in]0; 1[\cup]1; +\infty[$,

$$f(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t}.$$

1. Montrer que f est prolongeable par continuité en 0 et en 1.

La fonction $g : t \mapsto \frac{1}{\ln t}$ est continue sur $]0; 1[$ et sur $]1; +\infty[$.

De plus, $\forall x \in]0; 1[, x^2 \in]0; 1[$ et $\forall x \in]1; +\infty[, x^2 \in]1; +\infty[$, donc f est bien définie sur $]0; 1[\cup]1; +\infty[$.

Soit $x \in]0; 1[$, alors $x^2 < x$. Soit $t \in [x^2; x]$, alors $\ln x^2 \leq \ln t \leq \ln x < 0$.

$$\text{Donc } \frac{1}{\ln x} \leq \frac{1}{\ln t} \leq \frac{1}{2\ln x}.$$

Par croissance de l'intégrale, $\int_{x^2}^x \frac{dt}{\ln x} \leq \int_{x^2}^x \frac{dt}{\ln t} \leq \int_{x^2}^x \frac{dt}{2\ln x}$, donc

$$\frac{x^2 - x}{2\ln x} \leq f(x) \leq \frac{x^2 - x}{\ln x}.$$

Or $\lim_{x \rightarrow 0} (x^2 - x) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$, d'où $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2 - x}{\ln x} = 0$, alors

d'après le théorème d'encadrement, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 \in \mathbb{R}$.

Donc f est prolongeable par continuité en 0 en posant $f(0) = 0$.

$$\forall x \in]0; 1[\cup]1; +\infty[, f(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{\ln t} = \int_x^{x^2} \frac{t dt}{t \ln t}.$$

Soit $x \in]0; 1[$ et $t \in [x^2; x]$, alors $t \ln t < 0$, donc $\frac{x}{t \ln t} \leq \frac{t}{t \ln t} \leq \frac{x^2}{t \ln t}$.

Or $x^2 < x$, donc par croissance de l'intégrale, $\int_{x^2}^x \frac{x dt}{t \ln t} \leq \int_{x^2}^x \frac{t dt}{t \ln t} \leq$

$$\int_{x^2}^x \frac{x^2 dt}{t \ln t}.$$

$$\text{D'où } x^2 \int_x^{x^2} \frac{dt}{t \ln t} \leq f(x) \leq x \int_x^{x^2} \frac{dt}{t \ln t}.$$

$$\text{Or } \int_x^{x^2} \frac{dt}{t \ln t} = [\ln |\ln t|]_x^{x^2} = \ln |2 \ln x| - \ln |\ln x| = \ln 2, \text{ donc}$$

$$x^2 \ln 2 \leq f(x) \leq x \ln 2.$$

Alors d'après le théorème d'encadrement, $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \ln 2$.

On obtient le même encadrement si $x \in]1; +\infty[$. Donc $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \ln 2$.

D'où $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \ln 2 \in \mathbb{R}$.

Ainsi, f est prolongeable par continuité en 1 en posant $f(1) = \ln 2$.

2. Montrer que la fonction f ainsi prolongée est de classe \mathcal{C}^1 en 0 mais pas de classe \mathcal{C}^2 en 0.

Soit G une primitive de g sur $]0; 1[$, alors $\forall x \in]0; 1[, f(x) = G(x^2) - G(x)$.

La fonction carré est dérivable sur $]0; 1[$, à valeurs dans $]0; 1[$ et la fonction G est dérivable sur $]0; 1[$, alors par composée la fonction $x \mapsto G(x^2)$ est dérivable sur $]0; 1[$. Donc par différence, f est dérivable sur $]0; 1[$.

$$\text{Soit } x \in]0; 1[, f'(x) = 2xg(x^2) - g(x) = \frac{2x}{\ln x^2} - \frac{1}{\ln x} = \frac{x-1}{\ln x}.$$

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x-1}{\ln x} = 0 \in \mathbb{R}.$$

Alors d'après le théorème de la limite de la dérivée, la fonction f prolongée en 0 est de classe \mathcal{C}^1 en 0 et $f'(0) = 0$.

$$\text{Soit } x \in]0; 1[, f''(x) = \frac{\ln x - \frac{x-1}{x}}{(\ln x)^2} = \frac{1}{\ln x} - \frac{x-1}{x(\ln x)^2}.$$

$$\text{Or } \lim_{x \rightarrow 0^+} x(\ln x)^2 = 0^+, \text{ alors } \lim_{x \rightarrow 0^+} f''(x) = +\infty.$$

Alors d'après le théorème de la limite de la dérivée, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f'(x) - f'(0)}{x-0} =$

$+\infty$, donc la fonction f' n'est pas dérivable en 0. Alors f n'est pas deux fois dérivable en 0.

Ainsi, la fonction f prolongée en 0 n'est pas de classe \mathcal{C}^2 en 0.

3. Calculer la limite de f en $+\infty$ et étudier la branche infinie de la courbe \mathcal{C} représentant la fonction f .

$\forall x \in]1; +\infty[, x^2 \ln 2 \leq f(x)$. Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 \ln 2 = +\infty$, donc d'après le théorème de divergence par minoration, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\forall x \in]1; +\infty[, x \ln 2 \leq \frac{f(x)}{x}$. Or $\lim_{x \rightarrow +\infty} x \ln 2 = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$.

Alors \mathcal{C} admet une branche parabolique de direction asymptotique verticale en $+\infty$.

4. Étudier le sens de variation de la fonction f .

f est dérivable sur $]0; 1[$ et sur $]1; +\infty[$ et $\forall x \in]0; 1[\cup]1; +\infty[, f'(x) = \frac{x-1}{\ln x}$.

$\forall x \in]0; 1[, x-1 < 0$ et $\ln x < 0$ d'où $f'(x) > 0$.

$\forall x \in]1; +\infty[, x-1 > 0$ et $\ln x > 0$ d'où $f'(x) > 0$.

Donc f est croissante sur chacun de ces intervalles.

Alors, la fonction f prolongée en 0 et en 1 est croissante sur $]0; +\infty[$.

EXERCICE 5

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $\forall x \in]0; +\infty[, f(x) = \frac{2}{x^2} \int_0^x \frac{t}{e^t + 1} dt$.

1. Montrer que $\forall x \in]0; +\infty[, \frac{1}{e^x + 1} \leq f(x) \leq \frac{1}{2}$.

En déduire que la fonction f est prolongeable par continuité en 0.

Soit $x \in]0; +\infty[$ et $t \in [0; x]$.

Alors $0 \leq t \leq x$ et donc $2 \leq e^t + 1 \leq e^x + 1$.

D'où $\frac{1}{e^x + 1} \leq \frac{1}{e^t + 1} \leq \frac{1}{2}$ et $\frac{t}{e^x + 1} \leq \frac{t}{e^t + 1} \leq \frac{t}{2}$.

Or $0 < x$, donc par croissance de l'intégrale,

$$\int_0^x \frac{t}{e^x + 1} dt \leq \int_0^x \frac{t}{e^t + 1} dt \leq \int_0^x \frac{t}{2} dt.$$

$$\text{D'où } \frac{1}{e^x + 1} \int_0^x t dt \leq \int_0^x \frac{t}{e^t + 1} dt \leq \frac{1}{2} \int_0^x t dt.$$

$$\text{De plus } \int_0^x t dt = \frac{1}{2} x^2, \text{ donc } \frac{1}{e^x + 1} \times \frac{1}{2} x^2 \leq \int_0^x \frac{t}{e^t + 1} dt \leq \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} x^2.$$

$$\text{Alors } \frac{1}{e^x + 1} \leq \frac{2}{x^2} \int_0^x \frac{t}{e^t + 1} dt \leq \frac{1}{2}.$$

$$\text{Ainsi } \forall x \in]0; +\infty[, \frac{1}{e^x + 1} \leq f(x) \leq \frac{1}{2}.$$

Prolongement de f par continuité en 0 :

$\forall x \in]0; +\infty[, \frac{1}{e^x + 1} \leq f(x) \leq \frac{1}{2}$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{e^x + 1} = \frac{1}{2}$, donc par encadrement,

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2} \in \mathbb{R}.$$

Ainsi, f est prolongeable par continuité en 0 en posant $f(0) = \frac{1}{2}$.

2. (a) Montrer que la fonction f ainsi prolongée est dérivable sur $]0; +\infty[$.

$$\text{Soit } h : t \mapsto \frac{t}{e^t + 1}.$$

La fonction h est continue sur $]0; +\infty[$, elle admet donc des primitives.

Soit H la primitive de h sur $]0; +\infty[$ s'annulant en 0.

$$\text{Alors } \forall x \in]0; +\infty[, f(x) = \frac{2}{x^2} H(x).$$

Or H est dérivable $]0; +\infty[$ (car c'est une primitive de h) et $x \mapsto \frac{2}{x^2}$ est

dérivable sur $]0; +\infty[$, donc par produit f est dérivable sur $]0; +\infty[$.

Dérivabilité en 0 :

$$\text{Soit } t \in]0; +\infty[, h(t) = \frac{t}{e^t + 1} \stackrel{t \rightarrow 0}{=} \frac{t}{2 + t + o(t)} \stackrel{t \rightarrow 0}{=} \frac{t}{2(1 + \frac{t}{2} + o(t))} \stackrel{t \rightarrow 0}{=} \frac{t}{2} \left(1 - \frac{t}{2} + o(t)\right)$$

$$\stackrel{t \rightarrow 0}{=} \frac{t}{2} - \frac{t^2}{4} + o(t^2).$$

Soit $x \in]0; +\infty[$,

$$f(x) = \frac{2}{x^2} \int_0^x \frac{t}{e^t + 1} dt \stackrel{x \rightarrow 0}{=} \frac{2}{x^2} \left(\int_0^x \left(\frac{t}{2} - \frac{t^2}{4} \right) dt + o(x^3) \right) \stackrel{x \rightarrow 0}{=} \frac{2}{x^2} \left[\frac{t^2}{4} - \frac{t^3}{12} \right]_0^x + o(x) \stackrel{x \rightarrow 0}{=} \frac{1}{2} - \frac{1}{6} x + o(x).$$

$$\text{Alors } f \text{ admet un } DL_1(0), \text{ donc } f \text{ est dérivable en } 0 \text{ et } f'(0) = -\frac{1}{6}.$$

(b) Vérifier que $\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = -\frac{4}{x^3}g(x)$ où g est une fonction définie sur $]0; +\infty[$ à déterminer.

$$\text{Soit } x \in]0; +\infty[, f(x) = \frac{2}{x^2}H(x), \text{ donc } f'(x) = -\frac{4}{x^3}H(x) + \frac{2}{x^2}h(x) = -\frac{4}{x^3}\left(H(x) - \frac{1}{2}xh(x)\right).$$

$$\text{Ainsi, } \boxed{\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = -\frac{4}{x^3}g(x) \text{ avec } g(x) = H(x) - \frac{1}{2}xh(x)}.$$

3. Etudier les variations de la fonction g sur $]0; +\infty[$.

En déduire le signe de g sur $]0; +\infty[$ puis les variations de f sur $]0; +\infty[$.

H est dérivable $]0; +\infty[$ et h est dérivable sur $]0; +\infty[$ comme quotient de telles fonctions. Donc g est dérivable sur $]0; +\infty[$.

Soit $x \in]0; +\infty[$.

$$g'(x) = h(x) - \frac{1}{2}h(x) - \frac{1}{2}xh'(x) = \frac{1}{2}\left(\frac{x}{1+e^x} - x\frac{1+e^x - xe^x}{(1+e^x)^2}\right) =$$

$$\frac{x(1+e^x - 1 - e^x + xe^x)}{2(1+e^x)^2} = \frac{x^2e^x}{2(1+e^x)^2} \text{ et } \frac{x^2e^x}{2(1+e^x)^2} > 0.$$

Donc g est croissante sur $]0; +\infty[$.

De plus, $g(0) = H(0) = 0$ donc g est positive sur $]0; +\infty[$.

Variations de f sur $]0; +\infty[$: $\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) = -\frac{4}{x^3}g(x)$.

Or $\forall x \in]0; +\infty[, -\frac{4}{x^3} < 0$ et $g(x) \geq 0$, donc $\forall x \in]0; +\infty[, f'(x) \leq 0$.

Ainsi f est décroissante sur $]0; +\infty[$.

4. Justifier que $\forall t \in]0; +\infty[, \frac{t}{e^t + 1} \leq 1$. En déduire la limite de f en $+\infty$.

Soit φ la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $\forall t \in]0; +\infty[, \varphi(t) = e^t + 1 - t$.

On montre que φ est croissante sur $]0; +\infty[$ et comme $\varphi(0) = 0$,

on en déduit que φ est positive sur $]0; +\infty[$ et donc $\forall t \in]0; +\infty[, e^t + 1 \geq t$.

$$\text{Ainsi, } \boxed{\forall t \in]0; +\infty[, \frac{t}{e^t + 1} \leq 1}.$$

Limite de f en $+\infty$:

Soit $x \in]0; +\infty[,$ alors $0 < x$.

De plus, $\forall t \in]0; +\infty[, 0 \leq \frac{t}{e^t + 1} \leq 1$ donc par croissance de l'intégrale,

$$0 \leq \int_0^x \frac{t}{e^t + 1} dt \leq \int_0^x 1 dt. \text{ D'où } 0 \leq f(x) \leq \frac{2}{x^2} \int_0^x dt.$$

$$\text{Or } \frac{2}{x^2} \int_0^x dt = \frac{2}{x} \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x} = 0, \text{ donc par encadrement, } \boxed{\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0}.$$

EXERCICE 13

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Une urne contient n jetons numérotés de 1 à n , indiscernables au toucher. Un joueur pioche au hasard deux jetons successivement et avec remise dans l'urne.

Soit U la variable aléatoire égale au premier numéro tiré et D celle égale au deuxième numéro tiré.

1. Donner les lois de U et D . Justifier par une phrase que ces deux variables sont indépendantes.

U et D suivent la loi uniforme sur $\llbracket 1, n \rrbracket$.

Le joueur pioche les deux jetons successivement et avec remise, donc U et D sont indépendantes.

2. On pose $X = \max\{U, D\}$.

(a) Soit $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Déterminer $P(U \leq k)$ et $P(D \leq k)$.

$$P(U \leq k) = \sum_{\ell=1}^k P(U = \ell) = \sum_{\ell=1}^k \frac{1}{n} = \frac{k}{n}.$$

$$\text{De même, } P(D \leq k) = \frac{k}{n}. \text{ Donc } \boxed{P(U \leq k) = P(D \leq k) = \frac{k}{n}}.$$

(b) Déterminer $X(\Omega)$.

$U(\Omega) = D(\Omega) = \llbracket 1, n \rrbracket$ et le tirage se faisant avec remise, on peut tirer deux fois le même numéro, donc $X(\Omega) = \llbracket 1, n \rrbracket$.

(c) Soit $k \in X(\Omega)$. Calculer les probabilités des événements A et B définis par $A = (U = k, D \leq k)$ et $B = (U \leq k, D = k)$.

Exprimer l'évènement $(X = k)$ en fonction de A et B .

En déduire que $P(X = k) = \frac{2k-1}{n^2}$.

$P(A) = P(U = k, D \leq k) = P(U = k) \times P(D \leq k)$ car U et D sont

indépendantes. Donc $P(A) = \frac{1}{n} \times \frac{k}{n} = \frac{k}{n^2}$.

De même, $P(B) = \frac{k}{n^2}$.

$(X = k) = (U = k, D \leq k) \cup (U \leq k, D = k)$, donc $(X = k) = A \cup B$.

Alors $P(X = k) = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$.

Or $P(A \cap B) = P(U = k, D = k) = P(U = k) \times P(D = k) = \frac{1}{n} \times \frac{1}{n} = \frac{1}{n^2}$.

Ainsi $P(X = k) = \frac{2k-1}{n^2}$.

(d) Calculer l'espérance de la variable aléatoire X .

$$E(X) = \sum_{k=1}^n P(X = k) \times k = \sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{n^2} \times k = \frac{1}{n^2} \left(2 \sum_{k=1}^n k^2 - \sum_{k=1}^n k \right) = \frac{1}{n^2} \left(\frac{n(n+1)(2n+1)}{3} - \frac{n(n+1)}{2} \right) = \frac{n+1}{6n} (4n+2-3) = \frac{(n+1)(4n-1)}{6n}$$

Donc $E(X) = \frac{(n+1)(4n-1)}{6n}$.

3. On pose $Y = \min\{U, D\}$.

(a) Soit $(k, l) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$. Montrer que si $k > l$ alors $P(X = k, Y = l) = \frac{2}{n^2}$.

Que vaut cette probabilité si $k = l$? si $k < l$?

On suppose que $k > l$.

$(X = k, Y = l) = (\max(U, D) = k, \min(U, D) = l) = (U = k, D = l) \cup (U = l, D = k)$.

Or $(U = k, D = l)$ et $(U = l, D = k)$ sont incompatibles, donc

$P(X = k, Y = l) = P(U = k, D = l) + P(U = l, D = k) = \frac{1}{n^2} + \frac{1}{n^2} = \frac{2}{n^2}$.

Donc si $k > l$, alors $P(X = k, Y = l) = \frac{2}{n^2}$.

On suppose que $k = l$.

$(X = k, Y = l) = (X = Y = k) = (U = D = k) = A \cap B$.

Alors $P(X = k, Y = l) = P(A \cap B) = \frac{1}{n^2}$.

Donc si $k = l$, alors $P(X = k, Y = l) = \frac{1}{n^2}$.

On suppose que $k < l$.

$(X = k, Y = l) = (\max(U, D) = k, \min(U, D) = l) = \emptyset$.

Donc si $k < l$, alors $P(X = k, Y = l) = 0$.

(b) En déduire la loi de Y .

$Y(\Omega) = \llbracket 1, n \rrbracket$. Soit $\ell \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

$$\begin{aligned} P(Y = \ell) &= \sum_{k=1}^n P(X = k, Y = \ell) \\ &= \sum_{k=1}^{\ell-1} P(X = k, Y = \ell) + P(X = \ell, Y = \ell) + \sum_{k=\ell+1}^n P(X = k, Y = \ell) \\ &= 0 + \frac{1}{n^2} + (n - \ell) \frac{2}{n^2} \\ &= \frac{2n - 2\ell + 1}{n^2} \end{aligned}$$

Donc $\forall \ell \in Y(\Omega) = \llbracket 1, n \rrbracket, P(Y = \ell) = \frac{2n - 2\ell + 1}{n^2}$.

EXERCICE 14

1. Le lancer du dé est une expérience à deux issues : obtenir 6 ou non.

C'est donc une épreuve de Bernoulli dont le succès "obtenir 6" a pour probabilité $\frac{1}{6}$.

Cette épreuve est répétée n fois de manière identique et indépendante.

X est donc la variable aléatoire égale au nombre de succès.

Alors $X \sim \mathcal{B}\left(n, \frac{1}{6}\right)$. Donc $E(X) = \frac{1}{6}n$ et $V(X) = \frac{5}{36}n$.

2. (a) L'événement $(Y = 0)$ est réalisé lorsqu'on n'obtient aucun 6 au cours

des n lancers, donc $(Y = 0) = \overline{S_1} \cap \overline{S_2} \cap \dots \cap \overline{S_n}$.

Les lancers étant indépendants, les événements $S_i, i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, donc les événements $\overline{S}_i, i \in \llbracket 1; n \rrbracket$, sont indépendants.

$$\text{Alors } P(Y = 0) = P(\overline{S}_1 \cap \overline{S}_2 \cap \dots \cap \overline{S}_n) = P(\overline{S}_1) \dots P(\overline{S}_n) = \left(\frac{5}{6}\right)^n.$$

$$\text{Donc } P(Y = 0) = \left(\frac{5}{6}\right)^n.$$

(b) $Y(\Omega) = \llbracket 0; n \rrbracket$.

Soit $k \in \llbracket 1; n \rrbracket$.

$$* \text{ Si } k = 1, P(Y = 1) = P(S_1) = \frac{1}{6}.$$

$$* \text{ Si } k \neq 1, \text{ alors } P(Y = k) = P(\overline{S}_1 \cap \overline{S}_2 \cap \dots \cap \overline{S}_{k-1} \cap S_k) = P(\overline{S}_1) \dots P(\overline{S}_{k-1}) P(S_k) = \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1} \times \frac{1}{6}.$$

$$\text{Donc } \forall k \in \llbracket 1; n \rrbracket, P(Y = k) = \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6}\right)^{k-1}.$$

3. $(X, Z)(\Omega) = \llbracket 0; n \rrbracket \times \{0; 1\}$. Soit $k \in \llbracket 0; n \rrbracket$.

$$P(X = k, Z = 1) = P(X = k) \times P_{(X=k)}(Z = 1).$$

Or $P_{(X=k)}(Z = 1)$ est la probabilité de tirer une boule blanche dans l'urne

$$U_k. \text{ Donc } P_{(X=k)}(Z = 1) = \frac{k}{n}.$$

$$\text{De plus, } P(X = k) = \binom{n}{k} \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{5}{6}\right)^{n-k}, \text{ donc}$$

$$P(X = k, Z = 1) = \frac{k}{n} \binom{n}{k} \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{5}{6}\right)^{n-k}.$$

$$\text{De même, } P(X = k, Z = 0) = \frac{n-k}{n} \binom{n}{k} \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{5}{6}\right)^{n-k}.$$

$$4. \text{ (a) } P(Z = 1) = \sum_{k=0}^n P(X = k, Z = 1) = \sum_{k=0}^n \frac{k}{n} \binom{n}{k} \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{5}{6}\right)^{n-k} =$$

$$\frac{1}{n} \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} \left(\frac{1}{6}\right)^k \left(\frac{5}{6}\right)^{n-k} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n k P(X = k) = \frac{1}{n} E(X) = \frac{1}{n} \times \frac{n}{6} = \frac{1}{6}.$$

$$\text{Donc } P(Z = 1) = \frac{1}{6}.$$

(b) $Z(\Omega) = \{0; 1\}$ donc Z suit la loi de Bernoulli de paramètre $\frac{1}{6}$.