
PROGRAMMES 27 ET 28 .

PROGRAMME 27 : du 25/05 au 29/05

Les colles du lundi 25 mai (férié) doivent être rattrapées.

REPRISE DU DÉBUT DES ESPACES PROBABILISÉS FINIS

ESPACES PROBABILISÉS FINIS : FIN

- ★ Indépendance de deux événements, de n événements. L'indépendance implique l'indépendante 2 à 2 mais la réciproque est fautive. Si A et B sont indépendants alors A et \overline{B} le sont aussi. Indépendance de 2 variables aléatoires (notation $X \perp\!\!\!\perp Y$), de n variables aléatoires. Si X et Y sont indépendantes alors $f(X)$ et $g(Y)$ le sont. Lemme des coalitions : si X_1, \dots, X_n sont indépendantes alors $f(X_1, \dots, X_m), g(X_{m+1}, \dots, X_n)$ sont indépendantes.
- ★ Lois usuelles : Loi uniforme sur $\{x_1, \dots, x_n\}$. Loi de Bernoulli de paramètre p dans $[0, 1]$. Notation $X \sim \mathcal{B}(p)$. Lien entre variable aléatoire de Bernoulli et indicatrice d'un événement. Loi binomiale de paramètres $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0, 1]$. Notation $X \sim \mathcal{B}(n, p)$. Interprétations des lois. Si X_1, \dots, X_n sont indépendantes et suivent la même loi $\mathcal{B}(p)$ alors $X_1 + \dots + X_n$ suit la loi $\mathcal{B}(n, p)$.

ESPÉRANCE ET VARIANCE

- ★ Espérance $E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x)$. Variable aléatoire centrée.
- ★ Linéarité, croissance, inégalité triangulaire ($|E(X)| \leq E(|X|)$).
- ★ Espérance d'une variable constante, uniforme, de Bernoulli, binomiale.
- ★ Formule du transfert : $E(f(X)) = \sum_{x \in X(\Omega)} f(x)P(X = x)$.

La formule s'applique aux couples.

Si X et Y sont indépendantes alors $E(XY) = E(X)E(Y)$. La réciproque est fautive.

- ★ Variance et écart-type : $V(X) = E((X - E(X))^2)$. Variable réduite, centrée réduite. Relation $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$, relation $V(aX + b) = a^2V(X)$. Variance d'une variable de Bernoulli, d'une variable binomiale.
- ★ Covariance de 2 variables aléatoires : $\text{Cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$. Deux variables dont la covariance est nulle sont décorrélées. Relation $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$. Cas de 2 variables indépendantes.
- ★ Variance d'une somme, cas de variables décorrélées. On retrouve la variance d'une variable binomiale.
- ★ Inégalité de Markov, inégalité de Bienaymé-Tchebychev. Loi faible des grands nombres.

UN RÉSULTAT À ÉNONCER

- ❑ Définition d'un système complet d'événements.
- ❑ Définition d'une probabilité.
- ❑ Propriétés des probabilités (événement contraire, différence d'ensembles, réunion de 2 événements, croissance).
- ❑ Définition de la probabilité uniforme.
- ❑ Définition d'une probabilité conditionnelles.
- ❑ Formule des probabilités composées.
- ❑ Formule des probabilités totales.
- ❑ Formule de Bayes.
- ❑ Loi de $f(X)$ en fonction de X .
- ❑ Définition d'une loi conjointe, des lois marginales.
- ❑ Formule donnant une loi marginale connaissant la loi conjointe.
- ❑ Indépendance de 2 événements, de n événements.
- ❑ Définition d'une loi uniforme, d'une loi de Bernoulli. Interprétations.
- ❑ Définition d'une loi binomiale. Interprétation.
- ❑ Définition de l'espérance et propriétés.
- ❑ Formule du transfert.
- ❑ Définition de la variance et autre formule ($V(X) = E(X^2) - E(X)^2$). Relation $V(aX + b)$.
- ❑ Espérance et variance d'une variable de Bernoulli, d'une variable binomiale.
- ❑ Définition de la covariance et autre formulation.
- ❑ Variance d'une somme de 2 variables, de n variables.
- ❑ Inégalité de Markov.
- ❑ Inégalité de Bienaymé-Tchebychev.
- ❑ Loi faible des grands nombres.

DÉMONSTRATIONS

- ❑ *Exercice fait en cours :*

Une urne contient 6 boules numérotées de 1 à 6. On en tire une et on note son numéro X , on la remet ensuite dans l'urne. On retire alors toutes les boules dont le numéro est strictement supérieur à X . On tire une nouvelle boule, dont le numéro est noté Y . Déterminer la loi de X , la loi conjointe de (X, Y) puis la loi de Y .
- ❑ Calcul de la variance d'une variable suivant une loi binomiale (connaissant l'espérance, sans utiliser la linéarité de l'espérance).
- ❑ Inégalité de Markov puis en déduire l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

PROGRAMME 28 : du 01/06 au 05/06

REPRISE DE L'INDÉPENDANCE, LOIS USUELLES, ESPÉRANCE ET VARIANCE

ANALYSE ASYMPTOTIQUE

- ★ Compléments sur les DL : Formule de Taylor-Young (développement limité à l'ordre n au voisinage d'un point a de I d'une application de classe \mathcal{C}^n sur I). Primitivation des DL. Les étudiants doivent connaître les développements limités à tout ordre au voisinage de 0 de $x \mapsto \frac{1}{1-x}$, \exp , \sin , \cos , $\operatorname{ch} x$, $\operatorname{sh} x$, $x \mapsto (1+x)^\alpha$, $x \mapsto \ln(1+x)$, $x \mapsto \operatorname{Arctan} x$ et de \tan à l'ordre 3.
- ★ Relations de domination : cas des suites
 - Notations $u_n = O(v_n)$, $u_n = o(v_n)$, $u_n \sim v_n$.
 - Liens entre les relations de comparaison. Équivalence entre les relations $u_n \sim v_n$ et $u_n - v_n = o(v_n)$. Opérations sur les équivalents : produit, quotient, puissances. Équivalents classiques. Propriétés conservées par équivalence : signe (localement), limite. On ne somme pas, on ne fait pas la composée d'équivalent de manière générale (à part par la valeur absolue et la puissance α , indépendante de la variable).
- ★ Relations de comparaison : cas des fonctions. Adaptation aux fonctions des définitions et résultats du paragraphe précédent (en un point ou à l'infini).
- ★ Applications : Calcul d'équivalents et de limites. Étude locale d'une fonction : tangente, position relative de la courbe et de la tangente. Détermination d'asymptotes et études des positions relatives. Condition suffisante à l'ordre 2 pour un extremum local.

UN RÉSULTAT À ÉNONCER

Lorsque l'on énonce un résultat, bien définir tout ce dont on a besoin.

- Loi de $f(X)$ en fonction de X .
- Définition d'une loi conjointe, des lois marginales.
- Formule donnant une loi marginale connaissant la loi conjointe.
- Indépendance de 2 événements, de n événements.
- Définition d'une loi uniforme, d'une loi de Bernoulli. Interprétations.
- Définition d'une loi binomiale. Interprétation.
- Définition de l'espérance et propriétés.
- Formule du transfert.
- Définition de la variance et autre formule ($V(X) = E(X^2) - E(X)^2$). Relation $V(aX + b)$.
- Espérance et variance d'une variable de Bernoulli, d'une variable binomiale.
- Définition de la covariance et autre formulation.
- Variance d'une somme de 2 variables, de n variables.
- Inégalité de Markov.
- Inégalité de Bienaymé-Tchebychev.
- Loi faible des grands nombres.
- Formule de Taylor-Young.
- Primitivation d'un DL.
- 3 DL usuels.
- Définition d'un o ou d'un équivalent (suite ou fonction).
- Opérations possibles sur les équivalents.
- Conservation locale du signe pour des suites ou fonctions équivalentes.
- Condition suffisante pour avoir un extremum local en $x_0 \in I$ pour $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ de classe C^2 .

DÉMONSTRATIONS

□ Calcul de la variance d'une variable suivant une loi binomiale (connaissant l'espérance, sans utiliser la linéarité de l'espérance).

□ *Loi faible des grands nombres* :

Soit X_1, \dots, X_n des variables aléatoires réelles, indépendantes et de même loi, d'espérance

m et d'écart-type σ . On pose $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

Pour tout $\varepsilon > 0$, $P\left(\left|\frac{S_n}{n} - m\right| \geq \varepsilon\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

□ Déterminer le $DL_{2n+1}(0)$ de Arctan.