

Suites numériques

1 Définition et comportement global d'une suite réelle

Définition 1. Une suite réelle u est une fonction définie sur $\mathbb{N}$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$:

$$u : \begin{cases} \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R} \\ n \longmapsto u(n) = u_n \end{cases}.$$

On appelle **terme général** de la suite u , le terme u_n de rang $n \in \mathbb{N}$ quelconque.

Notations : Une suite u peut être notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou simplement (u_n) . Si elle n'est définie qu'à partir du rang n_0 , on la note $(u_n)_{n \geq n_0}$. L'ensemble des suites réelles est $\mathcal{F}(\mathbb{N}, \mathbb{R})$ ou $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$.

Définition 2. Soit (u_n) une suite réelle.

1. (u_n) est **majorée** s'il existe un réel M tel que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq M$.
2. (u_n) est **minorée** s'il existe un réel m tel que $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \geq m$.
3. (u_n) est **bornée** si elle est minorée et majorée.

Propriété 1. Une suite (u_n) est bornée ssi il existe un réel K positif tel que $\forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq K$.

Exemple 1. La suite (u_n) est-elle bornée si : a) $u_n = n^2 - 3n$? b) $u_n = \frac{(-1)^n + 2}{3n}$?

Remarque : Si ils existent, le maximum, le minimum, la borne supérieure et la borne inférieure de (u_n) sont ceux de son image, $\text{Im}(u) = \{u_n, n \in \mathbb{N}\}$.

Définition 3. Soit (u_n) une suite réelle, et $n_0 \in \mathbb{N}$.

1. (u_n) est **stationnaire** à partir du rang n_0 si $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow u_{n+1} = u_n$.
2. (u_n) est **croissante** à partir du rang n_0 si $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow u_{n+1} \geq u_n$.
3. (u_n) est **décroissante** à partir du rang n_0 si $\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow u_{n+1} \leq u_n$.
4. (u_n) est **monotone** si elle est croissante ou décroissante.

Exemple 2. La suite (u_n) est-elle monotone si : a) $u_n = n^2 - 3n$? b) $u_n = 1 + \frac{5 \times (-1)^n}{n}$?

Définition 4. Soit (u_n) une suite réelle. On appelle suite **extraite** de (u_n) toute suite de la forme $(u_{\varphi(n)})$, où $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est une application strictement croissante.

Exemple 3. Soit (u_n) , la suite de terme général $u_n = n^2 + (-1)^n$.

Expliciter le terme général des suites extraites (u_{2n}) (u_{3n+2}) et (u_{n^2}) .

Remarque : Si $\varphi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante alors $\forall n \in \mathbb{N}, \varphi(n) \geq n$.

2 Suites usuelles définies par récurrence

Suite arithmétique (u_n) est définie par son premier terme u_0 et une relation de récurrence d'ordre 1 de la forme : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + r$, où $r \in \mathbb{R}$ est la raison.

Dans ce cas, $\forall n \geq p, u_n = u_p + (n - p)r$ et $\sum_{k=p}^n u_k = (n - p + 1) \left(\frac{u_p + u_n}{2} \right)$.

Suite géométrique (u_n) est définie par son premier terme u_0 et une relation de récurrence d'ordre 1 de la forme : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = qu_n$, où $q \in \mathbb{R}$ est la raison.

Dans ce cas, $\forall n \geq p, u_n = u_p q^{n-p}$ et, si $q \neq 1$, $\sum_{k=p}^n u_k = u_p \left(\frac{1 - q^{n-p+1}}{1 - q} \right)$.

Suite arithmético-géométrique (u_n) est définie par son premier terme u_0 et une relation de récurrence d'ordre 1 de la forme : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b$, où $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $a \neq 1$.

Dans ce cas, pour déterminer le terme général u_n :

1. On cherche la solution α de l'équation $ax + b = x$.
2. On pose $v_n = u_n - \alpha$ puis on montre que la suite (v_n) est géométrique de raison a .
3. On en déduit l'expression de v_n puis de u_n en fonction de n .

Remarque Cette méthode s'applique également pour les suites complexes définies par leur premier terme $u_0 \in \mathbb{C}$ et une relation de récurrence d'ordre 1 de la forme : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = au_n + b$, où $(a, b) \in \mathbb{C}^2$ et $a \neq 1$.

Exemple 4. Expliciter le terme général de la suite (u_n) définie par $u_1 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}^*, u_{n+1} = 2u_n + 1$.

Suite récurrente linéaire d'ordre 2 (u_n) est définie par ses premiers termes u_0 et u_1 et une relation de récurrence d'ordre 2 : $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$, où $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $b \neq 0$.

Théorème 1. Soit (u_n) vérifiant $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = au_{n+1} + bu_n$, où $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ et $b \neq 0$.

On note (E_c) l'équation caractéristique $r^2 = ar + b$, d'inconnue $r \in \mathbb{C}$. Si (E_c) admet

- deux racines réelles simples r_1 et r_2 , alors il existe $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = Ar_1^n + Br_2^n$$

- une racine réelle double r_0 , alors il existe $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (An + B)r_0^n$$

- deux racines complexes conjuguées $\rho e^{\pm i\theta}$, alors il existe $(A, B) \in \mathbb{R}^2$ tel que

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \rho^n (A \cos(n\theta) + B \sin(n\theta)).$$

Exemple 5. Expliciter le terme général de (u_n) définie par $u_0 = 0, u_1 = 1$ et

a) $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 2u_{n+1} - u_n.$

b) $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = -u_{n+1} - u_n.$

3 Limite d'une suite réelle

3.1 Suite de limite finie

Définition 5. On dit que la suite réelle (u_n) **admet pour limite** $\ell \in \mathbb{R}$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies |u_n - \ell| \leq \varepsilon.$$

Dans ce cas, on note $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$.

Exemple 6. Démontrer que la suite de terme général $u_n = 1 + \frac{5 \times (-1)^n}{n}$ admet pour limite 1.

Définition 6. On dit que la suite (u_n) est **convergente** s'il existe $\ell \in \mathbb{R}$ tel que $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$.

Sinon, on dit que (u_n) est divergente.

Propriété 2. Soit (u_n) une suite réelle, et $\ell \in \mathbb{R}$.

1. Si (u_n) converge alors sa limite ℓ est unique. Dans ce cas, on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell$.
2. Si (u_n) converge vers ℓ alors toute suite extraite de (u_n) converge vers ℓ .

Exemple 7. Démontrer que la suite de terme général $u_n = \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)$ diverge.

Propriété 3. Soit (u_n) une suite réelle.

1. Si (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{R}$ alors (u_n) est bornée. **La réciproque est fausse.**
2. Si (u_n) converge vers $\ell \neq 0$ alors (u_n) est du signe de ℓ à partir d'un certain rang.

3.2 Suite de limite infinie

Définition 7. On dit que la suite réelle (u_n) admet pour limite $+\infty$ si

$$\forall A \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies u_n \geq A.$$

Dans ce cas, on note $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.

De même, $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$ si $\forall A \in \mathbb{R}, \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \implies u_n \leq A$.

Remarques : Une suite (u_n) qui admet pour limite $\pm\infty$ est divergente.

Une suite qui diverge vers $+\infty$ n'est pas majorée et est positive à partir d'un certain rang.

Une suite qui diverge vers $-\infty$ n'est pas minorée et est négative à partir d'un certain rang.

Si (u_n) a une limite infinie, alors cette limite est unique et toute suite extraite admet la même limite.

Exemple 8. Déterminer la limite de la suite de terme général $u_n = q^n$, où $q > 1$.

4 Limites usuelles, opérations et compositions

Propriété 4. Soit $\alpha > 0$.

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n}} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n^\alpha} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n!} = 0$
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} n = \lim_{n \rightarrow +\infty} n^\alpha = \lim_{n \rightarrow +\infty} n! = +\infty$.

Propriété 5. Soit $q \in \mathbb{R}$.

1. Si $-1 < q < 1$ alors $q^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Si $q > 1$ alors $q^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.
2. Si $q \leq -1$ alors (q^n) n'admet pas de limite. Si $q = 1$ alors $\forall n \in \mathbb{N}, q^n = 1$.

Limite d'une somme

Limite de u_n	ℓ	ℓ	ℓ	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$
Limite de v_n	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$
Limite de $u_n + v_n$	$\ell + \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	F.I.

Limite d'un produit

Limite de u_n	ℓ	$\ell > 0$	$\ell < 0$	$\ell > 0$	$\ell < 0$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	0	0
Limite de v_n	ℓ'	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$
Limite de $u_n \times v_n$	$\ell \times \ell'$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	F.I.	F.I.

Limite d'un quotient

Limite de u_n	ℓ	$\ell \neq 0$	$+\infty$	$-\infty$	ℓ	ℓ	$\pm\infty$	0
Limite de v_n	$\ell' \neq 0$	0	ℓ'	ℓ'	$+\infty$	$-\infty$	$\pm\infty$	0
Limite de u_n/v_n	ℓ/ℓ'	$\pm\infty$	$\pm\infty$	$\pm\infty$	0	0	F.I.	F.I.

Exemple 9. Calculer la limite de (u_n) si : a) $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{3}{2^k}$ b) $u_n = \frac{3n^2 + n}{\sqrt{n} + 5}$.

Propriété 6. Croissances comparées Pour tous réels $\alpha > 0$, $\gamma > 0$ et $q > 1$ on a :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\ln^\gamma(n)}{n^\alpha} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{q^n} = 0, \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{q^n}{n!} = 0 \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n^\alpha}{n!} = 0.$$

Propriété 7. Composition Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, (u_n) à valeurs dans I et $a, b \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$.

$$\text{Si } u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} a \text{ et } f(x) \xrightarrow[x \rightarrow a]{} b \text{ alors } f(u_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} b.$$

Exemple 10. Calculer la limite de (u_n) si : a) $u_n = 2 \ln(n) - \ln(n+1)$ b) $u_n = \frac{2^n \ln(n)}{n!}$.

5 Limites et inégalités

5.1 Limites et comparaisons

Théorème 2. Passage à la limite dans une inégalité large Soit $(\ell, \ell') \in \mathbb{R}^2$.

Soient $(u_n), (v_n)$ deux suites réelles telles que $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang.

Si $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$ et $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell'$ alors $\ell \leq \ell'$.

Théorème 3. des gendarmes Soit $\ell \in \mathbb{R}$.

Soient $(u_n), (v_n), (w_n)$ réelles telles que $v_n \leq u_n \leq w_n$ à partir d'un certain rang.

Si $v_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$ et $w_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$ alors $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$.

Exemple 11. Déterminer la limite de la suite de terme général $u_n = \frac{n + \cos(n)}{n + 1}$.

Théorème 4. Soient (u_n) , (v_n) deux suites réelles telles que $u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang.

1. Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$ alors $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.
2. Si $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$ alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$.

Exemple 12. On considère la suite (u_n) de terme général $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

Démontrer que $\forall k \in \mathbb{N}^*, \frac{1}{k} \geq \ln(k+1) - \ln(k)$. En déduire que (u_n) diverge vers $+\infty$.

5.2 Limites et suites monotones

Théorème 5. de la limite monotone Toute suite réelle monotone admet une limite :

1. Si (u_n) est croissante non majorée alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.
2. Si (u_n) est décroissante non minorée alors $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} -\infty$.
3. Si (u_n) est croissante majorée alors (u_n) converge vers un réel ℓ .
4. Si (u_n) est décroissante minorée alors (u_n) converge vers un réel ℓ .

Exemple 13. Étudier la limite de (u_n) définie par :

$$\text{a) } u_0 = 0 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{2u_n + 1}{u_n + 2} \quad \text{b) } u_0 = 1 \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = (u_n)^2 + u_n.$$

Propriété 8. Soit $f : I \rightarrow I$ et (u_n) définie par $u_0 \in I$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$.

Si (u_n) converge vers $\ell \in I$ et si f est continue sur I alors $\ell = f(\ell)$.

5.3 Limites et suites adjacentes

Définition 8. Deux suites réelles (u_n) et (v_n) sont dites **adjacentes** si l'une est croissante, l'autre décroissante et $u_n - v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Théorème 6. des suites adjacentes Si (u_n) et (v_n) sont adjacentes alors (u_n) et (v_n) convergent et ont la même limite $\ell \in \mathbb{R}$.

De plus, pour tout $n \in \mathbb{N}$, le réel ℓ est compris entre u_n et v_n .

Exemple 14. On pose $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n}$.

Montrer que (u_n) converge et trouver une approximation de sa limite à 10^{-2} près.

6 Suites complexes

Définition 9. Une **suite complexe** est une application $u : \begin{cases} \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C} \\ n \mapsto u(n) = u_n \end{cases}$, notée $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

- On dit que (u_n) est **bornée** si $\exists K \in \mathbb{R}_+, \forall n \in \mathbb{N}, |u_n| \leq K$.
- On dit que (u_n) **a pour limite** $\ell \in \mathbb{C}$ si $|u_n - \ell| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

Dans ce cas, on note $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$.

- On dit que (u_n) est **convergente** si $\exists \ell \in \mathbb{C}, u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$. Sinon, elle est divergente.

Propriété 9. Soit (u_n) une suite complexe.

1. Si (u_n) converge alors sa limite ℓ est unique.
2. Si (u_n) converge vers ℓ alors toute suite extraite de (u_n) converge vers ℓ .
3. Si (u_n) converge alors (u_n) est bornée.

Propriété 10. Opérations sur les limites Soient (u_n) et (v_n) deux suites complexes.

1. $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ ssi $\operatorname{Re}(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \operatorname{Re}(\ell)$ et $\operatorname{Im}(u_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \operatorname{Im}(\ell)$.
2. Si $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell$ et $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell'$ alors :

$$u_n + v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell + \ell', \quad u_n \times v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \ell \times \ell' \quad \text{et, si } \ell' \neq 0, \quad \frac{u_n}{v_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\ell}{\ell'}.$$

Exemple 15. On pose $z_n = 1 - \frac{2}{n} + i \left(2 + \frac{1}{n^2} \right)$.

Démontrer que la suite (z_n) converge.