

# Limites et continuité

Dans ce chapitre,  $I$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$  non vide et non réduit à un point et  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ .

## 1 Limites d'une fonction

### 1.1 Limite finie ou infinie en un réel $a$

**Définition 1.** Soit un réel  $a$  appartenant à  $I$  ou extrémité de  $I$  et  $\ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ .

On dit que  $f$  admet pour limite  $\ell$  en  $a$  si



i)  $\ell \in \mathbb{R}$  et  $\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \alpha \Rightarrow |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$ .

ii)  $\ell = +\infty$  et  $\forall A \in \mathbb{R}, \exists \alpha > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \alpha \Rightarrow f(x) \geq A$ .

iii)  $\ell = -\infty$  et  $\forall A \in \mathbb{R}, \exists \alpha > 0, \forall x \in I, |x - a| \leq \alpha \Rightarrow f(x) \leq A$ .

Dans tous les cas, on note  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ .

Si de plus  $f$  est définie en  $a$  alors cette limite est finie et vaut  $f(a)$ .



**Remarque :**  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \iff f(a+h) \xrightarrow{h \rightarrow 0} \ell$ .

**Exemple 1.** Limite de  $f(x) = \sqrt{x+3}$  en 2 et de  $g(x) = \ln(x+1)$  en  $-1$ .

**Propriété 1.** Si  $f$  admet une limite en  $a$  alors cette limite est unique. On la note  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ .

Si de plus  $f$  est définie en  $a$  alors cette limite est finie et vaut  $f(a)$ .

### 1.2 Limite à droite et limite à gauche

**Définition 2.** Soit un réel  $a$  appartenant à  $I$  ou extrémité de  $I$  et  $\ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ .

1.  $f$  admet  $\ell$  comme **limite à droite** en  $a$  si  $f_{|I \cap ]a, +\infty[}$  admet pour limite  $\ell$  en  $a$ .

Dans ce cas, on note  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a^+} \ell$  ou  $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \ell$  ou  $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = \ell$ .

2.  $f$  admet  $\ell$  comme **limite à gauche** en  $a$  si  $f_{|] -\infty, a[ \cap I}$  admet pour limite  $\ell$  en  $a$ .

Dans ce cas, on note  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a^-} \ell$  ou  $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \ell$  ou  $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = \ell$ .

**Exemple 2.** Limite en 0 de  $f(x) = [x]$ , de  $g(x) = \mathbf{1}_{\mathbb{R}^*}(x)$ , de  $h(x) = \begin{cases} 1+x & \text{si } x \in [-1, 0] \\ 1-x & \text{si } x \in ]0, 1] \end{cases}$ .

**Propriété 2.** Soit  $\ell \in \mathbb{R}$ . Si  $f$  est définie sur  $I = [b, c]$  et  $a \in ]b, c[$ , alors

$$f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \text{ ssi } f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a^+} \ell, f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a^-} \ell \text{ et } \ell = f(a).$$

**Définition 3.** Soit  $\ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ ,  $I = [b, c]$  et  $a \in ]b, c[$ . Si  $f$  est définie sur  $I \setminus \{a\}$ , on dit que  $f$  admet pour limite  $\ell$  en  $a$  si  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a^+} \ell$  et  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a^-} \ell$ .

**Exemple 3.** Limite en 0 de  $f(x) = \frac{|x|}{x}$  et de  $g(x) = e^{-\frac{1}{x^2}}$ .

### 1.3 Limite finie ou infinie en $\pm\infty$

**Définition 4.** Soit  $f$  définie sur  $I = [b, +\infty[$ ,  $b \in \mathbb{R}$ , et  $\ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ .


On dit que  $f$  admet pour limite  $\ell$  en  $+\infty$  si

i)  $\ell \in \mathbb{R}$  et  $\forall \varepsilon > 0, \exists \alpha > 0, \forall x \in I, x \geq \alpha \implies |f(x) - \ell| \leq \varepsilon$

ii)  $\ell = +\infty$  et  $\forall A \in \mathbb{R}, \exists \alpha > 0, \forall x \in I, x \geq \alpha \implies f(x) \geq A$

iii)  $\ell = -\infty$  et  $\forall A \in \mathbb{R}, \exists \alpha > 0, \forall x \in I, x \geq \alpha \implies f(x) \leq A$ .

Dans tous les cas, on note  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \ell$ .



**Remarque :** Les définitions sont similaires pour les limites en  $-\infty$  (à écrire).

Si  $f$  admet une limite en  $\pm\infty$  alors cette limite est unique, et notée  $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x)$ .

**Exemple 4.** Limites de  $f(x) = e^{-x}$  en  $\pm\infty$ .

## 2 Propriétés des limites

### 2.1 Opérations sur les limites

**Limite d'une somme**  $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$  et  $\ell \in \mathbb{R}$

|                  |                |           |           |           |           |             |
|------------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| $\lim_a f$       | $\ell$         | $\ell$    | $\ell$    | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$   |
| $\lim_a g$       | $\ell'$        | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$   |
| $\lim_a (f + g)$ | $\ell + \ell'$ | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | <b>F.I.</b> |

**Limite d'un produit**  $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$  et  $\ell \in \mathbb{R}$

|                       |                     |            |            |            |            |           |           |           |             |             |
|-----------------------|---------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| $\lim_a f$            | $\ell$              | $\ell > 0$ | $\ell < 0$ | $\ell > 0$ | $\ell < 0$ | $+\infty$ | $+\infty$ | $-\infty$ | 0           | 0           |
| $\lim_a g$            | $\ell'$             | $+\infty$  | $+\infty$  | $-\infty$  | $-\infty$  | $+\infty$ | $-\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$   | $-\infty$   |
| $\lim_a (f \times g)$ | $\ell \times \ell'$ | $+\infty$  | $-\infty$  | $-\infty$  | $+\infty$  | $+\infty$ | $-\infty$ | $+\infty$ | <b>F.I.</b> | <b>F.I.</b> |

**Limite d'un quotient**  $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$  et  $\ell \in \mathbb{R}$

|                |                |               |             |             |           |           |             |             |
|----------------|----------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| $\lim_a f$     | $\ell$         | $\ell \neq 0$ | $+\infty$   | $-\infty$   | $\ell$    | $\ell$    | $\pm\infty$ | 0           |
| $\lim_a g$     | $\ell' \neq 0$ | 0             | $\ell'$     | $\ell'$     | $+\infty$ | $-\infty$ | $\pm\infty$ | 0           |
| $\lim_a (f/g)$ | $\ell/\ell'$   | $\pm\infty$   | $\pm\infty$ | $\pm\infty$ | 0         | 0         | <b>F.I.</b> | <b>F.I.</b> |

**Exemple 5.** Calculer les limites suivantes :

a)  $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x^3 + \frac{1}{x}\right)$       b)  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (5x - 2\sqrt{x})$       c)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\sqrt{x} - 1}{5x^2}$

**Propriété 3. Croissances comparées** Soient  $\alpha, \beta > 0$ . On a :

- $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^\alpha |\ln(x)|^\beta = 0$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{[\ln(x)]^\beta}{x^\alpha} = 0$ .
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} |x|^\alpha e^{\beta x} = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\beta x}}{x^\alpha} = +\infty$  et  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^{\beta x}}{[\ln(x)]^\alpha} = +\infty$ .

**Propriété 4.** Soient  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  et  $g : J \rightarrow \mathbb{R}$  telles que  $f(I) \subset J$ .

$a, b, \ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$  sont tels que  $a$  et  $b$  sont éléments ou extrémités de  $I$  et  $J$  respectivement.

Si  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} b$  et  $g(y) \xrightarrow{y \rightarrow b} \ell$  alors  $g \circ f(x) = g(f(x)) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ .

**Exemple 6.** Calculer la limite suivante :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln \left( e^{\frac{1}{x}} - 1 \right)$ .

**Propriété 5.** Soient  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $(u_n) \in I^{\mathbb{N}}$  et

$a, \ell \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ , où  $a$  est élément ou extrémité de  $I$ .

Si  $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} a$  et  $f(x) \xrightarrow[x \rightarrow a]{} \ell$  alors  $f(u_n) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} \ell$ .

**Exemple 7.** Montrer que les fonctions cos et sin n'admettent pas de limite en  $\pm\infty$ .

## 2.2 Limites et inégalités

**Définition 5.** Soit  $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ .

1. Si  $a \in \mathbb{R}$ , on appelle **voisinage** de  $a$  tout intervalle de la forme  $]a - \alpha, a + \alpha[$ , avec  $\alpha > 0$ .
2. Si  $a = +\infty$ , on appelle **voisinage** de  $a$  tout intervalle de la forme  $] \alpha, +\infty[$ , avec  $\alpha \in \mathbb{R}$ .
3. Si  $a = -\infty$ , on appelle **voisinage** de  $a$  tout intervalle de la forme  $] -\infty, \alpha[$ , avec  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

Une propriété portant sur  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  est dite vraie au voisinage de  $a$  ssi il existe un voisinage  $V$  de  $a$  tel que cette propriété est vraie sur  $I \cap V$ .

**Propriété 6.** Soit  $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ , élément ou extrémité de  $I$ .

1. Si  $f$  admet une limite finie  $\ell$  en  $a$  alors  $f$  est bornée au voisinage de  $a$ .
2. Si  $f$  admet une limite finie  $\ell$  non nulle en  $a$  alors  $f$  est du signe de  $\ell$  au voisinage de  $a$ .

**Théorème 1. Passage à la limite dans une inégalité large** Soient  $(\ell, \ell') \in \mathbb{R}^2$  et  $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ .

Si  $f(x) \leq g(x)$  au voisinage de  $a$ , et si  $f(x) \xrightarrow[x \rightarrow a]{} \ell$  et  $g(x) \xrightarrow[x \rightarrow a]{} \ell'$ , alors  $\ell \leq \ell'$ .

**Théorème 2. des gendarmes** Soient  $\ell \in \mathbb{R}$  et  $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ .

Si  $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$  au voisinage de  $a$  et si  $g(x) \xrightarrow[x \rightarrow a]{} \ell$  et  $h(x) \xrightarrow[x \rightarrow a]{} \ell$ , alors  $f(x) \xrightarrow[x \rightarrow a]{} \ell$ .

**Exemple 8.** Étudier la limite de  $f : x \mapsto x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$  en 0.

**Théorème 3. de minoration ou de majoration** Soit  $a \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ .

1. Si  $f(x) \leq g(x)$  au voisinage de  $a$  et  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$  alors  $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} +\infty$  (minoration).
2. Si  $f(x) \leq g(x)$  au voisinage de  $a$  et  $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} -\infty$  alors  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} -\infty$  (majoration).

**Exemple 9.** Étudier la limite de  $f : x \mapsto \sqrt{x} \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor$  en 0.

**Théorème 4. Limite monotone-admis** Soient  $a \in \mathbb{R} \cup \{-\infty\}$  et  $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$ .

1. Si  $f$  est croissante majorée sur  $]a, b[$  alors  $f$  admet une limite finie à gauche en  $b$  ;
2. Si  $f$  est croissante non majorée sur  $]a, b[$  alors  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b^-} +\infty$
3. Si  $f$  est décroissante minorée sur  $]a, b[$  alors  $f$  admet une limite finie à gauche en  $b$
4. Si  $f$  est décroissante non minorée sur  $]a, b[$  alors  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow b^-} -\infty$


**Remarque :** On a des énoncés similaires pour la limite à droite en  $a$  (à écrire). Ainsi, si  $f$  est monotone sur l'intervalle  $]a, b[$  alors  $f$  admet une limite finie ou infinie aux bornes de  $]a, b[$ .

### 3 Continuité d'une fonction


#### 3.1 Définition de la continuité

**Définition 6.** Soit  $a \in I$ .

1. On dit que  $f$  est **continue** en  $a$  si  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} f(a)$ . Sinon,  $f$  est dite discontinue en  $a$ .
2. On dit que  $f$  est **continue à droite** en  $a$  si  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a^+} f(a)$ .
3. On dit que  $f$  est **continue à gauche** en  $a$  si  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a^-} f(a)$ .



Fonction continue sur  $[-2, 4]$



Fonction discontinue en  $a = 2$

**Exemple 10.** Étudier la continuité en 0 des fonctions valeur absolue et partie entière.

**Remarque :**  $f$  est continue en  $a$  ssi elle est continue à droite et à gauche en  $a$ .

**Définition 7.** Soit  $a \in I$  et  $f$  définie sur  $I \setminus \{a\}$ .

On dit que  $f$  est **prolongeable par continuité** en  $a$  ssi  $f$  admet une limite finie  $\ell$  en  $a$ .

Dans ce cas, la fonction  $\tilde{f}$  définie sur  $I$  par  $\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & \text{si } x \in I \setminus \{a\} \\ \ell & \text{si } x = a \end{cases}$

est appelée prolongement par continuité de  $f$  en  $a$ .

**Exemple 11.** Montrer que  $f : x \mapsto x \ln |x|$  admet un prolongement par continuité en 0.

**Remarque :** Le prolongement par continuité de  $f$  en  $a$  est une fonction continue en  $a$ .

**Définition 8.** On dit que  $f$  est continue sur  $I$  ssi  $f$  est continue en tout réel  $a$  de  $I$ .

L'ensemble des fonctions continues sur  $I$  est noté  $\mathcal{C}^0(I)$ , ou simplement  $\mathcal{C}(I)$ .

**Propriété 7.** Les fonctions polynômes, abs, exp, ch, sh, ln, puissances, cos, sin, tan, arccos, arcsin, arctan sont continues sur leur ensemble de définition.

### 3.2 Fonctions continues et opérations

**Propriété 8.** Soit  $a, \lambda \in \mathbb{R}$ .

Si  $f$  et  $g$  sont continues en  $a$  (sur  $I$ ) alors  $f + g$ ,  $\lambda f$  et  $fg$  sont continues en  $a$  (sur  $I$ ).

Si de plus  $g$  ne s'annule pas en  $a$  (sur  $I$ ) alors  $f/g$  est continue en  $a$  (sur  $I$ ).

**Exemple 12.** Étudier la continuité de la fonction  $f : x \mapsto \frac{x^2 \ln(x)}{x-1}$ .

**Propriété 9.** Soient  $f : I \rightarrow J$  et  $g : J \rightarrow \mathbb{R}$ .

1. Si  $f$  est continue en  $a \in I$  et  $g$  est continue en  $f(a)$  alors  $g \circ f$  est continue en  $a$ .
2. Si  $f$  est continue sur  $I$  et  $g$  est continue sur  $J$  alors  $g \circ f$  est continue sur  $I$ .

**Exemple 13.** Étudier la continuité de la fonction  $f : x \mapsto \arcsin(\sqrt{x-1})$ .

### 3.3 Propriétés des fonctions continues

**Théorème 5. des valeurs intermédiaires** Soit  $f$  une fonction continue sur  $I = [a, b]$ .

Si  $k$  est un réel compris entre  $f(a)$  et  $f(b)$  alors il existe  $c \in [a, b]$  tel que  $f(c) = k$ .

**Remarque :**  $f$  continue sur  $[a, b]$  "prend" toutes les valeurs intermédiaires entre  $f(a)$  et  $f(b)$ .

**Exemple 14.** Montrer que l'équation  $\arccos(x) = x$  admet au moins une solution dans  $[0, 1]$ .

**Corollaire 1.** Soit une fonction  $f$  continue sur un intervalle  $I$ .

1. L'image  $f(I)$  de  $I$  par  $f$  est un intervalle.
2. Si de plus  $f$  ne s'annule pas sur  $I$ , alors  $f$  est de signe constant.

**Théorème 6. des bornes atteintes-admis** Si  $f$  est une fonction continue sur un segment  $I = [a, b]$  alors  $f$  est bornée et atteint ses bornes ( $f$  admet un maximum et un minimum sur  $[a, b]$ ).

**Exemple 15.** Soit  $f$  continue et strictement positive sur  $[a, b]$ .

Montrer que  $f$  est minorée par un réel  $m$  strictement positif.

**Théorème 7. de la bijection** Si  $f$  est continue et strictement monotone sur l'intervalle  $I$  alors  $f$  réalise une bijection de  $I$  sur l'intervalle  $f(I)$ .

De plus,  $f^{-1}$  est continue et strictement monotone sur  $f(I)$ , de même monotonie que  $f$ .

**Exemple 16.** Démontrer que l'équation  $3 \ln(x) = x$  admet exactement deux solutions.

## 4 Fonctions complexes

**Définition 9.** Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{C}$  et  $a$  élément ou extrémité de  $I$ .

1. On dit que  $f$  est **bornée** sur  $I$  s'il existe  $K \in \mathbb{R}_+$  tel que  $\forall x \in I, |f(x)| \leq K$ .
2. On dit que  $f$  a pour **limite**  $\ell \in \mathbb{C}$  en  $a$  si  $|f(x) - \ell| \xrightarrow{x \rightarrow a} 0$ . Ce que l'on note  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell$ .
3. Si  $a \in I$ , on dit que  $f$  est **continue** en  $a$  si  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} f(a)$ .

On dit que  $f$  est continue sur  $I$  ssi  $f$  est continue en tout  $a$  de  $I$ .

**Propriété 10.** Soit  $f : I \rightarrow \mathbb{C}$  et  $a$  élément ou extrémité de  $I$ .

1. Si  $f$  admet une limite finie en  $a$  alors cette limite est unique, et notée  $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ .
2. Si  $f$  admet une limite finie en  $a$  alors  $f$  est bornée au voisinage de  $a$ .

**Propriété 11.** (opérations sur les limites) Soient  $f, g : I \rightarrow \mathbb{C}$  et  $a$  élément ou extrémité de  $I$ .

1.  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \in \mathbb{C}$  ssi  $\operatorname{Re}(f(x)) \xrightarrow{x \rightarrow a} \operatorname{Re}(\ell)$  et  $\operatorname{Im}(f(x)) \xrightarrow{x \rightarrow a} \operatorname{Im}(\ell)$ .
2. Si  $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \in \mathbb{C}$  et  $g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell' \in \mathbb{C}$  alors :  $f(x) + g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell + \ell'$ ,  
 $f(x) \times g(x) \xrightarrow{x \rightarrow a} \ell \times \ell'$  et  $\frac{f(x)}{g(x)} \xrightarrow{x \rightarrow a} \frac{\ell}{\ell'}$  (si  $g$  ne s'annule pas et  $\ell' \neq 0$ ).
3. Si  $f$  et  $g$  sont continues en  $a \in I$  (sur  $I$ ) alors  $f + g$ ,  $fg$ ,  $f/g$  (si  $g$  ne s'annule pas),  $\operatorname{Re}(f)$ ,  $\operatorname{Im}(f)$  et  $|f|$  sont continues en  $a$  (sur  $I$ ).