

DM 10

Bio Spé

à rendre le jeudi 18 décembre

Sujet Oral

Question de cours

Énoncer le lemme des coalitions.

Exercice préparé

- On considère les équations différentielles suivantes, d'inconnue $y : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$y'' - 4y' + 5y = 0 \quad (\text{H})$$

$$y'' - 4y' + 5y = 2 - e^{2x} \quad (\text{E})$$

- Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation (H).

- En déduire l'ensemble des solutions de l'équation (E).

On pourra chercher une solution particulière y_0 de l'équation différentielle

$$y'' - 4y' + 5y = -e^{2x}$$

sous la forme $y_0 : x \mapsto ce^{2x}$, où c est un réel à déterminer.

- Pour tout réel x , on note $C(x) = \int_0^x e^{2t} \cos(t) dt$ et $S(x) = \int_0^x e^{2t} \sin(t) dt$.

- Montrer que, pour tout x réel, $C(x) = \frac{e^{2x} \cos(x) - 1}{2} + \frac{1}{2}S(x)$ et $S(x) = \frac{e^{2x} \sin(x)}{2} - \frac{1}{2}C(x)$.

- En déduire une primitive de $x \mapsto e^{2x} \cos(x)$ et une primitive de $x \mapsto e^{2x} \sin(x)$ sur \mathbb{R} .

- Écrire une fonction en langage Python, nommée `intC`, prenant en paramètres un réel x , et un entier nb_pas , qui renvoie une valeur approchée de l'intégrale $\int_0^x e^{2t} \cos(t) dt$ obtenue à l'aide de la méthode des rectangles. L'intervalle $[0; x]$ doit être découpé en nb_pas intervalles de même longueur.

Dans toute la suite, on note E l'espace vectoriel des fonctions de classe \mathcal{C}^∞ de \mathbb{R} dans \mathbb{R} .

On considère les quatre fonctions suivantes de E :

$$f_1 : x \mapsto 1, \quad f_2 : x \mapsto e^{2x}, \quad f_3 : x \mapsto e^{2x} \cos(x), \quad f_4 : x \mapsto e^{2x} \sin(x),$$

On note F le sous-espace vectoriel de E engendré par la famille $\mathcal{B} = (f_1, f_2, f_3, f_4)$.

- Montrer que \mathcal{B} est une base de F .

- On note u l'application définie sur F par $u(f) = f'$ pour tout $f \in F$.

- Montrer que u est linéaire.

- Calculer l'image par u de f_1, f_2, f_3 et f_4 .

- En déduire que u est un endomorphisme de F , et déterminer la matrice représentative A de l'endomorphisme u dans la base \mathcal{B} .

- Résoudre l'équation $AX = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, d'inconnue $X \in \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$.

Quel résultat des questions précédentes retrouve-t-on ainsi? Justifier.

- Résoudre l'équation $(A^2 - 4A + 5I_4)X = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, d'inconnue $X \in \mathcal{M}_{4,1}(\mathbb{R})$.

Quel résultat des questions précédentes retrouve-t-on ainsi? Justifier.

Problème ENS : facultatif

Soit $n \geq 1$ un entier et soit $M_n(\mathbb{R})$ l'espace vectoriel des matrices carrées d'ordre n . On définit

$$\begin{array}{rccc} \text{Tr}_n : & M_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & A = (A_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} & \longmapsto & \sum_{i=1}^n A_{i,i} \end{array}$$

Ainsi, pour $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & -6 \end{pmatrix}$, $\text{Tr}_2(B) = B_{1,1} + B_{2,2} = 1 - 6 = -5$.

1. Montrer que Tr_n est une application linéaire.
2. Déterminer, en justifiant votre réponse, le rang de Tr_n et la dimension de son noyau.
3. On se place dans cette question dans le cas où $n = 2$.
 - (a) Déterminer une base du noyau de Tr_2 .
 - (b) Soit I_2 la matrice identité de $M_2(\mathbb{R})$ et soit $D_2(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices de la forme xI_2 avec $x \in \mathbb{R}$. Montrer que $D_2(\mathbb{R})$ est un sous-espace vectoriel de $M_2(\mathbb{R})$.
 - (c) Montrer que pour tout matrice $M \in M_2(\mathbb{R})$ il existe un unique couple $(A, B) \in \text{Ker}(\text{Tr}_2) \times D_2(\mathbb{R})$ tel que $M = A + B$.
 - (d) Soit $C_2(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices $C \in M_2(\mathbb{R})$ telles que, pour toute matrice $B \in M_2(\mathbb{R})$, on a $CB = BC$. Montrer que $C_2(\mathbb{R}) = D_2(\mathbb{R})$.

On revient maintenant au cas où $n \geq 1$ est un entier quelconque.

4. Montrer que, pour toutes matrices $A, B \in M_n(\mathbb{R})$, on a $\text{Tr}_n(AB) = \text{Tr}_n(BA)$.
Pour tous entiers $1 \leq i, j \leq n$, on définit la matrice $E^{i,j} \in M_n(\mathbb{R})$ par ses coefficients $E_{i,j}^{i,j} = 1$ et $E_{k,l}^{i,j} = 0$ si $k \neq i$ ou $l \neq j$.
5. Montrer que la famille $(E^{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ est une base de $M_n(\mathbb{R})$.
6. Pour tous entiers $1 \leq i, j, k, \ell \leq n$ tels que $j \neq k$, montrer que $E^{i,j}E^{j,k} = E^{i,k}$ et $E^{i,j}E^{k,\ell} = 0$.
7. Soit $f : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ une application linéaire telle que $f(AB) = f(BA)$ pour toutes matrices $A, B \in M_n(\mathbb{R})$.
 - (a) Montrer que $f(E^{i,j}) = 0$ si $i \neq j$ et que $f(E^{i,i})$ ne dépend pas de i .
 - (b) Montrer qu'il existe $x \in \mathbb{R}$ tel que $f(A) = x\text{Tr}_n(A)$ pour toute matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$.
8. Soit $g : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ une application linéaire. Montrer qu'il existe une matrice $B \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $g(A) = \text{Tr}_n(AB)$ pour toute matrice $A \in M_n(\mathbb{R})$.
9. A-t-on $\text{Tr}_n(ABC) = \text{Tr}_n(ACB)$ pour toutes matrices $A, B, C \in M_n(\mathbb{R})$? Justifiez votre réponse.