

☞ On a $X_0 = \begin{pmatrix} u_0 \\ v_0 \\ w_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$. Donc :

$$X_n = A^n X_0 = \begin{pmatrix} 1+n & -n & n \\ -2^n + n + 1 & 2^n - n & n \\ 1 - 2^n & 2^n - 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+n \\ -2^n + n + 1 \\ 1 - 2^n \end{pmatrix}$$

Problème 2 : Une fonction définie à partir d'une intégrale

Présentation générale

Ce problème traite de l'étude d'une fonction définie par une intégrale. De telles fonctions apparaissent dans de nombreux domaines d'application : automatique, traitement du signal, etc.

On s'intéressera en particulier au calcul de certaines des valeurs de cette fonction, à ses variations, ainsi qu'à son comportement asymptotique.

Partie I - Définition de la fonction

Q 16. Pour quelles valeurs de $\alpha \in \mathbb{R}$ l'intégrale $\int_0^1 t^\alpha dt$ est-elle convergente ? Calculer alors sa valeur en fonction de α .

☞ Si $\alpha \neq -1$. Soit $\varepsilon \in]0, 1[$, on a :

$$\int_\varepsilon^1 t^\alpha dt = \left[\frac{t^{\alpha+1}}{\alpha+1} \right]_\varepsilon^1 = \frac{1}{\alpha+1} (1 - \varepsilon^{\alpha+1})$$

☞ Donc $\int_\varepsilon^1 t^\alpha dt$ admet une limite finie quand $\alpha \rightarrow 0$ que si $\alpha > -1$ et alors :

$$\int_\varepsilon^1 t^\alpha dt = \frac{1}{\alpha+1} (1 - \varepsilon^{\alpha+1}) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{1}{\alpha+1}$$

$$\text{Donc } \int_0^1 t^\alpha dt = \frac{1}{\alpha+1}$$

☞ Par ailleurs $\int_0^1 t^\alpha dt$ diverge si $\alpha < -1$. En effet, puisque $\alpha + 1 < 0$, on a :

$$\varepsilon^{\alpha+1} \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} +\infty \quad \text{donc} \quad \int_\varepsilon^1 t^\alpha dt = \frac{1}{\alpha+1} (1 - \varepsilon^{\alpha+1}) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0^+} +\infty$$

☞ Enfin pour $\alpha = -1$

$$\int_\varepsilon^1 t^{-1} dt = [\ln(t)]_\varepsilon^1 = (\ln(1) - \ln(\varepsilon)) = -\ln(\varepsilon) \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} +\infty$$

Donc là encore $\int_0^1 t^\alpha dt$ diverge.

Q 17. Un nombre réel x étant fixé, donner un équivalent (sous la forme d'une puissance de t), lorsque t tend vers 0^+ , de la fonction définie sur $]0, 1]$ par $t \mapsto \frac{t^{x-1}}{1+t}$.

☞ Comme $1+t \xrightarrow{t \rightarrow 0} 1$, on a $\frac{t^{x-1}}{1+t} \times \frac{1}{t^{x-1}} \xrightarrow{t \rightarrow 0} 1$ donc $\frac{t^{x-1}}{1+t} \underset{t \rightarrow 0}{\sim} t^{x-1}$

Q 18. En déduire que l'intégrale $\int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t} dt$ converge si et seulement si $x > 0$.

☞ D'après la question **Q16** $\int_0^1 t^{x-1} dt$ converge si et seulement si $x - 1 > -1$ (c.a.d $x > 0$).

☞ Or $\frac{t^{x-1}}{1+t} \underset{t \rightarrow 0}{\sim} t^{x-1}$. Donc $\int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t} dt$ converge si et seulement si $x > 0$.

On définit alors sur $]0, +\infty[$ la fonction f par :

$$f(x) = \int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t} dt$$

La suite du problème a pour but d'étudier certaines propriétés de la fonction f .

Partie II - Calcul de $f(n)$ pour $n \in \mathbb{N}^*$

Q 19. Montrer que $f(1) = \ln(2)$, puis que $f(2) = 1 - \ln(2)$. On pourra remarquer que, pour tout $t \in [0, 1]$:

$$1 - \frac{1}{1+t} = \frac{t}{1+t}.$$

☞ Calcul de $f(1)$:

$$f(1) = \int_0^1 \frac{1}{1+t} dt = [\ln(1+t)]_0^1 = \ln(2) - \ln(1) = \ln(2)$$

☞ Par ailleurs :

$$f(1) + f(2) = \int_0^1 \frac{1}{1+t} dt + \int_0^1 \frac{t}{1+t} dt = \int_0^1 \frac{1+t}{1+t} dt = \int_0^1 1 dt = [t]_0^1 = 1$$

$$\text{Donc } f(2) = 1 - f(1) = 1 - \ln(2)$$

Q 20. Rappeler la formule de factorisation de $a^n - b^n$, pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $n \in \mathbb{N}^*$.

En déduire que, pour tout $t \in [0, 1]$, $n \geq 1$:

$$1 - (-t)^n = (1+t) \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k t^k$$

☞ Pour tout $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, $n \in \mathbb{N}^*$:

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1}) = (a-b) \sum_{k=0}^{n-1} a^{n-k} b^k$$

$$\text{☞ Donc } 1 - (-t)^n = 1^n - (-t)^n = (1 - (-t)) \sum_{k=0}^{n-1} 1^{n-k} (-t)^k = (1+t) \sum_{k=0}^{n-1} (-1)^k t^k$$

Q 21. En déduire que, pour tout entier $n \geq 2$:

$$f(n) = (-1)^{n-1} \ln(2) + (-1)^n \sum_{k=0}^{n-2} (-1)^k \frac{1}{k+1}$$

On pourra remarquer que, pour $n \geq 2$ et $t \in [0, 1]$: $t^{n-1} = (-1)^{n-1} (-t)^{n-1}$.

☞ Donc :

$$\begin{aligned} f(n) &= \int_0^1 \frac{t^{n-1}}{1+t} dt = \int_0^1 \frac{(-1)^{n-1} (-t)^{n-1}}{1+t} dt = \int_0^1 \frac{1}{1+t} \underbrace{((-1)^{n-1} - (-1)^{n-1} (1 - (-t)^{n-1}))}_{(-1)^{n-1} (-t)^{n-1}} dt \\ &= (-1)^{n-1} \int_0^1 \frac{1}{1+t} dt + \underbrace{(-1)^n}_{-(-1)^{n-1}} \int_0^1 \frac{1}{1+t} (1 - (-t)^{n-1}) dt \\ &\stackrel{\text{Q20}}{=} (-1)^{n-1} f(1) + (-1)^n \int_0^1 \frac{1}{1+t} \times \left((1+t) \sum_{k=0}^{n-2} (-1)^k t^k \right) dt \\ &= (-1)^{n-1} \ln(2) + (-1)^n \sum_{k=0}^{n-2} (-1)^k \int_0^1 t^k dt \\ &= (-1)^{n-1} \ln(2) + (-1)^n \sum_{k=0}^{n-2} (-1)^k \left[\frac{t^{k+1}}{k+1} \right]_0^1 \\ &= (-1)^{n-1} \ln(2) + (-1)^n \sum_{k=0}^{n-2} (-1)^k \frac{1}{k+1} \end{aligned}$$

Q 22. Écrire une fonction python d'en-tête `def fEntier(n)` : qui calcule $f(n)$ à partir de la formule obtenue dans la question précédente et renvoie la valeur de $f(n)$, pour $n \in \mathbb{N}^*$.

On supposera la fonction `log` (pour $\ln$) importée de la bibliothèque `numpy`.

```

1 import numpy as np
2 def fEntier(n):
3     if n==1:
4         return np.log(2)
5     else:
6         som=1
7         for k in range(1,n-1):
8             som=som+(-1)**k/(k+1)
9         return (-1)**(n-1)*np.log(2)+(-1)**n*som

```

On peut aussi remarquer que $f(n+1) = -f(n) + \frac{1}{n-1}$ et proposer le programme récursif :

```

1 import numpy as np
2 def fEntier(n):
3     if n==1:
4         return np.log(2)
5     else:
6         return fEntier(n-1)+1/(n-1)

```

Partie III - Variations de f

Q 23. Rappeler la définition de la décroissance d'une fonction g définie sur un intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}$.

☞ Soit g une fonction définie sur un intervalle I et à valeurs dans $\mathbb{R}$, alors g est dite décroissante si :

$$\forall (a, b) \in \mathbb{R}^2, a \leq b \Rightarrow f(a) \geq f(b)$$

Q 24. Soit α et β deux nombres réels tels que $-1 < \alpha \leq \beta$. Comparer, pour tout $t \in]0, 1]$, t^α et t^β .

En déduire que f est décroissante sur $]0, +\infty[$.

☞ $\forall t \in]0, 1], \ln(t) \leq 0$

☞ Donc pour $t \in]0, 1]$:

$$-1 < \alpha \leq \beta \Rightarrow -\ln(t) > \alpha \ln(t) \geq \beta \ln(t) \quad \underbrace{\Rightarrow}_{\text{exp croissante strict sur } \mathbb{R}} \quad e^{-\ln(t)} \geq e^{\alpha \ln(t)} > e^{\beta \ln(t)} \Rightarrow \frac{1}{t} \geq t^\alpha \geq t^\beta$$

☞ Donc pour $t \in]0, 1]$ et $0 < x \leq y$ (donc $-1 < x-1 \leq y-1$), on a en appliquant le résultat ci-dessus :

$$t^{x-1} \geq t^{y-1} \Rightarrow \frac{t^{x-1}}{1+t} \geq \frac{t^{y-1}}{1+t}$$

☞ Donc pour $0 < x \leq y$, on a par croissance de l'intégrale :

$$\int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t} dt \geq \int_0^1 \frac{t^{y-1}}{1+t} dt \Rightarrow f(x) \geq f(y)$$

☞ Donc $0 < x \leq y \Rightarrow f(x) \geq f(y)$.

La fonction f est donc décroissante.

Q 25. Montrer que, pour tout $x > 0$ et $t \in]0, 1]$:

$$\frac{t^{x-1}}{2} \leq \frac{t^{x-1}}{1+t} \leq t^{x-1}.$$

En déduire que, pour tout $x > 0$:

$$\frac{1}{2x} \leq f(x) \leq \frac{1}{x}$$

☞ Pour tout $x > 0$ et $t \in]0, 1]$: $t^{x-1} > 0$.

☞ Donc tout $x > 0$ et $t \in]0, 1]$, on a :

$$0 < t \leq 1 \Rightarrow 1 < 1+t \leq 2 \quad \underbrace{\Rightarrow}_{x \mapsto \frac{1}{x} \text{ décroissante sur }]0, +\infty[} \quad \frac{1}{2} \leq \frac{1}{1+t} < 1 \Rightarrow \frac{t^{x-1}}{2} \leq \frac{t^{x-1}}{1+t} < t^{x-1}.$$

☞ Donc par croissance de l'intégrale, pour tout $x > 0$:

$$\int_0^1 \frac{t^{x-1}}{2} dt \leq \int_0^1 \frac{t^{x-1}}{1+t} dt \leq \int_0^1 t^{x-1} dt \Rightarrow \left[\frac{t^x}{2x} \right]_0^1 \leq f(x) \leq \left[\frac{t^x}{x} \right]_0^1 \Rightarrow \frac{1}{2x} \leq f(x) \leq \frac{1}{x}$$


Q 26. En déduire la limite de f en $+\infty$ ainsi que la limite de f en 0.

☞ Comme $\frac{1}{2x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ et $\frac{1}{2x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$ alors par théorème de comparaison (dit des "gendarmes" ici) $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.

☞ Comme $\frac{1}{2x} \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty$ alors par théorème de comparaison $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 0} +\infty$.

Q 27. Tracer l'allure de la courbe représentative de f dans un repère orthonormé. On placera en particulier les points de cette courbe d'abscisses 1 et 2 (on donne $\ln(2) \simeq 0,7$).

Les axes sont asymptotes horizontale pour (Ox) et vertical pour Oy). La courbe est comprise entre les représentations de $x \mapsto \frac{1}{x}$ et $x \mapsto \frac{1}{2x}$.



Partie IV - Équivalent de f en $+\infty$

Q 28. Montrer que, pour $x \in]0, +\infty[$:

$$f(x) + f(x+1) = \frac{1}{x}.$$

$$f(x) + f(x+1) = \int_0^1 \frac{t^{x-1} + t^x}{1+t} dt = \int_0^1 t^{x-1} \frac{t+1}{1+t} dt = \int_0^1 t^{x-1} dt = \left[\frac{t^x}{x} \right]_0^1 = \frac{1}{x}$$

Q 29. En utilisant le résultat de la question **Q24**, montrer que, pour $x > 1$:

$$f(x+1) + f(x) \leq 2f(x) \leq f(x) + f(x-1).$$

☞ Pour $x > 1$, par décroissance de la fonction f :

$$x+1 \geq x \geq x-1 \Rightarrow f(x+1) \leq f(x) \leq f(x-1) \Rightarrow \underbrace{f(x+1) + f(x)}_{\frac{1}{x}} \leq 2f(x) \leq \underbrace{f(x) + f(x-1)}_{\frac{1}{x-1}}.$$

Q 30. En déduire un équivalent de f en $+\infty$.

☞ Avec la question précédente, pour $x > 1$, par décroissance de la fonction f :

$$\frac{1}{x} \leq 2f(x) \leq \frac{1}{x-1} \Rightarrow 1 \leq 2xf(x) \leq \frac{x}{x-1}$$

☞ Comme $\frac{x}{x-1} \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{x}{x} = 1$, on a $\frac{x}{x-1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$ puis par le théorème de comparaison (dit des "gendarmes" encore)

$$2xf(x) = \frac{f(x)}{\frac{1}{2x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$$

☞ Donc $f(x) \underset{x \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{1}{2x}$.